

# 慢阻肺 COPD 诊疗与护理考核

## 一、选择题

1、与 COPD 的发生关系最密切的是 ( ) [单选题] \*

- A.吸烟✓
- B.感染因素
- C.免疫功能
- D 气候异常
- E.过敏因素

2、与 COPD 无关的病因是 ( ) 分值 [单选题] \*

- A.吸烟
- B.大气污染
- C 气候
- D.药物因素✓

3、慢性阻塞性肺气肿患者就诊时最常见的主诉是 ( ) [单选题] \*

- A.胸痛
- B.发热、咳痰
- C.干咳
- D.活动后气短✓
- E.体重减轻

4、阻塞性肺气肿最主要的临床表现是 ( ) [单选题] \*

A.咳嗽、咳痰

B.心音减弱

C.呼吸音粗糙

D.肺部啰音

E.呼吸困难✓

5、患者，男，58岁，查体:胸廓成桶状，胸廓活动度减弱，叩诊过清音，考虑诊断为（ ） [单选题] \*

A.气胸

B.肺气肿✓

C.肺实变

D.胸膜炎

E.肺不张

6、有关慢性阻塞性肺疾病肺气肿的体征，下列不正确的是（ ） [单选题] \*

A.呼气相延长，呼气相哮鸣音

B.呼吸音减低

C.语颤减低

D.呼吸音增强✓

E.桶状胸

7、确诊慢性阻塞性肺疾病(COPD)最主要的依据是（ ） [单选题] \*

A.胸部X线片

B.血气分析✓

C.肺功能检查

D.典型的慢性咳嗽、咳痰症状

F.肺部检查

8、患者，男，58岁，慢性阻塞性肺疾病，出院后拟行长期家庭氧疗，护士告知患者每日吸氧时间不少于（ ） [单选题] \*

- A.6 小时
- B.10 小时
- C.15 小时✓
- D.8 小时
- E.12 小时

9、患者男，65岁，因慢性咳嗽，咳痰，气喘10余年，加重1周入院，初诊为慢性支气管炎，慢性阻塞性肺气肿，为解呼吸困难，给予鼻导管低流量持续吸氧，适宜的氧流量为（ ） [单选题] \*

- A.5-6L/分
- B.2-3L/分
- C.1-2L/分✓
- D.6-8L/分
- E.8-10L/分

10、肺气肿患者进行腹式呼吸锻炼时，下列动作中不正确的（ ） [单选题] \*

- A.吸气时腹部尽力挺出
- B.深吸慢呼
- C.深吸快呼✓
- D.鼻吸口呼
- E.呼气时腹部尽力收缩

11.关于阻塞性肺气肿，哪一项描述是正确的（ ） [单选题] \*

A.经积极治疗可以痊愈

B.仅限于肺泡弹性减退与膨胀

C.其病理改变不完全可逆✓

D.a1 一抗胰蛋白加易发生肺气肿 E 肺功能改变主要是肺活量少

12.护士指导患者预防慢性阻塞性肺疾病(COPD)应首先强调( ) [单选题] \*

A.戒烟✓

B.预防感冒

C.避免受凉

D 加强锻炼

E 改环境卫生

13.COPD 并发肺心病急性加重时,采取的治疗措施中最重要的是

( ) [单选题] \*

A.应用利尿剂

B.应用呼吸兴剂

C.控制肺部感染✓

D.应用血管扩张剂

E..应用强心剂

14.作为护士指导慢性阻塞性肺疾病患者加强腹式呼吸的原因是( ) [单选题] \*

A.有利于液排出

B.增加肺泡张力

C.使呼吸幅度大,增加肺泡通气量✓

D.增加呼气术气道内压力

E.防止小气道过早陷闭

15.慢阻肺病人的主要护理问题包括（ ） [单选题] \*

A 清理呼吸道无效

B.气体交换受损✓

C.活动无耐力

D.焦虑

E.以上都是

16.慢性阻塞性肺疾病(OPD)的主要特征是（ ） [单选题] \*

A.大气道阻✓

B.小气道阻塞

C 双肺哮鸣音

E.桶状

F.E.胸片示肺野亮度增加

17.患者男，62岁，咳嗽20余年，近日大量脓、胸闷气短，诊断为慢性阻塞性肺疾病。护士指导患者

下列哪种措施能有效改善该呼吸困难（ ） [单选题] \*

A.祛痰剂

B.超声雾化

C.插管吸痰

D.呼吸器

E.腹式呼吸训✓

18.慢性喘息型支气管炎的特点：（ ） [单选题] \*

A.呼气性呼吸困难，双肺布满哮鸣音✓

- B.端坐呼吸，双肺底水泡音
- C.呼气性呼吸困难，两肺散在干湿性罗音
- D.吸气性呼吸困难，呼吸音低
- E.进行性呼吸困难，咳嗽，痰中带血

19.慢性支气管炎最突出的症状是（ ） [单选题] \*

- A.少量咯血
- B.长期反复咳嗽✓
- C.反复咯脓性痰
- D.逐渐加重的呼吸困难
- E.活动后喘息

20.慢性支气管炎的临床分型是：（ ） [单选题] \*

- A.单纯型、喘息型
- B.单纯型、喘息型、混合型✓
- C.急性型、慢性迁延型
- D.急性型、慢性型、迁延型
- E.急性型、慢性型、反复发作型

21.呼吸系统最常见的症状是：（ ） [单选题] \*

- A.咳嗽✓
- B.咳痰
- C.咳血
- D.呼吸困难
- E.胸痛

22.低浓度吸氧、氧流量为 :( C ) [单选题] \*

A.5-6L/min

B.2-3L/min

I-2L/min✓

D.1-2L/s

E.2-3L/s

23.对咳嗽、咳痰患者，护理措施错误的是 ( ) [单选题] \*

A.保持室内空气新鲜，温、湿度适宜

B.咳脓痰者注意口腔护理

C.痰稠不易咳出，鼓励多饮水，施行雾化吸入

D.痰多可在饭后行体位引流✓

E.痰多且无力咳出者，帮助翻身拍背

24.慢性支气管炎的主要诊断依据是： ( ) [单选题] \*

A.病史和临床表现✓

B.肺功能测定

C.痰液细菌学检查

D.X 线检查

E.长期吸烟史

25.慢性支气管炎最常见的并发症是： ( ) [单选题] \*

A.肺气肿✓

B.肺部感染

C.支气管扩张

D.咳血

E.肺源性心脏病

26.慢性支气管炎最突出的症状是：（ ） [单选题] \*

A.长期反复咳嗽✓

B.经常咳痰

C.时有喘息

D.反复发热

E.少量咳血

27.慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿病人，主要是在原有症状的基础上又出现（ ） [单选题] \*

A.反复发绀

B.剧烈咳嗽

C.咯多量脓痰

D.经常感染发热

E.逐渐加重的呼吸困难✓

28.慢性支气管炎最重要的病因是（ ） [单选题] \*

A.过敏

B.感染✓

C.大气污染

D.寒冷气候

E.呼吸道防御功能低下

29.指导肺气肿患者作腹式呼吸锻炼时，下列哪项不正确（ ） [单选题] \*

A.取立位，吸气时尽力挺腹，胸部不动



B.呼气时腹部内陷，尽量将气呼出

C. 吸与呼时间之比为 2 : 1 或 3 : 1✓

D.用鼻吸气，用口呼气，要求深吸缓呼，不可用力

E.每日锻炼 2 次，每次 10-20min，每分钟呼吸保持在 7-8 次

30.慢性阻塞性肺气肿主要引起 ( ) [单选题] \*

A.胸膜炎

B.肺炎

C.肺结核

D.支气管扩张

E.慢性肺心病✓

31、慢性支气管炎、阻塞性肺气肿患者，3 天来咳嗽、气促加重，皮肤潮红，多汗，球结膜水肿，根据病情应给予 ( ) [单选题] \*

A、高流量持续给氧

B、高流量间歇给氧

C、低流量持续给氧✓

D、低流量间歇给氧

E、面罩加压给氧

32、慢性支气管炎发生和加重的最主要原因是 ( ) [单选题] \*

A、大气污染

B、职业

C、感染✓

D、吸烟

E、遗传

33、慢性支气管炎最突出的症状是（ ） [单选题] \*

A、长期反复咳嗽✓

B、反复咳脓性痰

C、间歇少量咯血

D、逐渐加重的呼吸困难

E、活动后心悸、气急

34、慢性阻塞性肺疾病，进行腹式呼吸的目的为（ ） [单选题] \*

A、有利于痰液排出

B、增加肺泡张力

C、使呼吸幅度扩大，增加肺泡通气量✓

D、借助腹肌进行呼吸

E、间接增加肋间肌活动

35、指导肺气肿患者作腹式呼吸锻炼时，下列哪项不正确（ ） [单选题] \*

A、取立位，吸气时尽力挺腹，胸部不动

B、呼气时腹肌收缩，腹壁下陷，尽量将气呼出

C、吸与呼时间比例为 2:1 或 3:1✓

D、用鼻吸气，用口呼气，要求深吸缓呼，不可用力

E、每日进行 3 次，每次重复 10 次

36、慢性支气管炎患者的下列表现中，不应使用抗生素的是（ ） [单选题] \*

A、偶尔咳少量黏液样痰✓

B、发热

C、喘息伴哮鸣音

D、肺内多量湿啰音

E、外周血白细胞  $15 \times 10^9/L$

37、慢性支气管炎并发肺气肿时，除慢支症状外，主要症状为（ ） [单选题] \*

A、突发性呼吸困难

B、夜间阵发性呼吸困难

C、逐渐加重的呼吸困难，以活动后为重 ✓

D、发绀

E、心悸

38、形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是（ ） [单选题] \*

A、慢性支气管炎 ✓

B、支气管哮喘

C、支气管扩张

D、肺结核

E、肺间质纤维化

39、慢性支气管炎急性发作的最常见原因是（ ） [单选题] \*

A、吸烟

B、感染 ✓

C、大气污染

D、气温下降

E、过敏

40. 下列 ( ) 不是慢性阻塞性肺疾病环境危险因素。 [单选题] \*

- A . 吸烟
- B . 职业粉尘
- C . 化学物质
- D . 空气污染
- E .  $\alpha$  1-抗胰蛋白酶缺乏 ✓

41. 下列 ( ) 不属于慢性阻塞性肺疾病的临床表现。 [单选题] \*

- A . 慢性咳嗽
- B . 咳痰
- C . 气短
- D . 喘息
- E . 食欲增大, 体重增加。 ✓

42. 下列药品, ( ) 为短效支气管舒张剂。 [单选题] \*

- A . 福莫特罗
- B . 沙美特罗
- C . 噻托溴铵
- D . 氨茶碱缓释片
- E . 沙丁胺醇 ✓

43. 下列药品, ( ) 为抗胆碱支气管舒张剂。 [单选题] \*

- A . 福莫特罗
- B . 沙美特罗
- C . 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226132002200010043>