

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 临床医学相关知识测试题库含答案

1、女性，25 岁，二维心脏超声检查示收缩期尖瓣后叶瓣体脱向左心房，M 型不二尖瓣曲线 CD 段呈吊床样改变，考虑为（ ）

- A、二尖瓣脱垂
- B、二尖瓣重度狭窄
- C、二尖瓣乳头肌断裂
- D、二尖瓣关闭不全
- E、以上都不正确

答案：A

2、超声负荷试验（药物或运动）与超声造影的关系是（ ）

- A、降低超声造影诊断效果
- B、增强超声造影诊断效果
- C、替代超声造影的新技术
- D、不能与超声造影同时应用
- E、可增加患者造影的不良反应

答案：B

3、以下关于酸碱平衡与血钾浓度的相互关系，正确的说法是（ ）

- A、代谢性酸中毒时可引起低血钾
- B、低血钾时可引起代谢性碱中毒
- C、代谢性碱中毒时可引起高血钾
- D、高血钾时可引起代谢性碱中毒
- E、低血钾时可引起代谢性酸中毒

答案：B

4、正常腮腺的解剖位置是（ ）

- A、下颌后窝，咀嚼肌前部的皮下
- B、外耳道下方，下颌前窝
- C、位于外耳道的前下方，下颌支与胸锁乳突肌之间
- D、前缘位于咀嚼肌后部，后壁位于乳突部
- E、前缘位于咀嚼肌中部，后界位于胸锁乳突肌后缘

答案：C

5、超声声束的单位面积能量的名称和单位是（ ）

- A、频率，周期
- B、波长，米
- C、强度，瓦/平方米
- D、速度，厘米/秒

E、声速，米/秒

答案：C

6、下列哪一项描述不符合化脓性脑膜炎的 CT 表现（ ）

- A、基底池密度增高
- B、增强后脑膜强化
- C、脑室壁强化
- D、脑实质内低密度区并团块状强化
- E、脑室扩大

答案：D

7、先天性肝外胆管囊状扩张特点，不正确的是（ ）

- A、发生癌变的概率增高
- B、胆总管部位出现椭圆形或纺锤形囊肿
- C、囊状扩张内可合并结石
- D、囊状扩张与肝管相通
- E、好发于胆总管的下部

答案：E

8、（ ）属于甲类传染病（ ）

- A、新型冠状病毒肺炎
- B、鼠疫
- C、人感染高致病性禽流感
- D、肺炭疽
- E、流行性腮腺炎

答案：B

9、男性，20 岁，瘦长体型，高度近视。心脏超声检查示：升主动脉瘤样扩张，内径为 50mm，主动脉瓣脱垂并反流，诊断为（ ）

- A、主动脉瓣上狭窄
- B、主动脉瓣关闭不全
- C、马方综合征
- D、主动脉缩窄
- E、主动脉夹层

答案：C

10、脑梗死致脑水肿开始逐渐消退的时间为（ ）

- A、3 天
- B、1 周
- C、2、3 周

D、4 周

E、5 周

答案：C

11、用超声造影测定冠状动脉血流储备的叙述，下列错误的是（ ）

A、药物负荷试验

B、测定基础及负荷状态下冠状动脉血流的超声造影效果

C、用时间-强度曲线表示基础及负荷状态下超声造影效果

D、口服减低心肌收缩力的药物

E、负荷状态与基础状态时的时间-强度曲线下面积的比值

答案：D

12、显微镜检查尿管型时，应观察多少个低倍镜视野（ ）

A、2

B、5

C、10

D、20

E、30

答案：D

13、以下哪种 CT 征象最有助于脑外肿瘤的诊断（ ）

A、边界不清

B、肿瘤沿脑镰或天幕生长

C、同侧脑室受压移位

D、病变与颅板交界呈钝角

E、血管源性水肿

答案：D

14、心肌超声造影检查，对造影剂的要求是（ ）

A、微气泡直径 $<5\mu\text{m}$

B、微气泡的包裹膜要厚

C、微气泡的压缩系数要小

D、微气泡密度要高

E、微气泡直径要大于红细胞

答案：A

15、超声检查使用耦合剂的作用是：①润滑；②排除空气；③增加透声性；

④可以不用（ ）

A、①②

B、②③

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226150144200010141>