

## 2023-24 年河南省遂平县《执业药师之西药专业二》资格考试必刷 200 题附答案【考试直接用】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列主要用于防治遗传性血管神经水肿的药物是

- A: 米非司酮
- B: 司坦唑醇
- C: 环孢素
- D: 黄体酮

答案：B

2. 属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

- A: 哌替啶
- B: 秋水仙碱
- C: 布洛芬
- D: 吗啡

答案：A

3. 下述属于第三代  $\alpha$

- A: 十一酸睾酮
- B: 酚苄明
- C: 哌唑嗪
- D: 坦洛新

答案：D

4. (2015 年真题) 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿剂的是 ( )。

- A: 螺内酯
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

**答案：A**

5. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- B: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- C: 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- D: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

**答案：B**

6. 最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

**答案：D**

7. 利多卡因

- A: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持
- B: 可治疗阵发性室上性心动过速
- C: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- D: 可治疗房性期前收缩

**答案：C**

8. 使用羟甲唑啉滴鼻液期间，可能发生的不良反应是

- A: 心率加快
- B: 流泪
- C: 一过性针刺感
- D: 鼻黏膜充血

**答案：A**

9. 氨基糖苷类的主要排泄途径是

- A: 主要经呼吸道排泄
- B: 主要经肾脏排泄
- C: 主要经肝脏清除
- D: 经肝、肾双途径清除

**答案：B**

10. 妊娠期妇女合 8 岁以下儿童禁用的抗生素是

- A: 大环内酯类
- B: 青霉素类
- C: 头孢菌素类
- D: 四环素类

**答案：D**

11. 不属于氨基糖苷类的是

- A: 新霉素
- B: 庆大霉素
- C: 妥布霉素
- D: 异烟肼

**答案：D**

12. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

- A: 磺胺甲唑
- B: 甲状腺素
- C: 格列喹酮
- D: 普萘洛尔

**答案：B**

13. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

- A: 过氧苯甲酰
- B: 异维 A 酸
- C: 维 A 酸
- D: 阿达帕林

**答案：B**

14. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

- A: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌
- B: 肾功能损害
- C: 多毛、痤疮
- D: 子宫不规则出血

**答案：D**

15. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 长效  $\beta_2$  受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- B: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素+短效 M 胆碱受体阻断剂
- D: 吸入性糖皮质激素+长效  $\beta_2$  受体激动剂

**答案：D**

16. 利那洛肽为泻药的作用机制是

- A: 选择性、高亲和力的 5-HT<sub>4</sub> 受体激动剂，可通过 5-HT<sub>4</sub> 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性
- B: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用
- C: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- D: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

**答案：D**

17. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 氯丙嗪
- B: 甲氧氯普胺
- C: 帕洛诺司琼
- D: 劳拉西泮

**答案：D**

18. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多潘立酮
- C: 胰酶
- D: 莫沙必利

**答案：C**

19. 红霉素的抗菌作用机制()

- A: 影响胞浆膜通透性
- B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- C: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶
- D: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

**答案：D**

20. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 低剂量抑制纤溶酶原的活化作用
- B: 对慢性渗血效果较差
- C: 高剂量直接抑制纤溶酶的蛋白溶解酶活性
- D: 口服或静脉给药起效较快

**答案：B**

21. 糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

- A: 大剂量冲击疗法
- B: 小剂量替代疗法
- C: 隔日一次给药法
- D: 一般剂量长期疗法

**答案：A**

22. 抗酸作用较强、较慢，有导泻作用的是

- A: 氢氧化镁
- B: 三硅酸镁
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化铝

**答案：A**

23. 应用雌激素时需要停药的指征是

- A: 突破性出血
- B: 肝功异常
- C: 性欲改变
- D: 乳房胀痛

**答案：A**

24. （2020 年真题）哮喘急性发作首选的药物是

- A: 羧甲司坦口服液
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- D: 孟鲁司特片

**答案：B**

25. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

- A: 导致坏死性结肠炎
- B: 易产生沉淀
- C: 增加肝毒性
- D: 增加心脏毒性

**答案：B**

26. 与柔红霉素合用，可能增加心脏毒性的是

- A: 放线菌素
- B: 氧烯洛尔
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 肝素

**答案：B**

27. (2021 年真题) 属于维生素 K 拮抗剂的抗凝血药物是 ( )

- A: 华法林
- B: 利伐沙班
- C: 氯吡格雷
- D: 依诺肝素

**答案：A**

28. 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PS) 水平
- B: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮
- C: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- D: 易引起直立性低血压

**答案：D**

29. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 甲苯咪唑
- B: 氯喹
- C: 甲硝唑
- D: 吡嗪酮

**答案：B**

30. 属于毛细血管止血药的是

- A: 艾曲泊帕乙醇胺
- B: 酚磺乙胺
- C: 甲萘氢醌
- D: 氨甲环酸

**答案：B**

31. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是()。

- A: 噻嘧啶
- B: 甲硝唑
- C: 阿苯达唑
- D: 吡喹酮

**答案：D**

32. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

- A: 格列美脲
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 沙格列汀

**答案：C**

33. 对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染有效的抗生素为

- A: 氨曲南
- B: 哌拉西林
- C: 阿莫西林
- D: 万古霉素

**答案：D**

34. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 乳果糖
- C: 甘油
- D: 硫酸镁

**答案：B**

35. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- B: 修复消化道黏膜
- C: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- D: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

**答案：D**

36. 须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 多柔比星
- C: 曲妥珠单抗
- D: 吉非替尼

**答案：B**

37. 下列描述中，哪一项是胰岛素的禁忌证

- A: 用于细胞内缺钾
- B: 酮症酸中毒
- C: 胰岛素抵抗

D: 对胰岛素过敏和低血糖者

**答案：D**

38. 抑制 DNA 回旋酶，使 DNA 复制受阻，导致 DNA 降解而细菌死亡的药物是

A: 红霉素

B: 利福平

C: 甲氧苄啶

D: 诺氟沙星

**答案：D**

39. 维生素 A 的适应证不包括

A: 夜盲症

B: 干眼病

C: 坏血病

D: 角膜软化

**答案：C**

40. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗()

A: 纤维瘤

B: 脑瘤

C: 慢性淋巴细胞性白血病

D: 恶性淋巴瘤

**答案：B**

41. 属于胃黏膜保护药的是

A: 多潘立酮

B: 胶体果胶铋

C: 熊去氧胆酸

D: 山莨菪碱

**答案: B**

42. 下述关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是()

A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

B: 为强还原剂，极易分解

C: 可分解出新生态氧而发挥作用

D: 可导致皮肤干燥

**答案: B**

43. 下列关于苯二氮类镇静催眠药的叙述，不正确的是

A: 服用药物后应避免驾车、操纵机器和高空作业

B: 老年患者对苯二氮类药物不敏感，可安全使用

C: 长期应用会产生依赖性和成瘾性，避免长期使用同一种药

D: 服药期间不宜饮酒

**答案: B**

44. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

A: 长效硝酸酯类+普萘洛尔

B: 维拉帕米+氢氯噻嗪

C: 短效硝酸酯类+螺内酯

D: 维拉帕米+普萘洛尔

**答案: A**

45. 布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

A: 100 倍

B: 25 倍

C: 15 倍

D: 40 倍

**答案：D**

46. 可以改善心肌缺血的是

A: 葡萄糖

B: 果糖

C: 维生素

D: 脂肪乳

**答案：B**

47. (2015 年真题) 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用 ( )。

A: 碘苷滴眼液

B: 复方托吡卡胺滴眼液

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 左氧氟沙星滴眼液

**答案：B**

48. 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

A: 法莫替丁

B: 雷尼替丁德

C: 奥美拉唑

D: 雷贝拉唑

**答案：C**

49. 阿哌沙班属于 ( )

- A: 凝血因子 X 抑制剂
- B: 直接凝血酶抑制剂
- C: 环氧酶抑制剂
- D: 维生素 K 拮抗剂

**答案：A**

50. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 甲苯氢醌
- C: 酚磺乙胺
- D: 鱼精蛋白

**答案：B**

51. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

- A: 甲状腺片
- B: 复方碘口服液
- C: 卡比马唑片
- D: 甲巯咪唑片

**答案：D**

52. 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是()。

- A: 睫状肌麻痹患者
- B: 青光眼患者
- C: 眼底检查者
- D: 虹膜睫状体炎患者

**答案：B**

53. 下述不属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 前列腺素
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 硫糖铝
- D: 谷氨酰胺

**答案：D**

54. 氟替卡松吸入气雾剂用于轻度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 50~100  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次
- B: 一次 100~250  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次
- C: 一次 250~500  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次
- D: 一次 500~1000  $\mu\text{g}$ ，一日 2 次

**答案：B**

55. 维生素 K

- A: 促进凝血因子合成
- B: 促进纤溶
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

**答案：A**

56. 与受体结合及解离速度较快,较少引起严重低血糖的磺酰脲类药物是()

- A: 格列吡嗪
- B: 格列齐特
- C: 格列喹酮
- D: 格列美脲

**答案：D**

57. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 紫杉醇
- C: 多柔比星
- D: 博来霉素

**答案：C**

58. 进行透析的急、慢性。肾衰竭患者静脉滴注复方氨基酸注射液（9AA），滴速为

- A: 滴速 20~30 滴 / 分
- B: 滴速 80~100 滴 / 分
- C: 不超过 15 滴 / 分
- D: 不超过 40 滴 / 分

**答案：C**

59. （2015 年真题）治疗青光眼宜选用（）。

- A: 左氧氟沙星滴眼液
- B: 复方托吡卡胺滴眼液
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

**答案：C**

60. 激动岛受体，对慢性心力衰竭疗效较好（）

- A: 多巴酚丁胺
- B: 地高辛
- C: 硝普钠
- D: 氨力农

**答案：A**

61. 下列说法中错误的是

- A: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药
- B: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑
- C: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- D: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

**答案：D**

62. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 顺铂
- B: 卡铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 奥沙利铂

**答案：A**

63. 属于 I A 类抗心律失常药

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 奎尼丁

**答案：D**

64. 下列药物中，不属于雌激素的是

- A: 雌二醇
- B: 黄体酮
- C: 尼尔雌醇
- D: 雌三醇

**答案：B**

65. (2021 年真题) 可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是 ( )

- A: 特拉唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 赛洛多辛
- D: 多沙唑嗪

**答案: B**

66. 阿司匹林预防血栓形成的机制是

- A: 抑制 PABA 的合成
- B: 抑制 TXA<sub>2</sub> 的合成
- C: 促进 PG 的合成
- D: 抑制 GABA 的合成

**答案: B**

67. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应

- A: 眼部水肿
- B: 白细胞减少
- C: 中枢神经系统毒性
- D: 白细胞增高

**答案: C**

68. 属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是 ( )

- A: 利那洛肽
- B: 欧车前
- C: 番泻叶
- D: 多库酯钠

**答案：A**

69. 环磷酰胺属于哪一类抗肿瘤药物

- A: 抗代谢抗肿瘤药
- B: 抗肿瘤抗生素
- C: 抗肿瘤金属配合物
- D: 烷化剂

**答案：D**

70. 华法林抗血栓形成的最大效应时间为

- A: 3 天
- B: 5~7 天
- C: 2min
- D: 6 天

**答案：D**

71. 对阴道滴虫有很好疗效的是

- A: 链霉素
- B: 甲硝唑
- C: 青蒿素
- D: 二氯沙奈

**答案：B**

72. 下列不属于雌激素作用部位的是

- A: 子宫
- B: 阴道
- C: 输卵管
- D: 肾脏

**答案：D**

73. 下述药物中不属于消毒防腐药的是

- A: 氨茶碱
- B: 过氧乙酸
- C: 戊二醛
- D: 硼酸

**答案：A**

74. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用()

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 阿法骨化醇
- C: 依降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

**答案：D**

75. 治疗青光眼宜选用

- A: 托吡卡胺滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

**答案：B**

76. (2016 年真题) 属于 5-HT<sub>3</sub> 受体阻断剂的止吐药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 维生素 B<sub>6</sub>
- C: 阿瑞吡坦
- D: 托烷司琼

**答案：D**

77. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

- A: 哌拉西林
- B: 氯霉素
- C: 林可霉素
- D: 庆大霉素

**答案：A**

78. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

- A: 餐后 1 小时
- B: 餐前 1 分钟
- C: 餐前 2 小时
- D: 餐后半小时

**答案：B**

79. 克罗米通乳膏用于治疗

- A: 寻常痤疮
- B: 蛲虫感染
- C: 体、股癣
- D: 疥疮

**答案：D**

80. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

- A: 可用于呆小病的治疗
- B: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代

C: 成人初始剂量 25~50  $\mu\text{g}$ ，一日 1 次

D: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

**答案：D**

81. 属于Ⅱ类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是()

A: 普萘洛尔

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 胺碘酮

**答案：C**

82. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

A: 氨甲环酸

B: 维生素 K<sub>1</sub>

C: 尿激酶

D: 低分子肝素

**答案：B**

83. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性，骨髓功能抑制相对较轻的是()

A: 顺铂

B: 奥沙利铂

C: 亚叶酸钙

D: 卡铂

**答案：A**

84. 属于雌激素类的是

A: 他莫昔芬

- B: 睾酮
- C: 甲地孕酮
- D: 己烯雌酚

**答案: D**

85. 可增加肝毒性的药物是

- A: 利福平
- B: 阿糖胞苷
- C:  $\beta$  受体阻断剂
- D: 甲氨蝶呤

**答案: A**

86. (2015 年真题) 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是 ( )。

- A: 多索茶碱
- B: 泼尼松龙
- C: 左氧氟沙星
- D: 羧甲司坦

**答案: D**

87. 既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

- A: 氢氧化镁
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 罗格列酮

**答案: C**

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/226224012110011030>