

2024 年安徽省天长市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库【含答案】

第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2017 年真题）患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 利血平+氨苯蝶啶
- B: 氨氯地平+氢氯噻嗪
- C: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪
- D: 硝酸甘油+美托洛尔

答案：B

2. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次/日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次/日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次/日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次/日；替米沙坦 40mg，口服，1 次/日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次/日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次/日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次/日。

- A: 克拉霉素
- B: 硝苯地平缓释片
- C: 胶体果胶铋胶囊

D: 埃索美拉唑

答案: D

3. (2021 年真题) 痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是
()

A: 哌拉西林他唑巴坦

B: 苯唑西林

C: 苄星青霉素

D: 青霉素 G

答案: A

4. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

A: 甲羟孕酮

B: 乙烯雌酚

C: 氟他胺

D: 他莫昔芬

答案: C

5. 属于多烯类的是

A: 特比萘芬

B: 制霉菌素

C: 氟胞嘧啶

D: 卡泊芬净

答案: B

6. 对曲霉属无效的药物是 ()

A: 伊曲康唑

B: 氟康唑

C: 伏立康唑

D: 两性霉素 B

答案: B

7. 长期或大剂量使用质子泵抑制剂可导致的不良反应是

A: 腹泻

B: 血浆泌乳素升高

C: 呃逆、腹胀

D: 髌骨、腕骨骨折

答案: D

8. 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 头孢呋辛

B: 磺胺甲恶唑

C: 左氧氟沙星

D: 克林霉素

答案: B

9. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是 ()

A: 坦洛新

B: 特拉唑嗪

C: 十一酸睾酮

D: 西地那非

答案: A

10. 某病人服用溴己新，不会出现下列哪种不良反应

A: 腹泻

B: 心动过速

C: 支气管痉挛

D: 体位性低血压

答案：A

11. (2017 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()

A: 托吡卡胺滴眼剂

B: 拉坦前列素滴眼剂

C: 碘苷滴眼剂

D: 氯霉素滴眼剂

答案：B

12. 主要经胆汁排泄的抗生素是

A: 头孢甲肟

B: 头孢哌酮

C: 青霉素

D: 美洛西林

答案：B

13. 属于促血小板生成药的是

A: 酚磺乙胺

B: 甲萘氢醌

C: 艾曲泊帕乙醇胺

D: 氨甲环酸

答案：C

14. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

A: 苯巴比妥

B: 利福平

C: 四环素

D: 环孢素

答案: D

15. 高血压合并脑血管功能不全不宜选用

A: 胍屈嗪

B: 普萘洛尔

C: 氢氯噻嗪

D: 胍乙啶

答案: D

16. 可引起眼睛疼痛不适的是

A: 氨溴索

B: 沙丁胺醇

C: 喷托维林

D: 噻托溴铵

答案: D

17. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

A: 定期复查血常规、肝肾功能

B: 如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性

C: 侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑

D: 出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定

答案：D

18. 属于抗炎类保肝药的是

A: 甘草酸二铵

B: 还原型谷胱甘肽

C: 熊去氧胆酸

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：A

19. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

A: 5-氟尿嘧啶

B: 多柔比星

C: 环磷酰胺

D: 吉非替尼

答案：A

20. 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是 ()。

A: 替考拉宁

B: 舒巴坦

C: 利福平

D: 磷霉素

答案：C

21. 需停 5 周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A: 吡拉西坦

B: 吗氯贝胺

C: 氟西汀

D: 文拉法辛

答案: C

22. 茶碱浓度 15-20ug/ml 时可出现

A: 呼吸、心跳停止

B: 恶心、呕吐、失眠

C: 心动过速、心律失常

D: 为有效的治疗浓度

答案: B

23. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

A: 坎利酮

B: 伐地那非

C: 丙酸睾酮

D: 呋塞米

答案: D

24. 正常成人一次口服 20mg / kg，1 小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为 2 小时，连续服药 7 日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出 8%~16%，随粪便排出 82%~94%的是

A: 唑来膦酸

B: 帕米膦酸二钠

C: 依替膦酸二钠

D: 阿仑膦酸钠

答案: C

25. 新生儿出血宜选用

- A: 香豆素类
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 K1
- D: 肝素

答案：C

26. 氯霉素的抗菌作用机制

- A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 影响胞浆膜通透性

答案：A

27. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

- A: 灰黄霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 酮康唑
- D: 特比萘芬

答案：B

28. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是

- A: 氯化钠
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钾
- D: 氯化钙

答案：C

29. 首选用于伤寒、副伤寒的是()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 克林霉素
- D: 两性霉素 B

答案：A

30.（2016 年真题）属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 阿昔莫司
- D: 依折麦布

答案：A

31. 硫酸亚铁临床应用

- A: 急性中性粒细胞减少症
- B: 缺铁性贫血
- C: 缺血性脑卒中
- D: 失去药效

答案：B

32. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 高血钠
- B: 高血钾
- C: 高血镁
- D: 碱中毒

答案：B

33. 下列不属于雌激素作用部位的是

- A: 肾脏
- B: 阴道
- C: 子宫
- D: 输卵管

答案：A

34. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物的是

- A: 罗红霉素
- B: 红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 克林霉素

答案：B

35. 碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

- A: 卡马西平
- B: 拉莫三嗪
- C: 苯巴比妥
- D: 丙戊酸钠

答案：D

36. 盐酸多柔比星属于

- A: 生物碱类
- B: 抗肿瘤抗生素类
- C: 烷化剂
- D: 抗代谢类抗肿瘤药物

答案：B

37. 治疗侵袭性念珠菌病首选()

- A: 氟胞嘧啶
- B: 伏立康唑
- C: 氟康唑
- D: 灰黄霉素

答案: C

38. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 3 周
- B: 2 周
- C: 1 周
- D: 4 周

答案: B

39. 氨茶碱的主要平喘机制为()

- A: 激活鸟苷酸环化酶
- B: 抑制腺苷酸环化酶
- C: 直接舒张支气管
- D: 抑制磷酸二酯酶

答案: D

40. 属于抗菌增效剂的是

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氧氟沙星

D: 呋喃唑酮

答案：A

41. (2018 年真题) 具有强大的抗凝血因子 Xa 功能及微弱的抗凝血酶作用, 可用于预防深静脉血栓形成的药物是 ()

A: 阿加曲班

B: 华法林

C: 那屈肝素钙

D: 尿激酶

答案：C

42. 地高辛与其合用, 可使血清地高辛浓度增加 70%~100% 的药物是

A: 阿利吉仑

B: 沙库巴曲缬沙坦

C: 阿托品

D: 胺碘酮

答案：D

43. 治疗可能引起中枢神经系统毒性, 包括精神状态改变、肌阵挛和癫痫发作, 故不应用于治疗脑膜炎的是

A: 西司他丁

B: 美罗培南

C: 厄他培南

D: 亚胺培南

答案：D

44. 长期大量服用维生素 B6 会出现

A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

C: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：C

45. 罗格列酮的降糖作用机制是

A: 直接补充胰岛素

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶

D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：D

46. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌证()

A: 心力衰竭患者

B: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

C: 有子宫内膜癌症状和体征者

D: 肝、肾功能不全者

答案：A

47. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 硫酸亚铁

B: 四氢叶酸

C: 叶酸

D: 维生素 B12

答案：A

48. 患儿，女，10 岁，体重 35kg，因发热、咳嗽 10 日而入院。体温波动于 38.5℃~39.5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共 6 日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X 线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

- A: 12 日
- B: 10 日
- C: 7 日
- D: 5 日

答案：C

49. (2015 年真题) 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是 ()。

- A: 二甲双胍
- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 西格列汀

答案：D

50. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是 ()

- A: 红霉素
- B: 庆大霉素
- C: 阿昔洛韦
- D: 咪康唑

答案：D

51. 可增加肝毒性的药物是

- A: 阿糖胞苷

B: 利福平

C: 甲氨蝶呤

D: β 受体阻断剂

答案: B

52. 下列哪个药物没有散瞳作用

A: 托吡卡胺

B: 硫酸阿托品

C: 去氧肾上腺素

D: 毛果芸香碱

答案: D

53. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

A: 环丙沙星

B: 氧氟沙星

C: 头孢菌素

D: 多西环素

答案: C

54. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是()

A: 乙酰唑胺

B: 依托塞米

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

答案: C

55. 肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

- A: 抑制钾的排泄
- B: 抑制钙的排泄
- C: 抑制磷的排泄
- D: 抑制钠的排泄

答案：D

56. 治疗轻度尿崩症可选用

- A: 呋塞米
- B: 螺内酯
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

57. 以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

- A: 诱发癫痫
- B: 电解质紊乱
- C: 伤口愈合缓慢
- D: 心律失常

答案：D

58. （2015 年真题）属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是（ ）。

- A: 氯吡格雷
- B: 奥扎格雷
- C: 替罗非班
- D: 阿司匹林

答案：C

59. (2019 年真题) 长期用药易发生低镁血症的药物是 ()

- A: 复方碳酸钙
- B: 胶体果胶铋
- C: 替普瑞酮
- D: 奥美拉唑

答案: D

60. 属于抗反转录病毒药物的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 司他夫定
- C: 奥司他韦
- D: 恩替卡韦

答案: B

61. 对癫痫小发作疗效最好的药物是

- A: 乙琥胺
- B: 地西泮
- C: 卡马西平
- D: 氯硝西泮

答案: A

62. 下述药物中兼有角质溶解和抑制真菌作用的是

- A: 阿莫罗芬
- B: 咪康唑
- C: 苯甲酸
- D: 特比萘芬

答案: C

63. 能明显抑制骨髓造血功能的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 氯霉素
- C: 红霉素
- D: 青霉素 G

答案：B

64. 属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

- A: 普通胰岛素
- B: 门冬胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

65. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是
()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案：D

66. 中毒后可用维生素 B6 来对抗的抗结核药是

- A: 异烟肼
- B: 利福平

C: 对氨基水杨酸

D: 乙胺丁醇

答案: A

67. 能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物是

A: 广谱抗生素

B: 甲苯磺丁脲

C: 阿司匹林

D: 苯巴比妥

答案: D

68. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是()

A: 口服后吸收不完全

B: 肾脏排泄速度快

C: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

D: 肝内代谢转化快

答案: C

69. 可待因与阿片受体阻断剂合用，会出现

A: 成瘾性

B: 依赖性

C: 耐受性

D: 戒断症状

答案: D

70. 下列药物属于肾素抑制剂的是()

A: 阿利克仑

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 卡托普利

答案: A

71. 丙戊酸钠的严重毒性是

A: 再生障碍性贫血

B: 抑制呼吸

C: 肝功能损害

D: 口干、皮肤干燥

答案: C

72. 关于复方氢氧化镁的叙述，下列哪项是正确的

A: 不影响排便

B: 口服易吸收

C: 中和胃酸作用强而迅速

D: 对溃疡面有保护作用

答案: C

73. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是()

A: 地高辛

B: 米力农

C: 毛花苷丙

D: 螺内酯

答案: B

74. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 依米丁

B: 甲硝唑

C: 二氯尼特

D: 氯喹

答案: B

75. 用于肾病的氨基酸制剂的是

A: 复方氨基酸注射液 (6AA)

B: 复方氨基酸注射液 (18AA)

C: 复方氨基酸注射液 (9AA)

D: 赖氨酸注射液

答案: C

76. 头孢曲松 ()

A: 肾毒性较大

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

C: 用于非典型致病原感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案: B

77. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

A: 双嘧达莫

B: 噻氯匹定

C: 氯吡格雷

D: 氨甲环酸

答案: D

78. 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是

- A: 泼尼松片 30mgq
- B: 泼尼松片 50mgqD
- C: 地塞米松片 10mgqD
- D: 泼尼松片 20mgqD

答案：B

79. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

- A: 链霉素
- B: 妥布霉素
- C: 庆大霉素
- D: 奈替米星

答案：D

80. 局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

- A: 泼尼松
- B: 氢化可的松
- C: 倍他米松
- D: 地塞米松

答案：D

81. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: 2mg / kg
- B: 6mg / kg
- C: 4mg / kg
- D: 8mg / kg

答案：B

82. 前列腺素类似物的不良反应不包括

- A: 眼睑水肿和红斑
- B: 角膜病变
- C: 虹膜颜色加深
- D: 眼部刺激症状

答案：B

83. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

- A: 卡莫氟
- B: 来曲唑
- C: 喜树碱
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

84. 属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体抑制剂的是

- A: 替格雷洛
- B: 替罗非班
- C: 噻氯匹定
- D: 氯吡格雷

答案：B

85. 关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

- A: 可抑制外周组织的 T
- B: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高
- C: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌
- D: 作用较甲巯咪唑弱

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 高血压伴甲状腺功能亢进者宜选用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/227024003053010024>