

## 执业医师考试公共卫生执业(习题卷23)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]某男患，23岁，被确诊为再生障碍性贫血而住入某院。患者认为"再障"是不治之症而拒绝一切治疗措施，甚至摔碎注射器。医务人员始终保持积极、耐心、和蔼的态度，一方面反复开导，讲解有关知识，陈述利害关系，一方面精心治疗，获得病人信任。在病人主动配合下。通过中西医结合治疗，使病人好转出院。这个病人出院至今已生存20余年，并建立了幸福的家庭在这个病人的治疗中，哪一点最能体现医师的美德

- A) 重人贵于重病
- B) 医师的工作是崇高、繁重、有风险的工作
- C) 推动自己促进和维护病人利益
- D) 以上各点都符合医师的美德
- E) "仁者爱人"包括利人、关怀人

2. [单选题]妊娠合并肝炎，下述处理哪项正确

- A) 妊娠早期安胎
- B) 妊娠中期需终止妊娠
- C) 妊娠晚期及早终止妊娠
- D) 终止妊娠前用维生素K
- E) 应以剖宫产终止妊娠

3. [单选题]关于引发剂(启动剂)的特点，不正确的是

- A) 引发剂本身具有致癌性
- B) 引发剂可与DNA发生反应
- C) 有可检测的阈剂量
- D) 大多数是致突变物
- E) 引发作用是不可逆的

4. [单选题]良心是

- A) 医务人员对他人所负道德责任的评价能力
- B) 医务人员对他人行为的评判
- C) 医务人员对他人和社会所负的道德责任
- D) 医务人员内心世界的自然流露
- E) 医务人员对自己所负道德责任的自我感知能力

5. [单选题]与基础代谢率呈正比的是

- A) 身高
- B) 体重
- C) 腰围
- D) 体表面积
- E) 体重指数

6. [单选题]胆总管的血液供应主要来自

- A) 肝固有动脉
- B) 胆囊动脉
- C) 胃十二指肠动脉
- D) 肝右动脉
- E) 肝左动脉

7. [单选题] 脂肪乳化主要物质

- A) 贮能和供能
- B) 磷脂，胆固醇和不饱和脂肪酸
- C) 前列腺素，血栓烷及白三烯
- D) 胆汁酸盐，辅脂酶与胰脂酶
- E) 小肠

8. [单选题] 谷类食品保留哪部分容易引起食物的变质

- A) 谷皮
- B) 吸收层
- C) 糊粉层
- D) 胚乳
- E) 胚

9. [单选题] 致突变试验的质量控制应通过

- A) 以上都不是
- B) 设立阴性对照
- C) 盲法观察
- D) 以上都是
- E) 设立阳性对照

10. [单选题] 可直接激活蛋白激酶C的是

- A) cAMP
- B) cGMP
- C) IP3
- D) DG
- E) PIP2

11. [单选题] 成熟红细胞所需能量来自

- A) 糖的无氧酵解
- B) 糖的有氧氧化
- C) 磷酸戊糖途径
- D) 乳酸生成反应
- E) 2, 3-二磷酸甘油酸支路

12. [单选题] 男性，45岁，上腹痛6小时，腹胀，呕吐，血压80 / 50mmHg，脉搏120次 / 分，血淀粉酶250somogyiU，下列判定哪项不合适

- A) 急性肠梗阻
- B) 急性胰腺炎出血坏死型
- C) 消化性溃疡急性穿孔
- D) 急性心肌梗死
- E) 可排除急性胰腺炎

13. [单选题] 8岁患儿，3周前曾患脓疱病。水肿、少尿、肉眼血尿3天，BP：150 / 105?mmHg. 尿常规：蛋白(+)，大量红细胞，管型1~2 / HP. ASO升高，红细胞沉降率增快，血补体C3下降。[问题1][题]应限制钠摄入量直到

- A) 红细胞沉降率正常
- B) 尿常规正常
- C) 水肿消退，血压正常
- D) 补体恢复正常
- E) 肉眼血尿消失

14. [单选题]"行政许可"是一项重要的法律制度。下列法律法规中，哪一个没有明确的《行政许可》条文的规定

- A) 《传染病防治法》
- B) 《公共场所卫生管理条例》
- C) 《食品卫生法》
- D) 《化妆品卫生管理条例》
- E) 《医疗机构管理条例》

15. [单选题]可引起男子乳房女性化和妇女多毛症的药物是

- A) 甘露醇
- B) 螺内酯
- C) 呋塞米
- D) 糖皮质激素
- E) 氢氯噻嗪

16. [单选题]神经细胞动作电位的幅度接近于

- A) 静息电位绝对值与钠平衡电位之和
- B) 钠平衡电位
- C) 钾平衡电位
- D) 静息电位绝对值与钠平衡电位之差
- E) 静息电位绝对值与局部电位之和

17. [单选题]阿托品中毒是可用下列何药治疗

- A) 毛果芸香碱
- B) 酚妥拉明
- C) 东莨菪碱
- D) 后马托品
- E) 山莨菪碱

18. [单选题]病例对照研究方法最大的优点是

- A) 设立对照
- B) 属于观察法
- C) 可研究一种疾病与多种因素的关系
- D) 随机分组
- E) 偏倚小

19. [单选题]垂体泌乳素腺瘤妇女的高泌乳素血症长期不予治疗可发生

- A) 低钾血症
- B) 高血压
- C) 骨质疏松症
- D) 低蛋白血症
- E) 甲状腺功能减退

20. [单选题]碳酸锂的作用机制是

- A) 使突触间隙的NA浓度下降
- B) 对心肌有奎尼丁样作用

- C) 阻断N胆碱受体
- D) 阻断D1、D2受体
- E) 以上均不是

21. [单选题]社区健康促进的目标人群是 ( )

- A) 妇女
- B) 儿童
- C) 老年人
- D) 慢性病患者
- E) 全部社区居民

22. [单选题]李某，从事人体测量学的研究。为了设计出合适的机器和工具，他认为要特别重视人体的尺寸参数。静态测量数据，不包括

- A) 身高
- B) 坐高
- C) 脚部活动范围
- D) 胸围
- E) 头围

23. [单选题]卵巢肿瘤蒂扭转的主要症状是

- A) 急性腹痛
- B) 发热
- C) 恶性呕吐
- D) 白细胞升高
- E) 休克

24. [单选题]52岁脑梗死患者，病后第3天，意识不清，血压19 / 14kPa，左侧偏瘫。颅内压2.74kPa (280mmH2O)，宜首先选用

- A) 降血压治疗
- B) 扩血管治疗
- C) 尿激酶静脉点滴
- D) 20%甘露醇静脉点滴
- E) 肝素静脉点滴

25. [单选题]患者男性，69岁。患高血压20年，2年前患急性前壁心肌梗死，门诊测血压22.7/13.3kPa (170/100mmHg)，心率120次/分，该患者最佳的治疗药物是

- A) 维拉帕米
- B) 吲达帕胺
- C) 呋噻嗪
- D) 美托洛尔
- E) 卡托普利

26. [单选题]患者，32岁，人流1年后，近日咳嗽，咳血丝痰，肺片示肺多个结节影，血hCG定量明显升高，诊断：绒毛肺转移人化疗治疗方案应首选

- A) 5-FU+KSM
- B) MTX (氨甲蝶呤)
- C) 顺铂
- D) 5-Fu (5-氟尿嘧啶)
- E) KSM (更生霉素)

27. [单选题]患者36岁女性，主诉外阴瘙痒、灼痛，白带增多呈白色黏稠豆渣样，医生查体时可见小阴唇内侧和阴道黏

膜覆盖白色膜状物，可初步诊断为

- A) 滴虫性阴道炎
- B) 老年性阴道炎
- C) 细菌性阴道炎
- D) 外阴阴道念珠菌病
- E) 宫颈炎

28. [单选题]关于甲基汞损害健康的正确论点是

- A) 经食物摄入汞导致汞中毒
- B) 甲基汞的碳汞链不稳定
- C) 是进行性、不可逆性的病理损害
- D) 经饮水摄入汞导致汞中毒
- E) 汞经肠道吸收入血液

29. [单选题]甲地区一年内发生肺癌患者100例，选取100例做吸烟与肺癌关系的调查，结果肺癌组吸烟者为80%，对照组中吸烟者为20%；在乙地区，调查了5万居民的吸烟状况，并观察了其经过。一年后吸烟者中有10例发生了肺癌，不吸烟者仅2例发生率肺癌。下列叙述正确的是

- A) 甲地区的调查结果，肺癌组的吸烟率为对照组的4倍
- B) 甲地区的调查是生态学研究
- C) 乙地区的调查结果，吸烟组的肺癌发生率为对照组的5倍
- D) 乙地区的调查是回顾性调查
- E) 甲、乙两地区调查均属观察性研究

30. [单选题]关于骨盆狭窄的诊断，哪项是错误的

- A) 入口前后径长 $<10\text{cm}$ 为骨盆入口狭窄
- B) 骨盆各径线比正常值小 $1\text{cm}$ 为均小骨盆
- C) 坐骨棘间径 $9\text{cm}$ 为中骨盆狭窄
- D) 耻骨弓 $<80^\circ$ 可能为骨盆出口狭窄
- E) 骨盆出口横径+后矢状径= $15\text{cm}$ 属于正常范围

31. [单选题]患者男性，45岁，因腹胀、乏力、食欲缺乏5天来诊，10年前体检发现HBsAg (+)，HBeAg (+)，ALT正常，口服中药断续治疗，有长期大量饮酒史。家中母亲及2个兄弟均为乙肝患者。查体：意识清楚，面色晦暗，无明显黄染，肝肋下未触及，脾肋下 $3\text{cm}$ ，腹水征 (+)。实验室检查：ALT $50\text{U/L}$ ，HBV-DNA $2\times 10^5\text{copie/ml}$ 。[问题1][题]该患者最重要的治疗是

- A) 免疫治疗
- B) 保肝治疗
- C) 抗病毒治疗
- D) 对症治疗
- E) 抗纤维化治疗

32. [单选题]在石棉厂工作35年的55岁男性病人，9年前出现咳嗽、呼吸困难，伴局部胸痛。咳痰量不多，痰中查出石棉小体，肺活量降低，X线胸片有不规则小阴影和胸膜改变、肺纹理改变及肺气肿。近几个月发现一侧胸壁显现不规则突起，沿胸外侧壁胸膜自下而上生长，再沿胸内侧延伸，该工人可能患的是

- A) 石棉肺、肺鳞癌
- B) 肺癌、肺气肿
- C) 石棉肺、胸膜炎
- D) 硅酸盐肺、肺腺癌
- E) 石棉肺、胸膜间皮瘤

33. [单选题]为评价某疫苗的流行病学效果，其随访结果见下表：

该疫苗的保护率是

组别	接种人数	病例数
接种组	1000	10
对照组	1000	40

- A) 30%
- B) 80%
- C) 50%
- D) 90%
- E) 75%

34. [单选题]据世界卫生组织的调查，人类疾病80%与水有关。水质不良可引起多种疾病，特别是地面水和浅井水极易受到病原体污染而导致介水传染病的发生。下列属于介水传染病的是

- A) 1987年在美国乔治亚州某地发生隐孢子虫病流行
- B) 日本富山县神通川地区发生的痛痛病
- C) 2000年山西某县由于含硫氰酸盐废水的排放导致一自然村居民出现头晕、恶心、呕吐、乏力等症状
- D) 早在20世纪50年代初期，日本发生水俣病事件
- E) 我国山东半岛某地由于饮用高氟水导致病区人口达70多万人

35. [单选题]男性，60岁，有呼吸衰竭缺氧伴二氧化碳潴留，采用氧疗时的给氧浓度，下列哪项是正确的

- A) <25%
- B) <30%
- C) <45%
- D) <55%
- E) <65%

36. [单选题]防龋工作的重点应放在哪类人群上

- A) 高中生和大学生
- B) 初中生和高中生
- C) 所有在校中小学生
- D) 小学生和中学生
- E) 幼儿园儿童和小学生

37. [单选题]周围血反应骨髓幼红细胞增生程度准确的指标是

- A) 血红蛋白和红细胞数
- B) 网织红细胞百分数
- C) 网织红细胞绝对数
- D) 出现有核红细胞
- E) 出现染色质小体

38. [单选题]患者女性，31岁，妊娠5个月。发现尿糖(+)，口服葡萄糖耐量试验结果：空腹血糖10.6mmol/L，既往无糖尿病史。最可能的诊断是

- A) 糖尿病合并妊娠
- B) 妊娠期糖尿病
- C) 糖耐量异常
- D) 肾性糖尿
- E) 继发性糖尿病

39. [单选题]某儿，孕36周出生，体重2kg，体温34℃，活动少，不能吸吮，四肢、躯干、臀部及面颊均硬肿，呼吸困难，肺部出现细湿啰音。最可能的诊断是

- A) 并发肺炎
- B) 败血症
- C) 心力衰竭
- D) 呼吸衰竭
- E) 肺出血

40. [单选题]孕期用药的基本原则应除外

- A) 尽量用大剂量药物治疗
- B) 妊娠早期应用对胚胎有害的药物应先终止妊娠再用药。
- C) 避免用对胎儿可能有不良影响的新药治疗
- D) 尽量用一种药物治疗
- E) 尽量用疗效肯定的药治疗

41. [单选题]诊断急性胰腺炎的重要依据是

- A) 下腹部疼痛
- B) 腹胀，排气、排便停止
- C) 肠鸣音减弱
- D) 血清淀粉酶超过正常值3倍
- E) 腹部X线平片

42. [单选题]医师注册后有下列情形，应由卫生行政部门注销注册，收回其执业证书

- A) 被责令暂停执业6个月的
- B) 被罚款的
- C) 受吊销医师执业证书行政处罚的
- D) 受警告行政处罚的
- E) 中止医师执业活动满1年的

43. [单选题]关于匹配的目的，下列叙述错误的是

- A) 平衡配比因素对病例组和对照组的影响
- B) 平衡混杂因素对病例组和对照组的影响
- C) 控制混杂因素对研究结果的影响
- D) 提高研究效率
- E) 消除已知混杂因素对研究结果的影响

44. [单选题]11个月，男孩。诊断为流感嗜血杆菌脑膜炎，经抗生素治疗2周后，病情好转，体温正常，近1天又出现发热，搐搦，前囟饱满，颅缝分离。应首先考虑的诊断是

- A) 脑膜炎后遗症
- B) 脑脓肿
- C) 脑水肿
- D) 硬膜下积液
- E) 脑膜炎复发

45. [单选题]某研究者欲了解某地正常成年男性和女性的红细胞总体平均水平是否有差异，随机抽样测定了该地40名正常成年男性和40名正常成年女性的红细胞数，算得男性红细胞均数为 $4.68 \times 10$

12

/L，标准差为 $0.57 \times 10$

12

/L; 女性红细胞均数为 $4.16 \times 10$

12

/L, 标准差为 $0.31 \times 10$

12

/L。若男性和女性红细胞数的总体方差相等, 欲比较该地正常成年男性和女性的红细胞数平均水平是否有差异, 宜选用

A)  $\chi^2$

2

检验

B) 配对t检验

C) 成组t检验

D) 配对设计差值的符号秩和检验

E) 成组设计两样本比较的秩和检验

46. [单选题]新生儿出生后24hX线呈“白肺”应考虑为

A) 新生儿肺炎

B) 新生儿窒息

C) 新生儿败血症

D) 新生儿缺氧缺血性脑病

E) 新生儿肺透明膜病

47. [单选题]直线回归与相关分析中, 回归系数 $b = -2.689, P < 0.05$ , 则

A) 回归直线斜率等于零

B) 相关系数 $r$ 小于零

C) 相关系数 $r$ 大于零

D) 截距 $a$ 一定等于1

E) 截距 $a$ 一定等于-1

48. [单选题]继发性腹膜炎不应包括下列哪一项

A) 可发生于腹腔内急性炎症

B) 可发生于肝硬化腹腔积液病人

C) 可发生于腹腔内脏器穿孔

D) 可发生于腹腔内脏器的损伤破裂

E) 可发生于手术污染

49. [单选题]以下关于结核病说法错误的是

A) 结核分枝杆菌通过呼吸道首次侵入人体为原发感染

B) 原发感染的结核菌沿淋巴管进入到血液中可导致血行播散

C) 机体感染结核分枝杆菌后是否发病受到细菌毒力、侵入机体的菌量以及机体自身免疫力的影响

D) 肺结核潜在感染者虽无结核病的临床表现, 但会传播结核病

E) 婴幼儿容易发生活动性结核病

50. [单选题]初产妇, 急产娩出一男婴, 体重3900g, 胎盘娩出后半小时内有较多量间歇性阴道出血, 色红, 宫底, 宫颈及肌肉已注催产素10单位, 再次查看胎盘完整, 胎膜有一处见血管中断于胎膜边缘, 究其出血原因最可能是

A) 软产道损伤

B) 胎盘残留

C) 凝血功能障碍

D) 胎盘剥离不全

E) 产后宫缩乏力



51. [单选题]移植器官超急排斥反应是由于
- A) 供体内预存有抗受体的ABO血型抗体
  - B) 供体内预存有抗受体的HLA-I类抗原的抗体
  - C) 受体内预存有抗供体的ABO血型抗体
  - D) 受体内有针对供体组织器官的Tc细胞
  - E) 移植物中含有足够数量的免疫细胞
52. [单选题]心肌自律性最高的部位是
- A) 窦房结
  - B) 心房肌
  - C) 房室交界
  - D) 浦肯野纤维
  - E) 心室肌
53. [单选题]枕左前位分娩时，与胎儿双肩径进入骨盆入口的同时，胎头的动作是
- A) 外旋转
  - B) 仰伸
  - C) 拨露
  - D) 着冠
  - E) 复位
54. [单选题]某肠痉挛截瘫患者在炎热环境中服用阿托品后，出现发热副作用，将其转移至凉爽环境后，未做出其他处理，体温自行恢复正常，该患者最可能发热的原因是
- A) 散热中枢功能障碍
  - B) 产热中枢功能障碍
  - C) 调定点上移
  - D) 发汗功能障碍
  - E) 下丘脑体温调节功能障碍
55. [单选题]男孩，2岁。1岁时患麻疹后食欲差，常有腹泻，身高83cm，体重7600g，面色苍白，皮肤干燥，腹部皮下脂肪减少，心音低钝，脉搏缓慢。[问题1][题]其主要诊断应是
- A) 婴幼儿腹泻
  - B) 营养性贫血
  - C) 先天性甲状腺功能减低症
  - D) 蛋白质-热能营养不良
  - E) 心功能不全
56. [单选题]关于消化性溃疡下述哪些情况为手术适应证
- A) 上消化道出血
  - B) 反复发作的十二指肠球溃疡
  - C) 胃溃疡疑癌变
  - D) 并不全幽门梗阻
  - E) 复合溃疡
57. [单选题]人口性别比例指
- A) 以男性人口数为100或1时的女性人口数
  - B) 以女性人口数为100或1时的男性人口数
  - C) 出生时性比例为100
  - D) 不同年龄的性比例有所不同
  - E) 年龄越小，性比例越大

58. [单选题]脑出血的内科治疗最重要的是

- A) 控制脑水肿
- B) 给止血剂
- C) 降低血压
- D) 抗生素治疗
- E) 给氧

59. [单选题]能抑制甲状腺素合成，又抑制外周组织中T4变为T3，还抑制免疫球蛋白生成的药物

- A) 碘化物
- B) 甲巯咪唑
- C) 丙基硫氧嘧啶
- D) 甲亢平
- E) 普萘洛尔

60. [单选题]正向突变试验基因位点是

- A) OUA位点，TK位点，6-GT位点
- B) OUA位点，TK位点，5-Bru位点
- C) 6-GT位点，TK位点，HGPRT位点
- D) TK位点，HGPRT位点，Oua位点
- E) HGPRT位点，6-GT位点，OUA位点

61. [单选题]8个月男孩呕吐，腹泻3天，无尿12小时，T：37.8℃，嗜睡与烦躁交替，双眼深陷，口唇干燥，皮肤弹性差，四肢冷，见花纹，脉细弱160次/分，心音低，呼吸深长60次/分，腹部肠鸣音亢进，血象

：Hb150g/L，WBC13.0×10<sup>9</sup>/L，L：0.60，初步诊断小儿腹泻伴有

- A) 重度脱水，代谢性酸中毒
- B) 重度脱水，低钾血症，代谢性酸中毒
- C) 中度低渗性脱水，代谢性酸中毒
- D) 败血症休克，低钾血症，代谢性酸中毒
- E) 重度高渗性脱水，代谢性酸中毒

62. [单选题]质量调整生存年（或称健康寿命年）能够综合反映人群的

- A) 潜在危险因素和疾病频率
- B) 生命质量与生存数量
- C) 健康状态和疾病频率
- D) 个人社会网络和社会支持
- E) 健康危险因素和期望寿命

63. [单选题]胎儿娩出后4分钟，产妇出现大量阴道流血，最可能的原因是

- A) 阴道静脉破裂
- B) 宫颈裂伤
- C) 子宫收缩乏力
- D) 胎盘部分剥离
- E) 凝血功能障碍

64. [单选题]下列哪种维生素能阻断N-亚硝基化合物的合成

- A) 维生素A
- B) 维生素C
- C) 维生素D
- D) 维生素B

E) 维生素B

2

65. [单选题] 肠梗阻的基础疗法哪项不对

- A) 不论需要手术与否均要采用
- B) 胃肠减压是治疗肠梗阻重要手段之一
- C) 纠正水电解质、酸碱失衡是重要措施
- D) 同时需要防治感染和中毒
- E) M-A管作为常规应用

66. [单选题] 正常人先用力深吸气，然后以最快的速度呼出气体。第一秒末的呼出气量占肺活量的百分数应为

- A) 60%
- B) 80%
- C) 96%
- D) 99%
- E) 100%

67. [单选题] 对内毒素叙述错误的是

- A) G-菌裂解后释放出
- B) 化学成分是脂多糖
- C) 不耐热，60℃30分钟可被破坏
- D) 引起发烧、休克、DIC等症状
- E) 甲醛处理不能形成类毒素

68. [单选题] 化学结构与毒效应

- A) 化合物的化学活性决定理化决定
- B) 理化性质决定化合物的生物活性
- C) 化合物的生物活性决定该化合物的化学活性
- D) 化合物的化学结构决定其化学活性及理化性质
- E) 化学活性和理化性质影响化学结构

69. [单选题] 确诊溃疡活动性出血的最可靠方法是

- A) 胃液分析
- B) X线钡餐检查
- C) 大便潜血
- D) 急诊胃镜检查
- E) 血红蛋白测定

70. [单选题] 青春期早期的主要表现

- A) 阴毛、腋毛开始发育
- B) 生长突增阶段，骨骼系统发育迅速
- C) 性激素呈脉冲式释放
- D) 女孩乳房发育，男孩睾丸增大
- E) 性腺开始发育

71. [单选题] R×C表中多个样本率比较的  $\chi^2$

2

检验，若 $P < 0.01$ ，说明

- A) 每两个样本率之间不相等
- B) 每两个总体率之间不相等

- C) 多个样本率之间不等或不全等
- D) 一定有两个总体率之间相等
- E) 多个总体率之间不等或不全等

72. [单选题] 糖尿病酮症酸中毒的主要治疗是

- A) 纠正酸中毒，补充体液和电解质
- B) 纠正酸中毒，应用胰岛素
- C) 补充体液和电解质，应用胰岛素
- D) 应用中枢兴奋剂及胰岛素
- E) 中枢兴奋剂，纠正酸中毒

73. [单选题] 抽样调查了某地103名10岁男孩的生长发育情况，得身高均数为142.82cm，标准差为5.63cm；体重均数为28.24kg，标准差为5.62kg。比较身高和体重的变异程度，下列结论正确的是

- A) 身高变异程度大
- B) 体重变异程度大
- C) 身高与体重的变异程度相同
- D) 由于单位不同，无法比较二者的变异程度
- E) 题中所给条件不足，无法判断

74. [单选题] 关于输卵管结扎哪项是错误的

- A) 结扎部位在输卵管峡部较好
- B) 抽心包埋法成功率高
- C) 取到输卵管要追溯至伞端再结扎
- D) 经阴道手术较复杂，易发生感染
- E) 因手术时间短，不必排空膀胱

75. [单选题] 颈椎病最常见的类型为

- A) 脊髓型
- B) 交感神经型
- C) 椎动脉型
- D) 混合型
- E) 神经根型

76. [单选题] 为抑制肾上腺来源雄激素的首选药物

- A) 枸橼酸氯米芬
- B) 螺内酯
- C) 糖皮质激素
- D) 氟他胺
- E) 文迪雅

77. [单选题] 男性，38岁，发冷发热寒战，头晕3天，体温38℃，巩膜黄染，肝肋下2.5cm，尿胆原阳性，尿镜下无红细胞，尿隐血阳性，过去有肝炎史，诊断

- A) 慢性肝炎急性发作
- B) 胆石症
- C) 急性黄疸型肝炎
- D) 溶血性贫血
- E) 以上全不是

78. [单选题] 妊娠合并糖尿病对胎儿的影响不正确的是

- A) 巨大胎儿
- B) 胎儿生长受限

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227034161163006110>