

2023-24 年广西壮族自治区蒙山县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整题库【黄金题型】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 伴有冠心病的高血压患者宜选用

- A: 维拉帕米
- B: 尼群地平
- C: 硝苯地平
- D: 尼莫地平

答案：C

2. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 高钾血症
- B: 高钠血症
- C: 充血性心力衰竭
- D: 预防急性肾衰竭

答案：B

3. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 阻断 H
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 抑制胃壁细胞的 H
- D: 阻断 CTZ 的 D

答案：C

4. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为

- A: 酚妥拉明
- B: 糖皮质激素
- C: 右旋糖酐
- D: 阿托品

答案：B

5. 利伐沙班的药理作用是

- A: 阻止了 Xa 对凝血酶原的作用
- B: 抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶
- C: 抑制血小板聚集
- D: 抑制游离凝血酶

答案：A

6. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性
- B: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度
- C: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期
- D: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期

答案：D

7. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

- A: 心肌梗死
- B: 高血压

C: 心律失常

D: 充血性心力衰竭

答案: C

8. 刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

A: 二甲双胍

B: A 和 B 均无效

C: 胰岛素

D: 磺酰脲类

答案: D

9. 用药时需关注肺毒性的药物是

A: 长春新碱

B: 柔红霉素

C: 博来霉素

D: 紫杉醇

答案: C

10. (2020 年真题) 哮喘急性发作首选的药物是

A: 羧甲司坦口服液

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 布地奈德福莫特罗吸入剂

D: 孟鲁司特片

答案: B

11. 下述关于过氧苯甲酰的描述中, 不正确的是()

A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

B: 为强还原剂, 极易分解

C: 可导致皮肤干燥

D: 可分解出新生态氧而发挥作用

答案: B

12. 可引起出血性膀胱炎的抗肿瘤药物是

A: 多柔比星

B: 甲氨蝶呤

C: 环磷酰胺

D: 氟尿嘧啶

答案: C

13. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

A: 苯巴比妥

B: 氟西汀

C: 地西泮

D: 佐匹克隆

答案: D

14. 患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

A: 氯霉素

B: 哌拉西林

C: 林可霉素

D: 庆大霉素

答案: B

15. 阿司匹林的作用机制是

A: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

- B: 促进纤溶
- C: 促进凝血因子合成
- D: 抑制血小板聚集

答案：D

16. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

- A: 激活磷酸二酯酶
- B: 激活腺苷酸环化酶
- C: 拮抗腺苷受体
- D: 促进肾上腺素释放

答案：A

17. 氯霉素的抗菌作用机制是

- A: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏
- B: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，是蛋白质合成受阻
- C: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成
- D: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

答案：B

18. 以肠内营养乳剂（TPF-D）作为唯一营养来源的患者，推荐剂量为一日

- A: 40ml/kg
- B: 10ml/kg
- C: 20ml/kg
- D: 30ml/kg

答案：D

19. 下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

- A: 静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应
- B: 优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害
- C: 对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用
- D: 贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子

答案：C

20. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药
- B: 胆碱酯酶复活药
- C: 阿托品
- D: 阿托品+新斯的明

答案：A

21. 关于外用糖皮质激素类药物的说法错误的是

- A: 外用糖皮质激素可增加感染风险
- B: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- C: 治疗全身性或严重过敏疾病时，不宜合用口服抗过敏药
- D: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

答案：C

22. 对生殖过程起作用的是

- A: 视黄酸
- B: 维生素 A
- C: 视黄醛
- D: 视黄醇

答案：D

23. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦
- C: 金刚烷胺
- D: 碘苷

答案：A

24. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- B: 属繁殖期杀菌剂
- C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- D: 具有肝脏毒性

答案：B

25. 下列药物中不属于降压药的是()

- A: 阿利克仑
- B: 利血平
- C: 肼屈嗪
- D: 左旋多巴

答案：D

26. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 夜盲症
- B: 孕育异常
- C: 脚气病
- D: 佝偻病

答案：B

27. 长期服用雌激素可导致

- A: 脱发
- B: 阴道出血
- C: 高血压
- D: 体重下降

答案：B

28. 最为严重的不良反应为直立性低血压的是()

- A: 特拉唑嗪
- B: 普适泰
- C: 十一酸睾酮
- D: 非那雄胺

答案：A

29. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 铁剂
- B: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- C: 维生素 D
- D: 钙剂

答案：B

30. 加重洋地黄中毒的易感因素为

- A: 甲状腺功能减退症
- B: 低钾血症
- C: 伴有房颤的心功能不全
- D: 低镁血症

答案：A

31. 布美他尼的利尿作用部位在()

- A: 髓袢升支粗段
- B: 集合管
- C: 肾小球
- D: 远曲小管初段

答案: A

32. 下列哪个选项不属于十一酸睾酮的适应症

- A: 乳腺癌转移的姑息性治疗
- B: 原发性或继发性睾丸功能减退
- C: 女性儿童体质性青春期延迟
- D: 前列腺增生引起的排尿障碍

答案: D

33. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 驱钩虫+亚叶酸钙
- B: 输血+注射右旋糖酐铁
- C: 驱钩虫+口服铁剂
- D: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

答案: C

34. 小剂量用于妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 B6
- C: 烟酸
- D: 叶酸

答案：D

35. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 阿利克仑
- B: 左旋氨氯地平
- C: 坎地沙坦
- D: 地尔硫（ CC 卓）

答案：C

36. 属于钙通道阻滞剂（第 IV 类）的抗心律失常药是

- A: 维拉帕米
- B: 拉贝洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 美西律

答案：A

37. 下列药物可首选用于治疗小细胞肺癌的是()

- A: 依托泊苷
- B: 替尼泊苷
- C: 长春新碱
- D: 奥沙利铂

答案：A

38. 林可霉素类抗菌药物无抗菌作用的是

- A: 革兰阳性球菌
- B: 肺炎链球菌
- C: 肺炎支原体
- D: 厌氧菌

答案：C

39. 通过选择性抑制 5α -还原酶而抑制前列腺增生的药物是

- A: 依立雄胺
- B: 哌唑嗪
- C: 特拉唑嗪
- D: 甲睾酮

答案：A

40. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染的药物是

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：C

41. 其缓释片剂应与食物同服的是

- A: 阿奇霉素
- B: 红霉素
- C: 氟曲南
- D: 克拉霉素

答案：D

42. (2015 年真题) 治疗侵袭性曲霉菌病首选 ()。

- A: 氟胞嘧啶
- B: 氟康唑
- C: 灰黄霉素
- D: 伏立康唑

答案：D

43. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 抑制细菌细胞壁的合成
- B: 影响叶酸代谢
- C: 影响胞浆膜的通透性
- D: 抑制蛋白质合成的全过程

答案：A

44. 属于膨胀性泻药的是()

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 蓖麻油
- D: 聚乙二醇 4000

答案：D

45. 肝素最大作用时间是

- A: 2min
- B: 3 天
- C: 5~7 天
- D: 6 天

答案：A

46. (2018 年真题) 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害, 临床用药需要重点关注的抗癫痫药是()

- A: 氯硝西洋
- B: 苯巴比妥
- C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案: C

47. 老年患者长期大剂量应用 PPIs 可能导致的典型不良反应是

A: 心律不齐

B: 骨折

C: 乳房发育

D: 消化不良

答案: B

48. 患者，女，70 岁，BMI $21\text{kg}/\text{m}^2$ ，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果:血钙 $1.97\text{mmol}/\text{L}$ ，血磷 $1.7\text{mmol}/\text{L}$ ，右上肢 X 光检查提示:右桡骨远端骨折。骨密度检查结果:T 值 (-2.9)。

A: 对乙酰氨基酚

B: 地塞米松

C: 双醋瑞因

D: 秋水仙碱

答案: A

49. 以下属于袢利尿药的禁忌证的是()

A: 高钾血症

B: 对试验剂量无反应的无尿者

C: 高血压

D: 高血糖

答案: B

50. (2020 年真题) 对环氧化酶 2 (COX-2) 具有高选择性的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案: D

51. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 只对室上性心动过速有效
- B: 特异性针对房颤有效
- C: 只对室性心动过速有效
- D: 对室上性和室性心动过速都有效

答案: D

52. 甲氧苄啶与磺胺甲

- A: 促进分布
- B: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢
- C: 促进吸收
- D: 抗菌谱不相似

答案: B

53. 不宜用于单纯性尿路感染初治病例的氨基糖苷类抗菌药物是

- A: 阿米卡星
- B: 万古霉素
- C: 利福平
- D: 盐酸克林霉素

答案: A

54. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 酚酞
- C: 甘油
- D: 乳果糖

答案：A

55. 特比萘芬属于

- A: 吗啉类
- B: 唑类
- C: 丙烯胺类
- D: 抗生素类

答案：C

56. 可引起乳房肿大的药物是()

- A: 组胺
- B: 苯海拉明
- C: 阿司咪唑
- D: 西咪替丁

答案：D

57. 属于促血小板生成药的是

- A: 甲萘氢醌
- B: 艾曲泊帕乙醇胺
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

答案：B

58. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

- A: 双氯芬酸
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

59. 氯霉素的抗菌作用机制是

- A: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成
- B: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏
- C: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成
- D: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻

答案：D

60. 对革兰阳性菌作用强，对革兰阴性菌作用弱的药物是

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：D

61. 可用于防治夜盲症的维生素是()

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B
- C: 叶酸
- D: 维生素 K

答案：A

62. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

- A: 多柔比星
- B: 博来霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 长春新碱

答案：C

63. 长期大量使用可导致肝功能异常

- A: 更昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 氯霉素
- D: 四环素可的松

答案：B

64. 不属于抗代谢抗肿瘤药的是

- A: 环磷酰胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

65. （2016 年真题）具有抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取作用，用于难治性抑郁症且疗效明显的抗抑郁药是

- A: 马普替林
- B: 西酞普林

C: 文拉法辛

D: 阿米替林

答案: C

66. 分泌盐皮质激素的是

A: 网状带

B: 束状带和网装带

C: 球状带

D: 束状带

答案: C

67. 可用作鼻黏膜保护的药物是

A: 西地碘

B: 复方薄荷油

C: 桃金娘油

D: 羟甲唑啉

答案: B

68. 对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A: 替格雷洛

B: 噻氯匹定

C: 氯吡格雷

D: 替罗非班

答案: C

69. (2018 年真题) 可用于降低眼压的药物是 ()

A: 利福平

B: 卡替洛尔

C: 阿托品

D: 左氧氟沙星

答案: B

70. 左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于

A: 脑膜炎后遗症

B: 肝性脑病

C: 乙型肝炎

D: 心血管疾病

答案: B

71. 人体主要的热能来源之一，被用来补充热量是

A: 维生素

B: 氨基酸

C: 葡萄糖

D: 果糖

答案: C

72. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

A: 5 天

B: 1 周

C: 3 天

D: 1 天

答案: B

73. (2018 年真题) 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

A: 氟西汀

- B: 佐匹克隆
- C: 地西泮
- D: 苯巴比妥

答案：B

74. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 3%酚甘油滴耳液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 2%过氧化氢溶液

答案：C

75. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 盐酸
- D: 依折麦布

答案：D

76. 阿糖胞苷、吉西他滨属于()

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：A

77. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

- A: 氢氯噻嗪

B: 阿米洛利

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案: D

78. 肝素可增强抗凝血酶Ⅲ活性，灭活下列哪组凝血因子

A: Ⅱa、Ⅲa、Ⅳa、Ⅴa、Ⅶa

B: Ⅱa、Ⅶa、Ⅷa、Ⅸa、Ⅹa

C: Ⅱa、Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa

D: Ⅱa、Ⅵa、Ⅶa、Ⅷa、Ⅸa

答案: C

79. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

B: 属于抗动力药

C: 具有吸附、收敛的作用

D: 可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

答案: B

80. 患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0.5g，一日3次；阿卡波糖0.1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 乙酰唑胺

B: 氨苯蝶啶

C: 呋塞米

D: 呋达帕胺

答案: C

81. 属于留钾利尿药的是

- A: 依普利酮
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 布美他尼

答案：A

82. 关于万古霉素，描述错误的是

- A: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染
- B: 肾功能不全者无需调整剂量
- C: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- D: 属于杀菌剂

答案：B

83. 下述药物中，不能用于促进铁剂吸收的是

- A: 维生素 E
- B: 维生素 C
- C: 半胱氨酸
- D: 食物中的果糖

答案：A

84. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 巨核细胞计数
- B: 网织红细胞计数
- C: 血红蛋白
- D: 血清铁蛋白

答案：A

85. 与神经-肌肉阻滞剂合用，可加重神经-肌肉阻滞作用的是

- A: 阿莫西林
- B: 克拉霉素
- C: 阿米卡星
- D: 头孢氨苄

答案：C

86. (2021 年真题) 抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是 ()

- A: 替奈普酶
- B: 重组链激酶
- C: 瑞替普酶
- D: 尿激酶

答案：B

87. 下列药物中，能促进食物消化的药物是

- A: 乳酶生
- B: 雷尼替丁
- C: 胶体果胶铋
- D: 兰索拉唑

答案：A

88. 下列关于 IA 类抗心律失常药物的描述，错误的是

- A: 降低膜反应性
- B: 抑制 Na
- C: 延长 APD 和 ERP
- D: 减慢 0 相去极化速度

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/227064030056010024>