

陕西省绥德县 2024 年《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库（夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 神经毒性是剂量依赖性的是()

- A: 亚叶酸钙
- B: 奥沙利铂
- C: 顺铂
- D: 卡铂

答案: B

2. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- B: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- C: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案: D

3. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 地匹福林
- B: 拉坦前列素
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案: D

4. 属于选择性 5-HT

- A: 莫沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 昂丹司琼
- D: 多潘立酮

答案：A

5. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

- A: 东莨菪碱
- B: 新福林
- C: 后马托品
- D: 阿托品

答案：B

6. 重症肌无力、癫痫患者避免使用的抗菌药是

- A: 哌拉西林
- B: 左氧氟沙星
- C: 甲硝唑
- D: 米诺环素

答案：B

7. 吡喹酮的抗虫作用首选用于

- A: 蛔虫
- B: 牛肉绦虫
- C: 血吸虫
- D: 丝虫

答案：C

8. 硝酸甘油的药理作用不包括

- A: 增加心室壁张力
- B: 减少回心血量
- C: 增加心率
- D: 扩张容量血管

答案：A

9. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

- A: 氨基糖
- B: 他唑巴坦
- C: 克拉维酸
- D: 美罗培南

答案：A

10. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

- A: 右旋糖酐
- B: 阿托品
- C: 糖皮质激素
- D: 酚妥拉明

答案：C

11. 可用于对乙酰氨基酚中毒解救，颗粒剂还能加入果汁中服用的祛痰药物是

- A: 乙酰半胱氨酸

- B: 氨溴索
- C: 溴己新
- D: 羧甲司坦

答案：A

12. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

- A: 促进吸收
- B: 促进分布
- C: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢
- D: 抗菌谱不相似

答案：C

13. ()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 克林霉素

答案：C

14. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

- A: 抑制器官移植急性排斥危象
- B: 肾病综合征
- C: 湿疹
- D: 变态反应性疾病

答案：A

15. 氨苄西林()

- A: 对 G

- B: 特别对铜绿假单胞菌有效
- C: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- D: 对 G

答案：D

16. 下列具有抗血小板作用的药物是

- A: 维生素 K
- B: 华法林
- C: 噻氯匹定
- D: 肝素

答案：C

17. 不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

- A: 特拉唑嗪
- B: 可乐定
- C: 肾素抑制剂
- D: 甲基多巴

答案：A

18. 常用治疗胃肠道癌，是结直肠癌的首选药之一的药物是()

- A: 奥沙利铂
- B: 丝裂霉素
- C: 塞替派
- D: 环磷酰胺

答案：A

19. 烟酸缺乏时发生

- A: 糙皮病
- B: 脚气病
- C: 成人佝偻病
- D: 夜盲症

答案：A

20. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

- A: 2%过氧化氮溶液
- B: 3%过氧化氢溶液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 2%酚甘油滴耳液

答案：B

21. 伴有冠心病的高血压患者宜选用

- A: 尼群地平
- B: 尼莫地平
- C: 维拉帕米
- D: 硝苯地平

答案：D

22. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

- A: 青霉素
- B: 链霉素
- C: 氯霉素
- D: 四环素

答案：D

23. (2018 年真题) 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害, 临床用药需要重点关注的抗癫痫药是 ()

- A: 苯妥英钠
- B: 氯硝西泮
- C: 苯巴比妥
- D: 丙戊酸钠

答案: D

24. 患者, 男性, 46 岁, 经常头痛, 头晕近 8 年。2 天来头痛加重, 伴有恶心、呕吐送往急诊。查体: 神志模糊, 血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++), 尿糖(+). 入院治疗, 经处理, 血压仍为 202 / 120mmHg, 且气急不能平卧, 心率 108 次 / 分, 早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 普罗帕酮静脉注射
- B: 利多卡因静脉滴注
- C: 硝普钠静脉滴注
- D: 毛花苷丙静脉注射

答案: C

25. 患者, 女, 66 岁, 5 天前无明显诱因出现发热, 最高 39℃, 伴寒战; 无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善, 遂转入院治疗。入院查体: T38. 8℃, R21 次, BP110 / 70mmHg, HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软, 咽不红、双扁桃体不大; 双肺呼吸音清, 无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞 82. 1%, 胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59, 每 6 小时一次。

- A: 出院后如发生过敏症状, 可使用抗过敏药特非那定
- B: 定期复查血常规、肝肾功能

C: 如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性

D: 侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑

答案：A

26. 二磷酸果糖注射液禁用的人群是

A: 高钾血症者

B: 高尿酸血症者

C: 高磷血症者

D: 高镁血症者

答案：C

27. 12%复方氨基酸注射液（18AA）的静脉滴速为

A: 滴速 80~100 滴 / 分

B: 不超过 40 滴 / 分

C: 滴速 20~30 滴 / 分

D: 不超过 15 滴 / 分

答案：C

28. 可引起乳房肿大的药物是()

A: 阿司咪唑

B: 组胺

C: 西咪替丁

D: 苯海拉明

答案：C

29. (2018 年真题) 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用，用于治疗痤疮的药物是 ()

A: 维 A 酸

- B: 阿达帕林
- C: 壬二酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

30. 抑制平滑肌 Ca^{2+} 进入血管平滑肌细胞内，能明显舒张血管的降压药是()

- A: 美托洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 利血平

答案：B

31. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和其联合有协同作用的是()

- A: 噻嗪类利尿药
- B: β 受体阻断药
- C: 人促红素
- D: 留钾利尿药

答案：B

32. 患者，男，30 岁有长期便秘病史，因胃痛就医，诊断为胃溃疡，该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是()

- A: 奥美拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 西咪替丁
- D: 雷贝拉唑

答案：B

33. 可用肝病的氨基酸制剂是

- A: 复方氨基酸注射液（6AA）、复方氨基酸注射液（9AA）
- B: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（6AA）
- C: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（9AA）
- D: 复方氨基酸注射液（9AA）、赖氨酸注射液

答案：B

34. 甲亢术前准备的正确给药方法是()

- A: 只给碘化物
- B: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类
- C: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物
- D: 只给硫脲类

答案：C

35. 下列维生素中，属于水溶性的是()。

- A: 维生素
- B: 维生素
- C: 维生素 A
- D: 维生素

答案：D

36. 使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是()

- A: 肌酐清除率低于 50%的患者
- B: 肌酐清除率低于 40%的患者
- C: 肌酐清除率低于 60%的患者
- D: 肌酐清除率低于 30%的患者

答案：A

37. 治疗金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎及关节感染的首选药是

- A: 氨基糖苷类
- B: 林可霉素类
- C: 大环内酯类
- D: 头孢菌素类

答案：B

38. 属于贝丁酸类调节血脂药是（）。

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 阿托伐他汀
- D: 阿昔莫司

答案：A

39. （2017 年真题）5 岁以下儿童首选的散瞳剂是（）

- A: 2%后马托品眼膏剂
- B: 1%硫酸阿托品眼膏剂
- C: 10%去氧肾上腺素滴眼剂
- D: 四环素可的松眼膏剂

答案：B

40. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 甲状腺素
- B: 糖皮质激素
- C: 胰岛素
- D: 依替膦酸二钠

答案：C

41. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

- A: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验
- B: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20% 体表面积
- C: 不用于 18 岁以下银屑病患者
- D: 对严重的银屑病效果显著

答案：D

42. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是

- A: 氨甲苯酸
- B: 维生素 K1
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素

答案：C

43. 特布他林的平喘作用维持时间是

- A: 10~12 小时
- B: 3~5 分钟
- C: 4~6 小时
- D: 10~20 分钟

答案：C

44. 属于棘白菌素类的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 制霉菌素
- C: 特比萘芬
- D: 卡泊芬净

答案：D

45. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

- A: 帕洛诺司琼
- B: 劳拉西泮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 氯丙嗪

答案: A

46. 阿托品 2mg 时，出现的症状为 ()

- A: 瞳孔轻度散大
- B: 略有口干
- C: 语言不清
- D: 瞳孔扩大

答案: D

47. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是 ()

- A: 对造血系统的毒性
- B: 二重感染
- C: 对肝脏严重损害
- D: 胃肠道反应

答案: A

48. 抗菌药物联合用药的目的不包括

- A: 提高疗效
- B: 扩大抗菌范围
- C: 延长作用时间
- D: 减少耐药性的发生

答案: C

49. 作用强而持久，不仅对子宫底，而且对子宫颈部都有很强的收缩作用，剂量稍大即产生强直性收缩，不适用于催产或引产，主要用于产后子宫出血或子宫复原不佳的是

- A: 普拉睾酮
- B: 麦角新碱
- C: 缩宫素
- D: 地诺前列酮

答案：B

50. 可对第八对脑神经造成损害的是()

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 链霉素

答案：D

51. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 苯酚溶液
- C: 过氧乙酸溶液
- D: 高锰酸钾溶液

答案：A

52. 以上药物与肝素合用，不会增加出血风险的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林

D: 吲哚美辛

答案: A

53. 服用伊马替尼的时间是

A: 餐后 2 小时

B: 睡前

C: 进餐时

D: 餐前 1 小时

答案: C

54. (2015 年真题) 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是 ()。

A: 果糖

B: 硫酸镁

C: 氯化钙

D: 氯化钾

答案: C

55. 呋塞米可增加下列哪种药物的耳毒性

A: 磺胺嘧啶

B: 链霉素

C: 青霉素

D: 四环素

答案: B

56. 属于第四代喹诺酮类药物的是

A: 莫西沙星

B: 萘啶酸

C: 诺氟沙星

D: 吡哌酸

答案：A

57. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

A: 地西泮

B: 佐匹克隆

C: 苯巴比妥

D: 氟西汀

答案：B

58. 治疗膀胱过度活动症宜选用

A: 尼莫地平

B: 利血平

C: 坦洛新

D: 托特罗定

答案：D

59. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT

A: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：C

60. 可使前者作用加强或延长的是

A: 氯丙嗪

B: 红霉素

C: 他莫昔芬

D: 维生素 C

答案: A

61. 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是()。

A: 阿莫西林

B: 左氧氟沙星

C: 头孢氨苄

D: 青霉素 G

答案: B

62. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体

B: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

C: 莫西沙星对厌氧菌有效

D: 莫西沙星对非典型病原体无效

答案: D

63. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

A: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

B: 多毛、痤疮

C: 肾功能损害

D: 子宫不规则出血

答案: D

64. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A: 伊立替康
- B: 氟尿嘧啶
- C: 多西他赛
- D: 多柔比星

答案：D

65. 氨基酸的主要作用不包括

- A: 转变为糖或脂肪
- B: 调节体内酸碱平衡
- C: 合成蛋白质
- D: 维持氮平衡

答案：B

66. 巨细胞病毒可致

- A: 流行性结膜炎
- B: 巨细胞病毒性视网膜炎
- C: 角膜炎
- D: 急性出血性结膜炎

答案：B

67. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

- A: 顺铂
- B: 甲氨蝶呤
- C: 环磷酰胺
- D: 阿糖胞苷

答案：B

68. 布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

- A: 25 倍
- B: 40 倍
- C: 100 倍
- D: 15 倍

答案：B

69. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)应避免与其联合应用的是()

- A: β 受体阻断药
- B: 留钾利尿药
- C: 噻嗪类利尿药
- D: 人促红素

答案：B

70. 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 舍曲林
- C: 阿米替林
- D: 度洛西汀

答案：A

71. 适用于吸烟的老年哮喘患者，且不易产生耐受性的药物是

- A: 特布他林
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙美特罗

D: 布地奈德

答案: B

72. 可用于烧伤及伤后感染的是()

A: 磺胺嘧啶

B: 磺胺甲噁唑

C: 柳氮磺吡啶

D: 磺胺米隆

答案: A

73. 肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

A: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病

B: 可降低门脉压力，诱发出血

C: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病

D: 可升高门脉压力，诱发出血

答案: C

74. 其缓释片剂应与食物同服的是

A: 氨曲南

B: 克拉霉素

C: 阿奇霉素

D: 红霉素

答案: B

75. 主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

A: 维拉帕米

B: 利卡多因

C: 普萘洛尔

D: 奎尼丁

答案: D

76. 长期使用可引起骨质疏松的药物是

A: 甲状腺素

B: 胰岛素

C: 依替膦酸二钠

D: 糖皮质激素

答案: D

77. 扩张脑血管作用较强,能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是 ()

A: 尼莫地平

B: 氨氯地平

C: 非洛地平

D: 拉西地平

答案: A

78. 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A: 纳洛酮

B: 阿托品

C: 苯甲酸钠咖啡因

D: 氟马西尼

答案: B

79. 需要 1 周才起效的是

A: 文拉法辛

B: 吗氯贝胺

C: 氟西汀

D: 吡拉西坦

答案: A

80. 下述不能用于治疗痤疮的药物是

A: 过氧苯甲酰

B: 克霉唑

C: 阿达帕林

D: 壬二酸

答案: B

81. 变异型心绞痛宜选用

A: 地尔硫

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 维拉帕米

答案: B

82. 有关阿莫西林特点的说法正确的是

A: 耐酸、耐酶

B: 口服吸收差，生物利用度小

C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

D: 对耐药金葡菌有效

答案: C

83. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制甲状腺过氧化酶

B: 抑制碘泵

C: 抑制 Na^+-K^+ 泵

D: 抑制甲状腺蛋白水解酶

答案：A

84. 关于地西泮的叙述，错误的是

A: 是一种长效镇静催眠药物

B: 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作

C: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛

D: 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一

答案：B

85. 可诱发和加重哮喘的是

A: 硝酸甘油

B: 胍乙啶

C: 普萘洛尔

D: 硝苯地平

答案：C

86. 属于润滑性泻药的是

A: 利那洛肽

B: 欧车前

C: 番泻叶

D: 多库酯钠

答案：D

87. 维生素 B12 的适应证为

A: 恶性贫血和巨幼细胞贫血

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 纤溶亢进所致的出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/227130016064010026>