



中华人民共和国国家标准

GB/T 17980.18—2026

代替 GB/T 17980.18—2000

农药 田间药效试验准则 第 18 部分： 杀虫剂防治十字花科蔬菜黄条跳甲

Pesticide—Guidelines for the field efficacy trials—
Part 18: Insecticides against striped flea beetle on crucifer vegetable

2026-02-27 发布

2026-09-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 17980《农药 田间药效试验准则》的第18部分。GB/T 17980 已经发布了以下部分：

- 第1部分：杀虫剂防治水稻鳞翅目钻蛀性害虫；
- 第2部分：杀虫剂防治稻纵卷叶螟；
- 第3部分：杀虫剂防治水稻叶蝉；

.....

- 第18部分：杀虫剂防治十字花科蔬菜黄条跳甲；

.....

- 第149部分：杀虫剂防治红火蚁。

本文件代替 GB/T 17980.18—2000《农药 田间药效试验准则(一) 杀虫剂防治十字花科蔬菜黄条跳甲》，与 GB/T 17980.18—2000 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了适用范围(见第1章,2000年版的第1章)；
- b) 更改了试验对象和作物的要求(见4.1,2000年版的2.1)；
- c) 更改了环境条件的要求(见4.2,2000年版的2.2)；
- d) 增加了试验处理的规定(见5.1)；
- e) 更改了试验药剂、对照药剂的要求(见5.2,2000年版的3.1)；
- f) 增加了小区排列中关于小区间保护行或隔离带的要求(见5.3.1)；
- g) 更改了小区面积和重复的规定(见5.3.2,2000年版的3.2.2)；
- h) 删除了施药器械中用药量偏差的要求(见2000年版的3.3.2)；
- i) 更改了施药时间和次数的要求(见6.3,2000年版的3.3.3)；
- j) 增加了使用剂量中制剂用量表示方式和用药量偏差的要求(见6.4)；
- k) 更改了防治其他病虫害的药剂要求(见6.5,2000年版的3.3.5)；
- l) 更改了调查方法的要求(见7.1.1,2000年版的4.2.1)；
- m) 更改了调查时间和次数的要求(见7.1.2,2000年版的4.2.2)；
- n) 更改了对作物直接影响的规定(见7.2,2000年版的4.3)；
- o) 更改了对其他非靶标生物影响的规定(见7.3.2,2000年版的4.4.2)；
- p) 更改了对产量影响的规定(见7.4,2000年版的4.5)；
- q) 更改了土壤资料记录内容(见7.5.2,2000年版的4.1.2)；
- r) 增加了撒施处理的防治效果的计算方法(见8.2)；
- s) 删除叶片受害指数及其防治效果的计算公式(见2000年版的4.2.3)；
- t) 增加了数据统计分析的要求(见8.3)；
- u) 更改了结果与报告编写的要求(见第9章,2000年版的第5章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部提出。

本文件由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本文件起草单位：农业农村部农药检定所、浙江省农业科学院、广东省农业科学院植物保护研究所、

广东省农业有害生物预警防控中心、中国农业大学、秦安县植保植检站、东海县植物保护站。

本文件主要起草人：林荣华、苍涛、陈炳旭、李加松、王晓军、蒋丙军、王祥云、柳采秀、姚琼、郑静君、蒋莎、范兰兰、陈雅洁、殷越、聂东兴、侯燕华。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2000 年首次发布为 GB/T 17980.18—2000；

——本次为第一次修订。

引 言

田间药效试验是评价农药在各种环境因素下对有害生物综合作用效力的重要手段,是指导农药安全、合理使用的重要技术依据。为科学评价农药使用效果和安全性,减少因试验方法不同导致的结果差异,需要对田间药效试验操作和评价内容进行规范。GB/T 17980 描述了杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等对相应防治对象共 149 项田间药效试验方法,旨在规范方法、统一评价尺度,推动农药产品的研发、登记和使用,拟由 149 个部分构成,详见附录 A。

农药 田间药效试验准则 第 18 部分： 杀虫剂防治十字花科蔬菜黄条跳甲

1 范围

本文件描述了杀虫剂防治十字花科蔬菜黄条跳甲田间小区药效试验的方法。

本文件适用于杀虫剂防治十字花科蔬菜黄曲条跳甲(*Phyllotreta strilata*)、黄直条跳甲(*Phyllotreta rectilineata*)、黄狭条跳甲(*Phyllotreta vittula*)、黄宽条跳甲(*Phyllotreta humilis*)的登记用田间小区药效试验及药效评价,其他蔬菜黄条跳甲田间药效试验参照执行。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试验条件

4.1 试验对象和作物

试验对象为黄条跳甲。记录黄条跳甲种类。

试验作物为十字花科蔬菜。记录作物和品种名称。

4.2 环境条件

试验地应选择有代表性、黄条跳甲发生程度中等的田块。所有试验小区的作物品种和栽培条件(土壤类型、施肥、耕作)应均匀一致,且符合当地科学的农业实践。

5 试验设计和安排

5.1 试验处理

应设置试验药剂、对照药剂和空白对照等处理。

5.2 药剂

5.2.1 试验药剂

试验药剂处理不少于 3 个剂量,特殊情况依据试验要求设置。注明药剂中文/英文通用名或代号、剂型、有效成分含量、生产企业、生产日期或批号、有效期等。

5.2.2 对照药剂

对照药剂应为已登记且在实际使用中防效和安全性较好的当地常用产品,对照药剂的类型和作用