全科相关专业知识儿科疾病

儿科疾病

第一节 新生儿疾病一、新生儿黄疸

1. 定义

由于体内胆红素的累积引起皮肤或其他器官黄染的现象称为黄疸

2. 生理性黄疸病理性黄疸

生理性黄疸	病理性黄疸
足月儿血清胆红素不超过 220.6 μ（12.9） 早产儿不超过 255 μ（15） 足月儿生理性黄疸多于生后 2～3 天出现，生后 4～5 天为高峰，7～10 天消退 早产儿生理性黄疸可延长至 2～4 周消退	生后 24 小时之内出现黄疸，胆红素浓度>102 μ（6） 足月儿血清胆红素浓度>220.6 μ（12.9），早产儿>255 μ（15） 血清胆红素每天上升 85 μ（5） 黄疸持续时间较长，超过 2～4 周，或进行性加重

3. 分类



4. 病因



5. 诊断要点

病史	
生后 24 小时内出现黄疸，进展速度快者，应首先考虑同族免疫性溶血	如生后 3～4 天出现较轻的、进展不快的黄疸而且肝脾无明显肿大者，则首先考虑生理性黄疸

⇩

临床表现
新生儿同族免疫性溶血病，轻型者往往仅有皮肤黄染症状，而重型者可出现水肿、贫血、肝脾大、心力衰竭

⇩

辅助检查		
血清胆红素浓度测定	对可疑溶血病患儿，应查母婴及血型、直接抗人球蛋白试验（试验）、特异抗体效价等	可疑新生儿肝炎患儿应作肝功能及病原学检查

⇩

引起新生儿病理性黄疸的几种主要疾病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/228016136045006030