

福建省松溪县完整版《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题真题题库（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不宜与麻杏止咳片、通宣理肺丸、消咳宁片合用的药品是

- A: 氯苯那敏
- B: 氨茶碱
- C: 地高辛
- D: 可待因

答案：C

2. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜清晨服用的药品是

- A: 格列美脲
- B: 普伐他汀
- C: 呋塞米
- D: 阿司匹林

答案：C

3. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差

- A: 琥珀酸亚铁(二价铁)
- B: 乳酸亚铁(二价铁)
- C: 右旋糖酐铁(二价铁)
- D: 枸橼酸铁(三价铁)

答案：D

4. 可导致体重增加的抗癫痫药是

- A: 苯妥英钠
- B: 拉莫三嗪
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案：C

5. 抗慢性阻塞性肺疾病药的用药监护，禁用于急性心肌梗死，并不得与其他黄嘌呤药同时使用的是

- A: 氨茶碱
- B: 二羟丙茶碱
- C: 多索茶碱
- D: 色甘氨酸

答案：C

6. 服用抗结核药异烟肼时，不

- A: 饮酒
- B: 吃鱼
- C: 喝茶
- D: 吸烟

答案：B

7. 病毒性肝炎、肝硬化等可引起

- A: 尿蛋白检测阳性
- B: 尿酸碱度增高
- C: 尿酸碱度降低
- D: 尿胆红素检测阳性

答案：D

8. 通过与肠黏膜接触，刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排出柔软成形粪便的药物是

- A: 比沙可啶
- B: 甘油栓
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案：A

9. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 病理性骨折
- D: 下肢深静脉血栓形成

答案：D

10. (2019 年真题) 长期应用糖皮质激素后的实验室检查结果常会出现

- A: 中性粒细胞减少
- B: 淋巴细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 淋巴细胞减少

答案：D

11. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

- A: 食醋
- B: 酒

C: 食盐

D: 脂肪

答案: A

12. 可能增加严重心血管疾病风险，减肥治疗的风险大于获益，已于 2010 年 10 月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

A: 奥利司他

B: 芬特明

C: 西布曲明

D: 安非拉酮

答案: C

13. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 氟桂利嗪

B: 金刚烷胺

C: 双氯芬酸

D: 哌替啶

答案: D

14. 需 2~10℃冷处保存，并避免冻结的药品

A: 胰酶片

B: 利福平片

C: 低精蛋白胰岛素注射剂

D: 脂肪乳

答案: C

15. 较易导致肾损伤的药物是

A: 环孢素

B: 比沙可啶

C: 酮康环孢素唑

D: 布洛芬

答案：D

16. 不良反应的评价结果分为 6 级,ADR 与用药时间相关性不密切,反应表现与已知该药 ADR 不相吻合,原患疾病发展同样可能有类似的临床表现,药品不良反应因果关系评价结果为

A: 肯定

B: 待评价

C: 很可能

D: 可能无关

答案：D

17. 长期应用苯二氮

A: 首剂效应

B: 后遗效应

C: 毒性反应

D: 戒断症状

答案：D

18. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,氯喹

A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

B: 导致新生儿血钙过高

C: 可能致胎儿畸形

D: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

答案：D

19. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍；此例体现了药物警戒的作用包括

- A: 药品上市前风险评估
- B: 发现与规避假、劣药流入市场
- C: 药品上市后风险评估
- D: 发现药品说明书问题

答案：C

20. 机体钙吸收减少的机制是

- A: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积
- B: 经肾排泄的药物消除减慢
- C: 组织吸收有自限性
- D: 药物生物转化障碍

答案：D

21. （2015 年真题）患者，女。62 岁，医师处方如下：

- A: 阿卡波糖
- B: 氯吡格雷
- C: 氨氯地平
- D: 二甲双胍

答案：B

22. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 丙氨酸氨基转移酶（ALT）与谷丙转氨酶（GPT）是两个反映肝脏功能的指标
- B: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中
- C: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类
- D: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比

答案：D

23. 高尿酸血症的诊断标准为日常饮食情况下，非同日两次空腹血尿酸水平（ $\text{g/mol} / \text{L}$ ）大于

A: 360

B: 480

C: 420

D: 240

答案：C

24. 消化性溃疡的用药注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

A: 维生素 E

B: 维生素 C

C: 维生素 B12

D: 维生素 D3

答案：C

25. （2019 年真题）患者，男，28 岁，外出进餐后出现腹泻，一日 6 次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

A: 干酵母片

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

C: 蒙脱石散

D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：C

26. 与二、三级信息源相比一级信息源的特点是

A: 对一个具体的问题提供的信息全面详实（简明扼要）

B: 对于查询的药物信息可以提供丰富的内容供读者参考

C: 内容更新

D: 内容广泛，使用方便

答案：C

27. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

A: 四级证据

B: 三级证据

C: 一级证据

D: 二级证据

答案：C

28. 2 型肥胖型糖尿病患者首选

A: 阿卡波糖

B: 格列喹酮

C: 比格列酮

D: 二甲双胍

答案：D

29. 高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物

A: 氢氯噻嗪

B: 卡托普利

C: 普萘洛尔

D: 哌唑嗪

答案：C

30. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 在注射胰岛素制剂时，针头可重复使用
- B: 注射胰岛素制剂时，应变换注射部位，两次注射点要间隔 2cm
- C: 未使用的胰岛素可以冷冻保存
- D: 开启的胰岛素需要冷藏保存

答案：B

31. 卡马西平使环孢菌素疗效降低属于()。

- A: 排泄
- B: 作用于同一受体的拮抗作用
- C: 酶诱导作用
- D: 与血浆蛋白结合

答案：C

32. (2016 年真题) 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数 (BMI) 是 ()。

- A: 20
- B: 30.2
- C: 18
- D: 27.8

答案：D

33. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

- A: 苯海索
- B: 恩托卡朋

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案：B

34. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

- A: 西地碘含片
- B: 氯己定含漱液
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 替硝唑含漱液

答案：C

35. 适用于夜间服用的药物是

- A: 氨基糖苷类
- B: 利尿药
- C: 他汀类
- D: 糖皮质激素

答案：C

36. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

- A: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- B: 硝苯地平联用普萘洛尔
- C: 阿托品联用普萘洛尔
- D: 铁剂联用维生素

答案：D

37. 皮下脂肪薄，局部循环差，致使皮下和肌肉注射给药的吸收不规则，即

- A: 药物代谢
- B: 药物吸收
- C: 药物排泄

D: 药物分布

答案：B

38. 失神发作首选

A: 苯妥英钠

B: 丙戊酸钠

C: 拉莫三嗪

D: 卡马西平

答案：B

39. 左旋多巴的禁用范围是

A: 12 岁以下儿童

B: 1 岁以下婴儿

C: 8 岁以下儿童

D: 3 岁以下幼儿

答案：D

40. β 受体阻断剂的主要不良反应是

A: 直立性低血压

B: 支气管痉挛

C: 足踝部水肿

D: 血尿酸升高

答案：B

41. 关于处方开具和调剂的说法正确的是()

A: 调剂处方时应做到“四查十对”

B: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品

C: 处方开具后 7 日内有效

D: 剂处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量

答案：A

42. 对于铁剂的使用，正确的为（）

A: 待血红蛋白恢复正常后，仍需继续服 3~4 个月

B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

C: 口服铁剂宜选用三价铁

D: 需要快速补铁的情况下，可以选择口服治疗

答案：B

43. 属于新型抗凝药物的是

A: 胺碘酮

B: 美托洛尔

C: 达比加群酯

D: 氯吡格雷

答案：C

44. 妇女在月经期间不宜服用的药品是

A: 山莨菪碱

B: 氨酚待因

C: 颠茄浸膏

D: 氢氯噻嗪

答案：D

45. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

A: 地尔硫

B: 硝苯地平

C: 利伐沙班

D: 胺碘酮

答案：A

46. 适应证

A: 中午忘吃药了怎么办

B: 这次拿的“×××”（商品名）是我以前一直服用的“格列齐特”吗

C: 这药能治我这种病吗

D: 这种药能报销吗

答案：C

47. 处方中外文缩写 p

A: 临睡时

B: 代表（）

C: 必要时

D: 微克

答案：A

48. （2016 年真题）关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）。

A: 应个体化用药

B: 按阶梯给药

C: 疼痛时用药，不痛时不需用药

D: 提倡无创给药方式，尽量口服

答案：C

49. Hb 量>90g/L 与低于正常参考的下限可诊断为

A: 中度贫血

- B: 轻度贫血
- C: 基本正常
- D: 重度贫血

答案：B

50. 属于非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 多替拉韦
- B: 奈韦拉平
- C: 阿巴卡韦
- D: 洛匹那韦

答案：B

51. 可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

- A: 特拉唑嗪
- B: 左氧氟沙星
- C: 头孢哌酮
- D: 卡马西平

答案：A

52. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响，长期服用阿司匹林

- A: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- B: 可能致胎儿畸形
- C: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- D: 导致新生儿血钙过高

答案：C

53. 患者，女，24 岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

- A: 红霉素乳膏
- B: 阿达帕林凝胶
- C: 过氧化苯甲酰凝胶
- D: 异维 A 酸片

答案：D

54. 属于单胺氧化酶抑制剂的药品是

- A: 度洛西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 雷尼替丁
- D: 奥美拉唑

答案：B

55. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

- A: HDL-C 降低
- B: 三酰甘油降低
- C: LDL-C 升高
- D: 糖耐量异常

答案：D

56. 控制心室率的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 美托洛尔
- C: 氯吡格雷
- D: 达比加群酯

答案：B

57. 患者正在使用的药物中,可使血尿酸水平升高的是 ()

- A: 美托洛尔和赖诺普利
- B: 氢氯噻嗪和阿司匹林
- C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- D: 美托洛尔和辛伐他汀

答案: B

58. 患者, 男, 56 岁, 诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查: HbeAg (+), HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT 200 U/L。现需要启动抗病毒治疗, 采用干扰素 α 和核苷 (酸) 类抗病毒药物。

- A: 血小板计数 $< 100 \times 10^9$ /L, 应减量
- B: 中性粒细胞计数 $< 0.5 \times 10^9$ /L, 应停药
- C: 中性粒细胞计数 $\leq 0.75 \times 10^9$ /L, 应减量
- D: 出现体温升高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚

答案: A

59. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C , 计算其等渗溶液的浓度是 ()。

- A: 2.61 (% , g/mL)
- B: 2.91 (% , g/mL)
- C: 3.11 (% , g/mL)
- D: 2.81 (% , g/mL)

答案: D

60. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染, 不宜选用的抗菌药物是:

- A: 阿奇霉素
- B: 左氧氟沙星

C: 头孢呋辛

D: 阿莫西林

答案：A

61. 无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

A: 3~4 日

B: 2~3 日

C: 5~10 日

D: 5~7 日

答案：D

62. 育龄人群慎用，否则可引起畸胎、肿瘤和溶血性贫血风险的药物是

A: 人促红素

B: 阿昔洛韦

C: 利巴韦林

D: 脂肪乳

答案：C

63. 患者，女，58 岁，罹患肺癌，术后化疗 3 次，半年后复发，决定使用安罗替尼 12mgqd 靶向治疗，既往有乙型肝炎病史，患者用药期间应密切监视的特殊不良反应是

A: 出血

B: 腹泻

C: 乙型肝炎复发

D: Q—T 间期延长

答案：A

64. 习惯性便秘

A: 羧甲基纤维素钠

B: 比沙可啶

C: 开塞露

D: 乳果糖

答案：B

65. 以下所列“WHO 公布的有关艾滋病传播途径”中，不正确的是

A: 吸毒

B: 母婴传播

C: 性行为

D: 蚊虫叮咬

答案：D

66. 用于对组织无刺激性药物

A: 静脉注射

B: 腔内注射

C: 肌肉注射

D: 动脉注射

答案：C

67. 维生素 B₁₂ 注射剂每次肌肉注射 50~200 μg，每支规格标识为

0.1mg，药师应告知患者每次注射

A: 2~6 支

B: 1~2 支

C: 1 / 2~2 支

D: 4~6 支

答案：C

68. 解救慢性重症铅性脑病患者给予

- A: 糖皮质激素
- B: 驱铅治疗
- C: 卫生教育
- D: 补充蛋白质

答案：A

69. 中毒时宜用毛果芸香碱解毒，不能用毒扁豆碱解毒的药物是()。

- A: 阿托品
- B: 卡马西平
- C: 毒扁豆碱
- D: 乙酰胺

答案：A

70. 缓解视疲劳可选用的药物是()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 氧氟沙星滴眼液

答案：B

71. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

- A: 清晨服用帕罗西汀
- B: 清晨服用硫酸镁
- C: 餐前服用格列本脲
- D: 餐前服用阿莫西林

答案：A

72. 适合餐前服用的是

- A: 多潘立酮
- B: 奥利司他
- C: 吲哚美辛
- D: 氟伐他汀

答案：A

73. 成年男性的血尿酸正常参考范围是

- A: $155\sim 357\ \mu\text{mol/L}$
- B: $550\sim 650\ \mu\text{mol/L}$
- C: $120\sim 160\ \mu\text{mol/L}$
- D: $208\sim 428\ \mu\text{mol/L}$

答案：D

74. (2020 年真题) 患者，男，41 岁，因甲状腺功能亢进症，服用甲巯咪唑治疗 5 个月，目前剂量是 10mgqd，今日查血常规：白细胞

$1.50\times 10^9/\text{L}$ (成人正常参考值为 $4\times 10^9/\text{L}\sim 10\times 10^9/\text{L}$)，中性粒细胞 $0.5\times 10^9/\text{L}$ (成人正常参考值为 $1.8\times 10^9/\text{L}\sim 6.3\times 10^9/\text{L}$)。根据血常规检查结果，关于该患者用药方案调整的说法，正确的是 ()

- A: 停用甲巯咪唑，严密观察，必要时加用粒细胞集落刺激因子
- B: 停用甲巯咪唑，改为丙硫氧嘧啶 50mg tid
- C: 甲巯咪唑减量至每日 5mg，并加用粒细胞集落刺激因子
- D: 将甲巯咪唑减量至每日 5mg

答案：A

75. 代表乙型肝炎病毒 e 抗原的是

- A: HBeAg
- B: HBcAb

C: HBsAb

D: HBeAb

答案：A

76. 不宜与食醋合用的药物是

A: 左旋多巴

B: 辛伐他汀

C: 硫酸亚铁

D: 磺胺类药物

答案：D

77. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的叙述错误的是

A: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SS-RIs)可引起戒断反应

B: 难治性抑郁症可尝试合用抗抑郁药和情感稳定剂或与非典型抗精神病药合用

C: 抗抑郁药尽量单一用药，不主张联用两种以上的抗抑郁药

D: 抗抑郁药起效较快，因此使用 2 周后即可判定疗效

答案：D

78. 关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的

A: 老年人由于组织器官老化和生理功能减退，容易罹患多种慢性疾病

B: 老年人的各种器官功能减退，机体适应能力下降，故一旦发病，病情常迅速恶化

C: 老年人患多种疾病，若治疗上存在矛盾时，应忽略不良反应，保证药物治疗的全面性

D: 老年人的症状和体征往往表现不典型

答案：C

79. (2018 年真题) 患者, 女, 21 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次/分, 化验结果: 血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝肾功能基本正常, 白细胞计数正常, 诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

- A: 注意休息补充营养, 使用甲巯咪唑治疗
- B: 选用 ^{131}I 治疗
- C: 碘化钾治疗, 定期复查
- D: 甲状腺次全切除手术

答案: A

80. 高血压、动脉硬化患者突然发生剧烈头痛, 提示可能是

- A: 脑血管意外
- B: 脑肿瘤
- C: 动脉瘤
- D: 脑膜炎

答案: A

81. 患者, 男, 46 岁, 拟行肠道手术, 术前 1 天使用导泻药的方法是 ()

- A: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- B: 50%硫酸镁溶液口服
- C: 50%葡萄糖注射液湿敷
- D: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

答案: B

82. 可用于不明毒物、与其形成腐蚀性较小的化合物的是

- A: 药用炭混悬液
- B: 鸡蛋白

C: 1%氯化钠溶液

D: 3%~5%鞣酸溶液

答案: C

83. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

A: 埃索美拉唑

B: 西咪替丁

C: 硫糖铝

D: 莫沙必利

答案: B

84. 一般较轻，结膜可充血和水肿，瘙痒而伴有流泪，一般无分泌物或稍有黏液性分泌物的是

A: 急性卡他性结膜炎

B: 流行性结膜炎

C: 流行性出血性结膜炎

D: 过敏性结膜炎

答案: D

85. 下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A: 苯妥英钠

B: 普鲁卡因胺

C: 阿托品

D: 普萘洛尔

答案: A

86. 与甲氧苄啶组成复方制剂复方新诺明的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 替硝唑
- D: 磺胺多辛

答案：B

87. 下列药物使用方式，正确的是

- A: 氧氟沙星滴眼液打开后可使用 3 个月
- B: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服
- C: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案：C

88. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

- A: 青霉素？
- B: 异烟肼？
- C: 布地奈德？
- D: 特布他林？

答案：B

89. 急性痛风性关节炎期首选药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 碳酸氢钠
- C: 别嘌醇
- D: 苯溴马隆

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/228134036143007023>