专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024贵州省习水县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题完整题库【考试直接用】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.典型结核病的临床表现错误的是

A：咳嗽

B：食欲减退

C：高热

D：乏力

答案：C

2.下列药物中，属于可逆性、选择性单胺氧化酶A抑制剂的是（）

A：氯米帕明

B：氟伏沙明

C：吗氯贝胺

D：阿米替林

答案：C

3.关于胆石症的患者教育，错误的是

A：有消化不良症状应做鉴别诊断

B：低胆固醇饮食

C：使用抗菌药物

D：避免快速减重和不吃早餐

答案：C

4.宜溶解于温开水中后服用

A：粉剂

B：糖浆剂

C：胶囊剂

D：泡腾片

答案：D

5.抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

A：卡马西平

B：拉莫三嗪

C：丙戊酸钠

D：苯妥英钠

答案：B

6.预混胰岛素30R的组成为()

A：70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素

B：30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素

C：70%中效胰岛素，30%短效胰岛素

D：30%中效胰岛素，70%短效胰岛素

答案：C

7.（2016年真题）患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。

A：氨氯地平片可用于早上服用

B：阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用

C：若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

D：阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎

答案：C

8.下列不属于药物警戒工作范畴的是

A: 发现药物不良反应

B: 发现药物相互作用

C: 指导制定临床治疗方案

D: 药品致死率估计

答案：C

9.能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 随访工作效果，并建立档案

D: 对问题进行确定并归类

答案：A

10.一新生儿确诊感染乙型肝炎，提示其生母妊娠期间血清学检查结果是

A: HBsAg为阳性

B: HBsAb，HBeAg均为阳性

C: HBeAg为阳性

D: HBsAg，HBeAg均为阳性

答案：D

11.癫痫持续状态的好发年龄段为（）

A: 65岁以上

B: 55岁以上

C: 6岁以内

D: 1岁以内及65岁以上

答案：D

12.在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即
A：可用可不用的药物应尽量不用或少用
B：用药必须有明确的指征和适应证
C：选用对胎儿危害较小的药物
D：禁止用试验性药
答案：B

13.下列不属于鼻黏膜肿胀的用药与健康提示内容是
A：α 受体激动剂口服一般连续使用不超过2周
B：妊娠及哺乳期妇女禁用肾上腺素受体激动剂
C：应用肾上腺素 α 受体激动剂时，应采用间断给药
D：驾车司机、高空作业者、精密仪器操作者在服用或滴药后4小时内不宜从事本职工作
答案：A

14.治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处1片，一日不得超过3片的药物是()
A：地塞米松粘贴片
B：冰硼咽喉散
C：西地碘含片
D：甲硝唑口腔粘贴片
答案：A

15.患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压160／100mmHg。
A：水电解质失衡

B: 刺激性干咳

C: 二重感染

D: 心律失常

答案：B

16.肾衰竭者

A: 不能用强利尿剂

B: 不能导泻

C: 不能催吐

D: 禁止洗胃

答案：A

17.以下药物中，最可能引起嗜酸性粒细胞增多的是

A: 头孢哌酮

B: 甲基多巴

C: 坎地沙坦

D: 泼尼松

答案：A

18.患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该ADR的因果关系评价结果是

A: 肯定

B: 可能无关

C: 可能

D: 很可能

答案：D

19.患者,男,62岁,临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾,产生的药物相互作用属于()

A: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

B: 敏感化作用,药品不良反应增加

C: 拮抗作用,药品不良反应增加

D: 降低抗药性,疗效增加

答案：D

20.用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 服药后预计起效时间及维持时间

B: 合理用药信息

C: 注射剂配制溶媒、浓度

D: 首次剂量、维持剂量以及用药间隔

答案：B

21.患者，女，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见WBC15×109／L，中性粒细胞百分比85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

C: 首选针对革兰阳性菌的药物

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：C

22.（2016年真题）从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是（）。

A：伪麻黄碱

B：对乙酰氨基酚

C：布洛芬

D：氯苯那敏

答案：D

23.患儿，男，1岁3个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A：泼尼松2mg/（kg·d）口服

B：立即停止使用维生素D

C：降钙素50～100U/d肌注

D：少饮水

答案：D

24.属于渗透性泻药，成人起始剂量每日30ml，早餐时一次性服用，糖尿病患者应慎用的是

A：比沙可啶

B：乳果糖

C：欧车前

D：聚乙二醇4000

答案：B

25.可能导致癫痫发作的药物是

A：白消安

B：麻黄碱

C：氟哌啶醇

D：利血平

答案：B

26.患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A：肺动脉栓塞

B：下肢动脉栓塞

C：下肢深静脉血栓形成

D：病理性骨折

答案：C

27.HMG-CoA还原酶抑制剂

A：吉非贝齐

B：考来烯胺

C：阿昔莫司

D：辛伐他汀

答案：D

28.（2019年真题）患者，男，73岁，胃溃疡病史2年，半年前出现静止性震颤，搓丸样，运动迟缓，面具脸，慌张步态，该患者应使用的药物是

A：司来吉兰

B：多奈哌齐

C：甲基多巴

D：多巴丝肼（苄丝肼左旋多巴）

答案：D

29.急需查询输液剂的配伍禁忌，首选的书籍是

A：《新编药物学》

B：《注射药物手册》

C：《药物治疗学：病理生理学的方法》

D：《药物流行病学》

答案：B

30.口服普萘洛尔用于解救的是（）

A：氯丙嗪中毒

B：苯丙胺中毒

C：瘦肉精中毒

D：硝西泮中毒

答案：C

31.吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

A：间羟胺

B：地西泮

C：阿托品

D：有机硫类

答案：B

32.抗高血压不能合用的药物

A：利尿药和β受体阻滞药

B：钙通道阻滞药和硫酸镁

C：α受体阻滞药和β受体阻滞药

D：钙通道阻滞药和ACEI或ARB

答案：B

33.患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近三个月的血糖总体控制情况，应检测的指标是()

A: 空腹血糖

B: 糖化血红蛋白

C: 血红蛋白

D: 餐后2小时血糖

答案：B

34.可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

A: 短效 β

B: β 受体拮抗剂

C: 非甾体抗炎药

D: 吸入型糖皮质激素

答案：A

35.根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

A: 氨苄西林

B: 克林霉素

C: 维生素K1

D: 红霉素

答案：A

36.急诊处方药品用量一般不宜超过

A: 7日用量

B: 1日用量

C: 3日用量

D: 15日用量

答案：C

37.血清 γ-谷氨酰转移酶正常参考区间是

A: 成人＜50U/L

B: 成人＜40U/L

C: 男性＜40U/L

D: 男性11～50U/L

答案：D

38.饭后半小时服用的药物是（）

A: 瑞巴派特

B: 枸橼酸铋钾

C: 雷贝拉唑

D: 吉法酯

答案：D

39.及时发现重大药害事件，即可防止药害事件的蔓延和扩大；说明ADR监测的意义是

A: 促进新药的研制开发

B: 促进临床合理用药

C: 为“药品召回”提供依据

D: 减少ADR的危害

答案：D

40.主要药物代谢酶系活性接近成人，对多数药物具有足够的代谢能力，即

A: 药物分布

B: 药物排泄
C: 药物代谢
D: 药物吸收
答案：C

41.成人白细胞计数（WBC）的正常参考区间是
A: （3.5～10.0）X109/L
B: （5.0～12.0）X109/L
C: （5.0～10.0）X109/L
D: （4.0～10.0）X109/L
答案：D

42.患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是（）。
A: 肯定
B: 可能
C: 可能无关
D: 很可能
答案：A

43.下列药物信息源中，归属一级文献资料的是
A: 中国药学杂志
B: 中国药学文摘
C: 中国药学年鉴
D: 新编药物学
答案：A

44.后记

A：主要实验室数据

B：临床诊断、费别

C：药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

D：医师签名、药品金额

答案：D

45.可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

A：易制毒药品

B：精神刺激剂

C：蛋白同化制剂

D：肽激素类

答案：C

46.儿童退热的用药选择和单次用量,正确的是()

A：阿司匹林30~60mg/kg

B：布洛芬0.4~0.6g（12岁以上儿童）

C：对乙酰氨基酚25~50mg/kg

D：对乙酰氨基酚10~15mg/kg

答案：D

47.增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

A：拉氧头孢

B：加替沙星

C：利巴韦林

D：头孢哌酮

答案：B

48.（2018年真题）在患者入院、转科和出院时,药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱,核对患者目前的整体用药情况,避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等,以保证患者用药安全的药学服务过程,属于（）

A：药学干预

B：处方审核

C：药物利用评价

D：药物重整

答案：D

49.香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是

A：维生素K

B：青霉胺

C：纳洛酮

D：乙酰胺

答案：A

50.阿托品与小活络丹合用

A：两者合用作用相反，互相降低药效

B：合用后增加毒性，出现药物中毒

C：合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

D：合用后抑制后者吸收，降低疗效

答案：B

51.细菌感染患者可出现

A：红细胞/血红蛋白减少

B：血小板增多

C：中性粒细胞增多

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：C

52.（2016年真题）患者，男，58岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀40mgqd，患者用药期间应定期监测的生化指标是（）。

A：Hb

B：ALT

C：BUN

D：RBC

答案：B

53.心力衰竭的妊娠期妇女禁用

A：强心苷

B：β受体阻断剂

C：RAAS抑制剂

D：利尿剂

答案：C

54.不宜肌内注射或直接静脉注射，滴注速度过快可出现红人综合征的药物是

A：洛铂

B：苯妥英钠

C：万古霉素

D：培氟沙星

答案：C

55.保护药品免受破坏的联合用药是

A：磷霉素联用其他抗菌药物

B：硫酸阿托品联用吗啡

C：头孢哌酮／舒巴坦复方制剂

D：普萘洛尔联用硝苯地平降血压

答案：C

56.适用于哺乳期女性避孕，须每日的同一时间服用并且不能有一日间断，一旦漏服应采用额外的避孕方法的药物是

A：口服左炔诺孕酮(1.5mg)

B：短效复方口服避孕药

C：口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮0.35mg)

D：甲羟孕酮150mg肌内注射

答案：C

57.口服氯化铵或给予维生素C，可解救

A：丙米嗪中毒

B：苯丙胺中毒

C：氯丙嗪中毒

D：氰化氢中毒

答案：B

58.肿瘤患者在化疗后出现焦虑，可对症给予

A：醋酸甲地孕酮一地塞米松

B：苯海拉明一利多卡因一氢氧化镁铝

C：吗啡

D：劳拉西泮

答案：D

59.严重铅中毒患者出现的最难救治的临床症状是

A：中毒性肝炎

B：铅毒性脑病

C：贫血

D：中毒性肾炎

答案：B

60.易引湿的药物是()。

A：硝酸甘油

B：青霉素

C：胃蛋白酶

D：硫酸镁

答案：C

61.嗜酸性粒细胞正常参考区间是

A：0.01～0.05

B：0.03～0.08

C：0.20～0.40

D：0～0.01

答案：A

62.中国药学会医院药学专业委员会推荐的国内药历格式不包括

A：正文

B：病历摘要

C：基本情况

D：用药记录

答案：A

63.诊断为输尿管结石，给予黄体酮，应评判为

A：联合用药不适宜

B：无正当理由超适应证用药

C：有禁忌证用药

D：过度治疗用药

答案：B

64.（2017年真题）用于评价肝功能不全严重程度的是（）

A：CTP评分标准

B：Cochrane证据分级

C：数字评分法

D：APACHE评分系统

答案：A

65.下列药学服务的对象中，不属于药学服务的特殊人群是

A：血液透析者

B：小儿、老人

C：住院患者

D：特殊体质者

答案：C

66.以下药物中，可以导致血钾升高的药物不包括（）

A：吲达帕胺

B：螺内酯

C：阿米洛利

D：卡托普利

答案：A

67.属于核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是

A：恩夫韦替

B：沙奎那韦

C：奈韦拉平

D：扎西他滨

答案：D

68.以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皲裂型足癣的处方药是

A：依沙吖啶

B：尿素

C：苯甲酸

D：特比萘芬

答案：D

69.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A：社区获得性肺炎

B：肺结核

C：肺气肿

D：急性支气管炎

答案：D

70.适用于静脉推注的抗肿瘤药为

A: 甲氨蝶呤

B: 塞替派

C: 阿糖胞苷

D: 氮芥

答案：D

71.患者，男，45岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 速感宁胶囊

C: 速克感冒片

D: 维C银翘片

答案：A

72.医生开具处方，必须使用药品的名称是

A: 药品习用名

B: 药品通用名

C: 药品商标名

D: 药品化学名

答案：B

73.以下"规范应用白三烯受体拮抗剂治疗慢性阻塞性肺疾病"的叙述中，不正确的是

A: 不宜首选治疗急性哮喘

B: 在治疗COPD时不宜单独应用

C: 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制

D: 不宜用于急性发作

答案：C

74.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A：一次性尽量提供更多的信息

B：尽量避免使用专业术语

C：认真聆听

D：可提供一些宣传资料

答案：A

75.设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

A：《美国药典药物信息》

B：《中国国家处方集》

C：《马丁代尔药物大典》

D：《药物事实与比较》

答案：A

76.发热持续3周以上，体温多次超过38.3℃,经过至少1周深入细致的检查仍不能确诊的

A：不明原因发热

B：中低等度热

C：超高热

D：长期低热

答案：A

77.（2017年真题）患者男,70岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是（）

A：普拉克索

B：甲基多巴

C：卡比多巴

D：苯海索

答案：D

78.某女性，19岁，2年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血T

A：皮疹

B：粒细胞计数减少

C：嗜睡

D：白细胞计数减少

答案：C

79.为了与生物钟同步，适宜于睡前服用的是

A：维生素C

B：普伐他汀

C：多潘立酮

D：二甲双胍

答案：B

80.与诺氟沙星合用可提高对致病性细菌感染的疗效的是

A：八面体蒙脱石

B：莫沙必利

C：地芬诺酯

D：酚酞

答案：A

81.正常人的体温在37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 口腔温度超过37.3℃

B: 直肠温度超过36.3℃

C: 腋下温度超过36.6℃

D: 口腔温度超过37.0℃

答案：A

82.（2017年真题）高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是（）

A: 非洛地平片

B: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

C: 维A酸片

D: 左旋多巴片

答案：D

83.服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

A: 抗利尿药

B: 苦味健胃药

C: 利胆药

D: 抗尿结石药

答案：B

84.除常规检查外，需要检查有无瘪粒、变形、膨胀等变质现象的制剂是

A: 软膏剂

B：注射剂

C：丸剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/235103222114012033