

介入手术部三基考核

一、选择题

1. 主动脉夹层最常见的病因是 () [单选题]。

A. 高血压 ✓

B. 怀孕

C. 主动脉粥样硬化

D. 动脉损伤

2. 主动脉夹层引起脏器或肢体缺血不包括 () [单选题]。

A. 偏瘫

B. 少尿、无尿

C. 肢体发凉

D. 皮肤湿疹样改变 ✓

3. 主动脉夹层的急性期是指发病时间为 () [单选题]。

A. 24 小时内

B. 一周以内

C. 两周以内 ✓

D. 3 周以内

4. 主动脉夹层首选的检查方法为 () [单选题]。

A. CTA ✓

B. MRA

C.DSA

D.X 线

5.主动脉夹层病人术前血压应控制在 () [单选题]。

A.130/80mmHg

B.120/80mmHg

C.110/80mmHg✓

D.90/60mmHg

6.主动脉夹层病人术后肾功能良好时，尿量每小时为多少 () [单选题]。

A.30ml 以上✓

B.40ml 以上

C.50ml 以上

D.60ml 以上

7.主动脉夹层腔内隔绝术后卧床时间为 () [单选题]。

A.1 天

B.1 周✓

C.10 天

D.2 周

8.主动脉夹层腔内隔绝术罕见的严重并发症是 () [单选题]。

A.血栓形成

B.血栓脱落

C.截瘫✓

D.内漏

9.夹层破裂时突出而又特征性的症状是（ ）[单选题]。

A.撕裂样疼痛✓

B.高血压

C.神志改变

D.尿少

10.休克病人使用血管扩张药必须具备的条件是（ ）[单选题]。

A.纠正酸中毒

B.心功能正常

C.补充血容量✓

D.先用血管收缩药

11.休克早期的临床表现是（ ）[单选题]。

A.表情淡漠

B.四肢厥冷

C.血压下降，脉速

D.脉压小，尿量减少✓

12.各种类型休克基本病理变化是（ ）[单选题]。

A.血压降低✓

B.中心静脉压降低

C.脉压降低

D.尿量减少

13.成年人急性失血至少一次失血量超过总血量多少才能引起休克（ ）[单选题]。

A.15%

B.20%✓

C.30%

D.40%

14.介入治疗中，血管内给予尿激酶的意义是（ ）[单选题]。

A.扩血管

B.抗肿瘤

C.缩血管，止血

D.溶栓✓

15.布-加综合征支架置入术的适应证有（ ）[单选题]。

A.肝段下腔静脉膜性或节段性狭窄或闭塞，伴或不伴血栓形成

B.PTA 疗效不佳或再狭窄病例✓

C.下腔静脉长段完全性闭塞

D.下腔静脉癌性狭窄或闭塞

16.下肢深静脉血栓形成的主要原因（ ）[单选题]。

A.静脉壁损伤

B.血流缓慢

C.血液高凝状态

D.以上都是✓

17.怀疑颅内压增高的患者床头应抬高多少度（ ）[单选题]。

A.10-15°

B.15-20°

C.20-30°✓

D.30-40°

18.急性脑梗塞溶栓的时间要求控制在 1 小时内是指 () [单选题]。

A.病人从发病到医院急诊就诊时间

B.病人从发病到医院急诊后开始用药时间

C.病人从医院急诊就诊时间到开始用药时间✓

D.病人从发病到医院急诊就诊后决定用药时间

19.根据 GCS 昏迷评分:疼痛刺激睁眼, 只能发音, 对疼痛刺激屈曲反应为 () [单选题]。

A.6 分

B.7 分✓

C.8 分

D.9 分

20.一男性患者, 因车祸致腹部损伤, 该患者立即出现休克, 腹穿抽出不凝血, 应首先考虑 () [单选题]。

A.肝损伤

B.脾损伤✓

C.肾损伤

D.胰脏损伤

21.对于阻塞症状较清的小细胞型肺癌不宜首选支架植入, 约()病人于正规化疗后 2 天-1 周症状可消失 () [单选题]。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%✓

22.上腔静脉阻塞的病因多数为纵膈肿瘤或肺门的肿瘤压迫、放疗后血管闭塞,以及长期透析管置入导致

() [单选题]。

A.静脉血栓形成✓

B.肺栓塞

C.出血

D.浅表胸壁静脉曲张

23.胸主动脉瘤一旦发生破裂,临床迅速出现症状不包括() [单选题]。

A.剧烈胸痛

B.低血压

C.休克

D.猝死✓

24.腹主动脉瘤病理不包括() [单选题]。

A.真性动脉瘤✓

B.假性动脉瘤

C.囊状动脉瘤

D.夹层动脉瘤

25.腹主动脉瘤支架成形术的禁忌症中,支架上缘距肾动脉开口() [单选题]。

A.<1cm✓

B.<2cm

C.<3cm

D.<4cm

26.机械通气患者吸痰时,每次吸引时间不超过() [单选题]。

A.5S

B.10S

C.15S✓

D.20S

27.胸主动脉瘤的血管腔内修复术疗效评价标准为（ ）[单选题]。

A.支架内血流通畅

B.动脉瘤腔被完全隔离

C.无重要并发症

D.以上都是✓

28.上腔静脉阻塞综合征的缩写是（ ）[单选题]。

A.VTE

B.KTS

C.SVCS✓

D.FMD

29.急性血源性骨髓炎晚期特点（ ）[单选题]。

A.骨质破坏

B.死骨形成

C.形成局限性脓肿

D.新股形成和骨性死腔✓

30.急性血源性骨髓炎护理中不妥的是（ ）[单选题]。

A.患肢必须给以固定

B.物理降温，预防惊厥

C.高蛋白，高糖，高维生素饮食

D.体温正常后可下床活动✓

31.临时备用医嘱的有效期为（ ）[单选题]。

A.6 小时

B.12 小时✓

C.24 小时

D.36 小时

32.患者住院病历排在首页的是（ ）[单选题]。

A.化验结果报告

B.长期医嘱单

C.临时医嘱单

D.体温单✓

33.医疗和护理文件的书写要求不正确的是（ ）[单选题]。

A.记录及时、准确

B.内容简明扼要、清晰

C.医学术语运用确切

D.有错误应用红笔写“注销”二字，并签名✓

34.现场抢救猝死患者首选的方法是（ ）[单选题]。

A.口对口人工呼吸

B.口对鼻人工呼吸

C.胸外心脏按压✓

D.俯卧压背人工呼吸

35.抢救过敏性休克患者,错误的措施是 () [单选题]。

- A.立即停药,送抢救室抢救✓
- B.立即皮下注射盐酸肾上腺素
- C.氧气吸入;注意保暖
- D.根据医嘱给予抗过敏药

36.从血库中取出的温度较低的血液应在室温下放置()分钟后再输入 () (N3-N4) [单选题]*

- A.5~10min
- B.10~15min
- C.15~20min✓
- D.20~30min

37.从血库中取出的温度较低的血液应在室温下放置()分钟后再输入 () (N3-N4) [单选题]*

- A.5~10min
- B.10~15min
- C.15~20min✓
- D.20~30min

38.关于口头医嘱的执行不正确的是 () (N5) [单选题]*

- A.患者生命垂危需紧急抢救的情况下,医生可下达临时口头医嘱
- B.对于口头医嘱,护士执行无需向医生复述可直接执行✓
- C.抢救中使用的空安剖瓶经医护双方核对方可丢弃
- D.对特殊药物,如剧毒药、麻醉药物不可执行口头医嘱

39.患者跌倒/坠床防范及监管报告制度错误的是 () (N5) [单选题]*

- A.对患者病情、用药、步态、自理能力等进行动态评估

- B.评分大于 45 分的高危患者，应每周动态评估一次
- C.医院有防跌倒环境安全管理措施，如走廊扶手，地面防滑等
- D.一旦发生跌倒坠床，应该 24 小时内上报不良事件✓

40.关于病房药品管理制度说法不正确的是 () (N5) [单选题]*

- A.抢救车药品基数准确、定位放置、无混装、变质、过期
- B.特殊及贵重药品专人保管，单独存放并加锁
- C.需要冷藏的药品要放在冰箱内，以免影响药效
- D.毒麻药品单独存放，单人管理，班班交接✓

二、多选题

1.急性肾衰竭少尿期代谢紊乱常表现为 () (N1-N2) [多选题]*

- A.氮质血症✓
- B.代谢性酸中毒✓
- C.水中毒✓
- D.高钠血症

2.内囊出血“三偏”征为 () (N1-N2) [多选题]*

- A.对侧偏麻✓
- B.双眼同向性偏盲✓
- C.同侧偏瘫
- D.对侧偏瘫✓

3.小脑幕切迹疝应急流程有 () (N1-N2) [多选题]*

- A.遵医嘱甘露醇 250ml 快速静滴或速尿 20mg 静推✓
- B.保持呼吸道通畅，吸氧，抬高床头 15-30°✓

C.密切观测意识、瞳孔、生命体征变化✓

D.如果出现呼吸困难给与平卧位开放气道气管插管

4.关于心肺复苏指南，下列正确的是（ ）(N3-N4) [多选题]*

A.AHA 成人生存链分为两链:一链为院内急救体系，另一链为院外急救体系✓

B.每次按压后使胸廓充分回弹✓

C.开始人工呼吸再进行胸外按压

D.复苏后的体温选定在 32 到 36 度之间✓

5.关于心肺复苏指南，下列正确的是（ ）(N3-N4) [多选题]*

A.AHA 成人生存链分为两链:一链为院内急救体系，另一链为院外急救体系✓

B.每次按压后使胸廓充分回弹✓

C.开始人工呼吸再进行胸外按压

D.复苏后的体温选定在 32 到 36 度之间✓

6.关于深静脉血栓护理应急预案正确的是（ ）(N3-N4) [多选题]*

A.绝对卧床休息，抬高患肢✓

B.避免用力活动功能锻炼✓

C.观察患者肢体肿胀程度，密切观察患者病情变化，有无意识障碍，胸闷，胸痛气促等症状✓

D.观察患者皮肤情况，有出血立即停用抗凝药

7.关于肺栓塞护理应急预案正确的是（ ） [多选题]。

A.立即平卧，绝对卧床休息✓

B.通知医生进行积极处理✓

C.保持气道通畅，4-6L/min 氧气吸入，建立静脉通路✓

D.立即给与心电监护，评估有无早期心衰症状✓

8.关于火灾的应急预案正确的是() [多选题]。

A.发现火灾后立即组织周围人员灭火,同时电话通知保卫科✓

B.判断火情发现无法扑灭立即拨打 119 并告知准确方位✓

C.关好临近房间门窗,减慢火势蔓延趋势✓

D.组织患者撤离到安全地带,稳定患者情绪,保障患者安全✓

9.行为训练的主要教学方法包括() [多选题]。

A.操作技能培训✓

B.模仿学习✓

C.行为矫正✓

D.模拟与游戏✓

10.脑梗死静脉溶栓后常用药物类型有() [多选题]。

A.抗血小板聚集✓

B.降压药✓

C.脱水药✓

D.营养神经类药✓

A2

1.病室最适宜的温度和相对湿度为() [单选题]。

A.14~15°C15%~25%

B.10~17°C30%~40%

C.20~22°C40%~50%

D.18~22°C50%~60%✓

E.15~16°C60%~70%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/235121040314011110>