

2024 广东省兴宁市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库附答案（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 急性痛风性关节炎期首选药物是

- A: 别嘌醇
- B: 苯溴马隆
- C: 碳酸氢钠
- D: 秋水仙碱

答案：D

2. 在手术麻醉时给予患者阿托品抑制腺体分泌、减少呛咳以致误吸的发生，但易引起腹胀、尿潴留，此种不良反应属于

- A: 副作用
- B: 撤药反应
- C: 特异质反应
- D: 继发反应

答案：A

3. 在处方用药适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会增加毒性或不良反应的是

- A: 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- B: 头孢哌酮和舒巴坦
- C: 阿莫西林和克拉维酸钾
- D: 苄丝肼和左旋多巴

答案：A

4. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

A: 冻状便

B: 黏液便

C: 稀糊状或水样粪便

D: 米泔水样便

答案：A

5. 关于处方书写中的基本要求错误的

A: 一般情况下均要注明临床诊断

B: 年龄必须写实足年龄

C: 中药饮片调剂、煎煮的特殊要求注明在药品左上方并加括号

D: 麻醉药品处方应有病历记录

答案：C

6. 可导致嗜酸性粒细胞升高及维生素 K 减少的抗菌药物是

A: 头孢哌酮

B: 青霉素

C: 头孢唑林

D: 美罗培南

答案：A

7. 下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

A: 氧化锌

B: 硼酸

C: 炉甘石

D: 滑石粉

答案：B

8. 双膦酸盐属于

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨吸收抑制剂
- D: 骨形成刺激剂

答案：C

9. 现代药物临床治疗更多依赖于循证医学的支持，在循证医学证据分级中，证据和推荐强度的级别最高的是()

- A: 单个大样本随机对照试验
- B: 同质病例对照试验的系统评价
- C: 大样本病案系列
- D: 同质随机对照试验的系统评价

答案：D

10. 血红蛋白(HGB)正常参考区间是

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times$
- B: $170 \sim 200\text{g/L}$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- D: $180 \sim 220\text{g/L}$

答案：B

11. 对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

- A: 甲苯咪唑
- B: 吡喹酮
- C: 噻嘧啶

D: 哌嗪

答案: A

12. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 短暂性脑缺血发作

B: 脑血栓形成

C: 缺血性脑卒中

D: 脑出血

答案: D

13. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 卡马西平

B: 丙戊酸钠

C: 左乙拉西坦

D: 阿卡波糖

答案: A

14. 不宜与蛋白质食物合用的药物是

A: 左旋多巴

B: 硫酸亚铁

C: 磺胺类药物

D: 辛伐他汀

答案: A

15. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

A: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

B: 呋塞米片 200mgqdp

C: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

D: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

答案: D

16. 应在清晨服用, 可迅速在肠道发挥作用的盐类泻药是

A: 噻氯匹定

B: 沙丁醇胺

C: 硫酸镁

D: 维生素 B1

答案: C

17. (2019 年真题) 患者, 女, 29 岁, 孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状, 化验结果为 Hb71g/L, 诊断为缺铁性贫血, 予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A: 先静脉注射负荷剂量, 再静脉滴注余下剂量

B: 快速静脉注射

C: 先少量缓慢静滴, 观察无过敏反应后, 再继续静脉滴注余下剂量

D: 口服每次 5ml, 一日 3 次

答案：C

18. 轻症、慢性疾病治疗时，因用药持久，适宜选用

- A: 栓剂
- B: 注射剂
- C: 软膏剂
- D: 片剂

答案：D

19. 患者，男，80 岁，临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是()

- A: 睡前服用，起床站立时应缓慢，预防体位性低血压
- B: 睡前服用，注意监测肾功能
- C: 睡前服用，定期监测肝功能
- D: 每日服用一次，定期监测血糖，防止发生低血糖反应

答案：A

20. 处方的经济性是指

- A: 处方是药品消耗及药品经济收入结账、患者用药报销的凭证和原始依据
- B: 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件
- C: 处方由前记、正文与后记三部分组成
- D: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别担负有相应的责任

答案：A

21. 以下不同人群中，白细胞或红细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

- A: 儿童
- B: 新生儿
- C: 成人男性
- D: 成人女性

答案：B

22. 患者,女,27 岁,孕 32 周,因尿急尿痛就诊,诊断为尿路感染,应选用的药物是 ()

- A: 莫西沙星片
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 阿奇霉素片
- D: 复方磺胺甲噁唑片

答案：B

23. 给药时间、给药途径或剂型错误, 归属于

- A: 管理缺失
- B: 操作失误
- C: 产品缺陷
- D: 患者经济拮据

答案：B

24. 膀胱炎约占尿路感染的 60%以上, 致病菌多为 ()

- A: 白色念珠菌
- B: 奈瑟淋病双球菌
- C: 金黄色葡萄球菌
- D: 大肠埃希菌

答案：D

25. 属于 C 级高危药品的是

- A: 血液透析液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 全胃肠外营养液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：A

26. (2017 年真题) 患者男, 70 岁, 典型的“面具脸”“慌张步态”表现, 临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是 ()

- A: 卡比多巴
- B: 普拉克索
- C: 甲基多巴
- D: 苯海索

答案：D

27. 药师在进行药学服务时, 经常查阅一些相关网站, 获取一些有用信息} 中华医学会的网址是

- A: www. cm
- B: org. cn
- C: www. cp
- D: org. cn

答案：A

28. 禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括 ()

- A: 5-HT_{1A} 受体部分激动剂
- B: 三环类药物
- C: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

D: 苯二氮类药物

答案: D

29. 患者，男，43 岁。误服过量工业碘，可中和碘，用于碘中毒的洗胃液是

A: 牛奶与水等量混合

B: 活性炭混悬液

C: 淀粉溶液

D: 3%~5%鞣酸溶液

答案: C

30. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 儿科处方印刷用纸为淡黄色、右上角标注"儿科"

B: 麻醉药品处方印刷用纸为淡红色、右上角标注"麻醉"

C: 二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注"精二"

D: 中药处方印刷用纸为白色，右上角标注"中"

答案: C

31. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

A: 技术性

B: 法律性

C: 经济性

D: 有效性

答案: A

32. 痛风急性发作期为抑制粒细胞浸润可选用

- A: 秋水仙碱
- B: 泼尼松龙
- C: 苯溴马隆
- D: 别嘌醇

答案：A

33. (2016 年真题) 含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 溶血性贫血
- B: 消化性溃疡
- C: 粒细胞减少症
- D: 慢性肾衰竭

答案：D

34. 烫伤后药物选择不宜选用

- A: 京万红软膏
- B: 破伤风
- C: 润湿烧伤膏
- D: 甲紫

答案：D

35. 医学检查发现柏油样黑便并有光泽，通常见于

- A: 痔疮
- B: 直肠息肉
- C: 胃溃疡
- D: 肛裂

答案：C

36. (解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

- A: 丙戊酸钠中毒
- B: 磷化锌中毒
- C: 丙米嗪中毒
- D: 三唑仑中毒

答案：B

37. 注射氟马西尼，用于

- A: 解救丙咪嗪中毒
- B: 解救可待因中毒
- C: 解救硝西泮中毒
- D: 解救乙醇中毒

答案：C

38. 严重铅中毒患者出现的最难救治的临床症状是

- A: 中毒性肾炎
- B: 贫血
- C: 中毒性肝炎
- D: 铅毒性脑病

答案：D

39. 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是（）

- A: 氢氯噻嗪
- B: 甲巯咪唑
- C: 丙硫氧嘧啶

D: 阿托伐他汀

答案: D

40. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是 ()

A: 拉米夫定

B: 阿昔洛韦

C: 依非韦伦

D: 利巴韦林

答案: C

41. 主要用于抗病毒的药物是

A: 阿糖胞苷

B: 氟胞嘧啶

C: 氟尿嘧啶

D: 阿糖腺苷

答案: D

42. 重度中毒可发生中毒性肝炎，出现黄疸、出血及肝功能异常属于下列哪类药物中毒

A: 巴比妥类

B: 氯米帕明

C: 苯妥英钠

D: 阿米替林

答案: A

43. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 奥美拉唑

B: 碳酸氢钠

C: 莫沙必利

D: 西沙必利

答案: C

44. 服用他汀类调节血脂药可能导致

A: 血清总胆固醇升高

B: 血白细胞计数降低

C: 血清白蛋白升高

D: 血清碱性磷酸酶升高

答案: D

45. (2018 年真题) 老年女性, 心功能衰竭, 服用呋塞米及螺内酯片, 正确的使用方法是 ()

A: 舌下含服

B: 清晨服用

C: 应同时碱化尿液

D: 用温水调服

答案: B

46. 急性肠炎可出现 ()。

A: 鲜血便

B: 脓血便

C: 稀糊便

D: 脓状便

答案: C

47. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

D: $>342 \mu\text{mol/L}$

答案：B

48. 患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9°C ，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 每天用药最多不应超过3次，用药不超过3天

B: 每天用药最多不应超过6次，用药不超过3天

C: 每天用药最多不应超过5次，用药不超过3天

D: 每天用药最多不应超过4次，用药不超过3天

答案：D

49. (2016年真题) 甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是()。

A: 慢性肾衰竭

B: 粒细胞减少症

C: 溶血性贫血

D: 消化性溃疡

答案：B

50. 可提示轻度黄疸的是

A: $>342 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：C

51. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列想患者交代的用药注意事项，错误的是：

- A: 宜同时补充维生素 C
- B: 不宜同时进食牛奶和蛋类
- C: 不宜与铝剂同时服用
- D: 宜空腹服用

答案：D

52. 患者，男，55 岁，因支气管哮喘使用倍氯米松-福莫特罗干粉吸入剂治疗，症状控制良好，5 个月内无急性发作，拟进行降级治疗。关于哮喘降级治疗原则的说法，错误的是

- A: 首先降低激素剂量，再减少使用频率
- B: 通常每 3 个月减少倍氯米松剂量 25%~50%
- C: 以最低剂量的福莫特罗维持治疗，直到最终停药
- D: 降级治疗应选择适当时机，需避开患者呼吸道感染等情况

答案：C

53. 拉米夫定的适应证是

- A: 带状疱疹
- B: 流感
- C: 乙型病毒性肝炎
- D: 足癣

答案：C

54. 多柔比星的通用名是

- A: 克毒星

B: 无环乌苷片

C: 阿霉素

D: 病毒唑

答案: C

55. 用于香豆素类杀鼠药中毒的解毒剂是

A: 硫酸阿托品

B: 乙酰胺

C: 维生素 K1

D: 青霉胺

答案: C

56. 机体钙吸收减少的机制是

A: 组织吸收有自限性

B: 经肾排泄的药物消除减慢

C: 药物生物转化障碍

D: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积

答案: C

57. 饮食对粪外观的影响, 肉食

A: 黑褐色

B: 暗绿色

C: 红色

D: 酱色

答案: A

58. 抗结核化学药物治疗的主要适应证为

A: 肺结核病灶硬结已久

B: 痰菌阴性，无明显结核毒性症状

C: 有活动性肺结核病灶

D: 病灶部分硬结，痰菌阴性

答案：C

59. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A: 维生素 C

B: 维生素 A

C: 维生素

D: 复合维生素 B

答案：D

60. 患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

A: 地塞米松

B: 昂丹司琼

C: 苯海拉明

D: 甲氧氯普胺

答案：D

61. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 沙美特罗

B: 异丙托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 噻托溴铵

答案：D

62. 可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 沙利度胺
- C: 雌激素、孕激素、雄激素
- D: 叶酸拮抗剂

答案：C

63. 应用麻醉药利多卡因时宜

- A: 少食醋
- B: 不吸烟
- C: 不饮酒
- D: 少食盐

答案：B

64. 以下"规范应用白三烯受体拮抗剂治疗慢性阻塞性肺疾病"的叙述中，不正确的是

- A: 不宜首选治疗急性哮喘
- B: 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制
- C: 不宜用于急性发作
- D: 在治疗 COPD 时不宜单独应用

答案：B

65. $90\text{g/L} \leq \text{Hb 量} < \text{正常参考范围下限}$ 可诊断为

- A: 中度贫血
- B: 重度贫血
- C: 基本正常
- D: 轻度贫血

答案：D

66. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目为

- A: 抗-HBc(+)
- B: 抗-HBs(+)
- C: 抗-HBe(+)
- D: HBeAg(+)

答案：D

67. 氟马西尼用于解救的是（）

- A: 三唑仑中毒
- B: 有机磷中毒
- C: 汞中毒
- D: 氰化物中毒

答案：A

68. 患者，女，38岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力2日；查体：神清、气稍促，心律95bpm，律齐，体温39.1℃，血压110/70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰
- B: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用
- C: 镇咳药连续口服1周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素
- D: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

答案：C

69. 患者，女，76 岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，

- A: 美金刚
- B: 多奈哌齐
- C: 加兰他敏
- D: 卡巴拉汀

答案：C

70. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差（）

- A: 枸橼酸铁（3 价铁）
- B: 琥珀酸亚铁（2 价铁）
- C: 乳酸亚铁（2 价铁）
- D: 右旋糖酐铁（2 价铁）

答案：A

71. 慢性肾小球肾炎常见

- A: 细胞管型
- B: 蜡样管型
- C: 颗粒管型、透明管型
- D: 白细胞管型

答案：C

72. 以下有关肝功能不全患者用药原则的叙述中，不正确的是

- A: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物
- B: 选用从肝脏排泄的药物
- C: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- D: 特别应避免与肝毒性的药物合用

答案：B

73. 用 10%的氯化钠注射液和注射用水配制 3%的氯化钠注射液 100ml, 所需的 10%氯化钠注射液的毫升数是 ()

- A: 30
- B: 33.3
- C: 25
- D: 10

答案：A

74. 属于 5α 还原酶抑制剂的是 ()

- A: 雌三醇
- B: 普适泰
- C: 氟他胺
- D: 度他雄胺

答案：D

75. 男性，72 岁。高血压病 3 年，血压 165/95mmHg，伴 II 型糖尿病。首选降压药物是

- A: ACEI 类
- B: β -受体阻滞剂
- C: 心痛定
- D: 利尿剂

答案：A

76. 除常规检查外，需要检查有无瘪粒、变形、膨胀等变质现象的制剂是

- A: 软膏剂
- B: 胶囊剂

C: 丸剂

D: 注射剂

答案: B

77.2 级高血压是指

A: 收缩压 140~159mmHg 和（或）舒张压 90~99mmHg

B: 收缩压 160~179mmHg 和（或）舒张压 100~109mmHg

C: 收缩压 ≥ 180 mmHg 和（或）舒张压 ≥ 110 mmHg

D: 收缩压 < 120 mmHg 和舒张压 < 80 mmHg

答案: B

78. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒

B: 弱碱中和强酸

C: 药用炭吸附中毒物质

D: 二巯丙醇“驱汞”治疗

答案: C

79. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

A: 地尔硫

B: 硝苯地平

C: 胺碘酮

D: 利伐沙班

答案: A

80. 丝裂霉素的主要毒副作用是（）

- A: 出血性膀胱炎
- B: 心脏毒性
- C: 溶血性尿毒症
- D: 肺纤维化

答案：C

81. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务重要人群的是

- A: 住院患者
- B: 社区患者
- C: 门诊患者
- D: 过敏体质者

答案：D

82. 下列关于乙型肝炎病毒“大三阳”的表述，正确的是

- A: 如果肝功能正常，可定期监测，不需要抗病毒治疗
- B: 提示乙肝病毒在体内复制活跃，具有传染性，需要隔离
- C: 不具有传染性
- D: 乙型肝炎血清免疫学检查表现为 HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 阳性

答案：B

83. 某患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药
- B: 应注意监测血压变化，防止血压过度降低

C: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

D: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

答案：A

84. 减少因人员不足引致忙乱无序而带来的调配差错，是针对药品调配环节防范措施中的

A: 及时沟通

B: 规范操作、坚持核对

C: 保证足够的人力配备

D: 环境整齐、安静

答案：C

85. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 糖皮质激素

B: 抗菌药物

C: 布洛芬

D: 阿司匹林

答案：A

86. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A: 25～50mg/d

B: 150～300mg/d

C: 25～75mg/d

D: 75～150mg/d

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/235141202120012033>