

2024 年广东省遂溪县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题（易错题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，46 岁，因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂，近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查，诊断为侵袭性肺曲霉病，临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh(CTP) 评分为 13 分(CTPC 级)。根据 CTP 评分结果，药师的用建议是()

- A: 该患者中度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 50%
- B: 该患者重度肝功能不全，不建议使用伏立康唑
- C: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 25%
- D: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量不变

答案：B

2. 抗高血压的药是()。

- A: 二甲双胍
- B: 法莫替丁
- C: 卡托普利
- D: 多粘菌素

答案：C

3. 三环类抗抑郁药中毒应

- A: 静脉滴注烟酰胺
- B: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

C: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

D: 禁止使用肼类复能剂

答案：B

4. 青霉素常采用的剂量单位是

A: IU

B: mg

C: μg

D: g

答案：A

5. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级

A: A 级

B: D 级

C: B 级

D: C 级

答案：B

6. 下列有关焦虑症的叙述，错误的是

A: 大多数焦虑症起源于儿童或者青春期

B: 社交焦虑障碍严重者可表现为回避社交，导致社交隔离

C: 焦虑症有家族聚集性，女性焦虑症的患病率较高

D: 惊恐发作是焦虑症最常见的表现形式

答案：D

7. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 生理盐水

A: DOL

B: LD

C: NS

D: 0

答案：C

8. 现有一新生儿确诊感染乙型肝炎，以下可提示其生母妊娠期间血清学检查结果的是

A: HBeAg 为阳性

B: HBsAg, HBeAg 均为阳性

C: HBsAb, HBeAg 均为阳性

D: HBsAg 为阳性

答案：B

9. 提高药效、减少人体吸收的是

A: 阿苯达唑

B: 抗忧郁药

C: 利尿药

D: 氨基糖苷类

答案：A

10. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

A: 支气管哮喘

B: 心绞痛

C: 胃溃疡

D: 胃食管反流病

答案: D

11. 下列症状不属于高血压临床表现的是

A: 头晕

B: 口干

C: 头痛

D: 心悸

答案: B

12. (2018 年真题) 患儿, 14 岁, 体重 50kg, 体温 38.7℃, 使用布洛芬退热。单次给药剂量是 ()

A: 200~400mg

B: 10~15mg

C: 300~600mg

D: 500~1000mg

答案: A

13. 缺铁性贫血患者常表现为 ()

A: 红细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案: D

14. 下列药品宜冷处贮藏但不应冷冻的是:

- A: 双歧三联活菌制剂
- B: 卡前列甲酯栓剂
- C: 氯化钠注射液
- D: 甘露醇注射剂

答案：A

15. 以下属于急性肾盂肾炎表现的是（）

- A: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难
- B: 尿液常浑浊、有异味
- C: 约 30%可出现血尿
- D: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

答案：D

16. 用于口服后吸收迅速而完全，解热镇痛作用明显的非处方药是

- A: 谷维素
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

17. 《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

- A: 4℃
- B: 20℃
- C: 15℃
- D: 10℃

答案：B

18. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 临床治疗方案
- B: 涂片、培养鉴定
- C: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）
- D: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

答案：A

19. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 氯吡格雷
- D: 氨氯地平

答案：C

20. 不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

- A: 两餐间
- B: 睡前
- C: 餐前
- D: 餐后

答案：D

21. 曲唑酮的作用机制为

- A: 抑制 NE 再摄取
- B: 抑制单胺氧化酶
- C: 抑制 5-HT 再摄取
- D: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取

答案：C

22. 以下所列项目中，不属于评价二级文献的标准的是

- A: 索引的完备程度
- B: 出版或更新的频率
- C: 提供的信息内容是否有参考文献的支持
- D: 检索路径多少及费用

答案：C

23. 处方按性质可分为

- A: 法定处方、普通处方
- B: 法定处方、医师处方
- C: 法定处方、麻醉药品处方
- D: 普通处方、协定处方

答案：B

24. 属于公众用药咨询的是

- A: 减肥、补钙、补充营养素
- B: 注射剂溶媒的正确选择
- C: 抗菌药物的合理应用
- D: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

答案：A

25. 不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

- A: 氨茶碱
- B: 地高辛
- C: 氯苯那敏
- D: 可待因

答案：C

26. 老年高血压高血压患者的降压目标

- A: <120 / 80mmHg
- B: <150 / 90mmHg
- C: <140 / 90mmHg
- D: <130 / 80mmHg

答案：B

27. 已知 1%(g/ml) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185℃，计算其等渗溶液的浓度是

- A: 2.4(%g/ml)
- B: 3.0(%g/ml)
- C: 2.6(%g/ml)
- D: 2.8(%g/ml)

答案：D

28. 阿司匹林可导致药源性肾病的机制是

- A: 结晶沉积
- B: 不可逆性肾小管坏死
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 肾小球滤过率下降

答案：C

29. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务的重要人群是

- A: 社区患者
- B: 门诊患者
- C: 过敏体质者
- D: 住院患者

答案：C

30. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 溶血性贫血
- B: 巨幼细胞性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 白血病

答案：C

31. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的是()

- A: 奥美拉唑
- B: 苯丝肼
- C: 克拉维酸钾
- D: 叶酸

答案：A

32. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是()

- A: 纳洛酮
- B: 青霉胺
- C: 氟马西尼
- D: 乙氟胺

答案：B

33. 重组人促红素需要的特殊贮存条件是

- A: 遮光
- B: 低温

C: 不宜振摇

D: 密闭

答案: C

34. 给失眠患者开具地西泮，医师应采用的处方纸是

A: 白色、右上角无标识处方纸

B: 淡绿色处方纸

C: 淡黄色处方纸

D: 白色、右上角有标识处方纸

答案: D

35. 处方外文缩写 OU 代表()

A: 右耳

B: 左眼

C: 左耳

D: 双眼

答案: D

36. 关于药物作用相加或增加疗效的举例，磺胺甲噁唑(SMZ)抑制二氢叶酸合成酶，甲氧苄啶(TMP)抑制二氢叶酸还原酶，二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，抗菌作用增强，是属于

A: 作用于不同的靶位

B: 保护药品免受破坏

C: 延缓或降低抗药性

D: 促进机体的吸收利用

答案: A

37. 下列药物中，适用于压力性尿失禁的药物为

- A: 非那雄胺
- B: 哌唑嗪
- C: 索利那新
- D: 米多君

答案：D

38. 中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

- A: 地高辛
- B: 复方利血平
- C: 甲氧氯普胺
- D: 氯苯那敏

答案：C

39. 患者，男，33 岁。中度哮喘急性发作，宜选用的药物是

- A: 短效 β_2 受体激动剂
- B: β_2 受体阻断剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 糖皮质激素

答案：A

40. 可致急性肾衰竭、肾功能异常及肾小管损害的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿洛司琼
- D: 利巴韦林

答案：B

41. 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是 ()

- A: 阿莫西林
- B: 头孢克洛
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 诺氟沙星

答案：C

42. 患者，女，33 岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

- A: 输卵管炎
- B: 细菌性阴道病
- C: 急性尿道炎
- D: 外阴阴道假丝酵母菌病

答案：B

43. 用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是 ()

- A: 头孢哌酮
- B: 美罗培南
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：A

44. (2018 年真题) 患者，男 58 岁，高血压病史 5 年，吸烟史 40 年，日均 40 支，6 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立，家属发现其说话迟钝含混，右侧嘴唇变浅，意识清楚，到某院急诊 BP190/120mmHg，血常规基本正常，行头部 MRI 检查后，诊断为急性脑梗死。

- A: 氯吡格雷片 75mgqdp0
- B: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0

C: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0

D: 华法林片 3mgqdp0

答案: B

45. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A: 过敏反应

B: 血糖不降

C: 低血糖症状

D: 血压升高

答案: C

46. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 1 次

B: 2 次

C: 3 次

D: 4 次

答案: D

47. 正常人的体温在 37°C 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: $37.4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$

B: 41°C 以上

C: $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$

D: 37°C 以上

答案：C

48. 婴儿治疗佝偻病时，维生素 D 的初始口服剂量一般为

A: $2000 \sim 4000\text{IU}$ ($50 \sim 100 \mu\text{g}$) / d

B: 400IU ($10 \mu\text{g}$) / d

C: 600IU ($15 \mu\text{g}$) / d

D: $800 \sim 1200\text{IU}$ ($20 \sim 30 \mu\text{g}$) / d

答案：A

49. 三叉神经痛，应选的药物是

A: 芬太尼透皮贴剂

B: 卡马西平片

C: 对乙酰氨基酚片

D: 羟考酮缓释片

答案：B

50. 正常人对铁剂的吸收率为

A: $10\% \sim 20\%$

B: $10\% \sim 30\%$

C: 0.4

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 0.3

答案：A

51. 拉米夫定的适应证是

- A: 足癣
- B: 带状疱疹
- C: 乙型病毒性肝炎
- D: 流感

答案：C

52. pH 碱性的感染尿液常见

- A: 磷酸盐结晶
- B: 尿酸盐结晶
- C: 草酸盐结晶
- D: 酪氨酸和亮氨酸结晶

答案：A

53. 静脉滴注红霉素的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：B

54. 老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 双嘧达莫
- C: 哌替啶
- D: 苯二氮䓬类药

答案：A

55. 患者，女，57 岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足 5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20 / 5mgqd

- A: 无适应证用药
- B: 门诊处方所开剂量不能超过 7 日用量
- C: 超适应证用药
- D: 处方应写商品名

答案：B

56. 属于 M 受体阻断剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 乙酰胆碱
- C: 福莫特罗
- D: 美托洛尔

答案：A

57. 沙眼的病原体为

- A: 支原体
- B: 病毒
- C: 细菌
- D: 衣原体

答案：D

58. 真性红细胞增多症

- A: 白细胞减少

- B: 淋巴细胞增多
- C: 红细胞沉降率减慢
- D: 白细胞增多

答案：C

59. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对严重呕吐，可给予

- A: 昂丹司琼
- B: 阿瑞吡坦
- C: 苯海拉明
- D: 羧甲司坦

答案：A

60. (2015 年真题) 易经乳汁分泌的药物的特征是 ()。

- A: 弱酸性
- B: 蛋白结合率高
- C: 分子量大
- D: 脂溶性大

答案：D

61. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

- A: 成本-效果分析
- B: 最小成本法
- C: 成本-效益分析
- D: 最大成本法

答案：A

62. 妊娠期妇女不宜选用药物是

- A: 青霉素
- B: 维生素 A
- C: 氯化钾
- D: 华法林

答案：D

63. 下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

- A: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$
- B: 成人 $3.0 \times 10^9 / L$
- C: 成人 $8.0 \times 10^9 / L$
- D: 新生儿 $16.0 \times 10^9 / L$

答案：B

64. 患者，女，72 岁，主诉“眼干、眼红、刺激感、砂砾感”，医师初步诊断为干眼症，建议患者选用

- A: 聚乙烯醇滴眼液
- B: 左氧氟沙星滴眼液
- C: 山莨菪碱滴眼液
- D: 吡诺克辛滴眼液

答案：A

65. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

- A: 卡托普利
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

66. 融合抑制剂

- A: 齐多夫定
- B: 利巴韦林
- C: 依非韦伦
- D: 利托那韦

答案：B

67. (2019 年真题) 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U/支的青霉素钠产品，每支所需的装量是

- A: 0.48g
- B: 1.33g
- C: 2.088mg
- D: 1.33mg

答案：A

68. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史患者近日因工作应酬较多，未能控制饮食，昨夜造成痛风急性发作，右足第一跖趾关节出现红、肿、热、痛，疼痛剧烈。因无法忍受，今日起后速来药店购药，药师应推荐的药物是

- A: 别嘌醇
- B: 丙磺舒
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 碳酸氢钠

答案：C

69. (2016 年真题) 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案：B

70. 静脉滴注给药前不宜选用氯化钠注射液溶解或稀释，以免出现浑浊的药品是

A: 瑞替普酶

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 依托泊苷

D: 阿昔洛韦

答案：B

71. 关于奥利司他说法错误的是

A: 可干扰维生素的吸收

B: 进餐时服用

C: 应在服药前 2h 补充维生素

D: 对肝脏无影响

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

72. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 赖脯胰岛素
- C: 门冬胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：C

73. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 脓状便
- C: 黏液便
- D: 米泔水样便

答案：B

74. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

- A: 0.2gqd
- B: 0.1gtid
- C: 0.5gtid
- D: 0.5gqd

答案：A

75. 依据权威的专科诊疗指南是

- A: 药物治疗的安全性
- B: 药物治疗的规范性
- C: 药物治疗的方便性
- D: 药物治疗的有效性

答案：B

76. 解救蛇咬伤中毒的是

- A: 盐酸戊乙奎醚
- B: 单价抗毒血清
- C: 依地酸钙钠
- D: 二巯丙醇

答案：B

77. 医师开具处方应当使用

- A: 通用名、商标名、新活性化合物的专利药品名称
- B: 通用名、新活性化合物的专利药品名称、卫计委公布的药品习惯名称
- C: 通用名、商标名、商品名
- D: 通用名、商品名、卫计委公布的药品习惯名称

答案：B

78. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 阿奇霉素
- B: 氧氟沙星
- C: 克林霉素
- D: 多西环素

答案：C

79. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 多潘立酮片
- B: 布地奈德吸入剂
- C: 奥美拉唑肠溶胶囊
- D: 单硝酸异山梨酯缓释片

答案：C

80. (2016 年真题) 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 氧氟沙星滴眼液

答案：A

81. 患者，女，28 岁，近一个月出现阴道分泌物增多，阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是 ()

- A: 青霉素钠
- B: 甲硝唑
- C: 咪康唑
- D: 头孢曲松钠

答案：B

82. 对预防用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 人员短缺
- B: 工作流程不规范
- C: 环境缺陷
- D: 人的行为失常

答案：D

83. 放射性静脉造影剂属于

- A: C 级高危药品
- B: D 级高危药品
- C: E 级高危药品
- D: B 级高危药品

答案：D

84. 单个样品量足够的随机对照试验结果属于

- A: 三级证据
- B: 四级证据
- C: 一级证据
- D: 二级证据

答案：D

85. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

- A: 超适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 无适应证用药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 有禁忌证用药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/235243321122012033>