

## 眼科专科知识考试试题含答案

1、关于泪小管炎的临床表现，下列哪项不正确( )

- A、眼红
- B、结膜充血
- C、摘除泪囊后，从泪小点挤压无黏性分泌物
- D、常由沙眼衣原体

答案：C

2、下列哪种情况不会引起代谢性白内障( )

- A、糖尿病
- B、低血钙
- C、长期运用类固醇药物
- D、半乳糖血症
- E、低血糖

答案：C

3、由于角膜内皮损伤和炎症细胞或色素的同时存在而形成的产物( )

- A、房水闪辉
- B、瞳孔区晶体表面见环形色素
- C、KP
- D、瞳孔膜闭
- E、房水中大量炎症细胞

答案：C

4、闭角型青光眼急性期的表现不正确的是( )

- A、前房消失
- B、视力下降
- C、角膜上皮水肿，角膜后色素沉着
- D、瞳孔散大

答案：B

5、站在 1M 处仍看不见视力表第一行，应测( )

- A、手动
- B、指数
- C、光感
- D、无光感

答案：B

6、白内障的主要症状是( )

- A、视力障碍

- B、眼痛
- C、眼充血
- D、压痛
- E、眼分泌物

答案：A

7、Vogt-小柳原田综合征是指( )

- A、葡萄膜炎
- B、脑膜刺激征
- C、一眼穿通伤或内眼手术后双眼发生内芽肿性葡萄膜炎
- D、疱疹脱色素为主要特征
- E、虹膜脱色素为主要特征

答案：B

8、视功能检查有( )

- A、视力
- B、视野
- C、色觉
- D、以上都包括

答案：D

9、我科白内障患者术后出院一般多久复查( )

- A、1-3天
- B、2-5天
- C、3-7天
- D、5-9天
- E、7-10天

答案：E

10、预防虹睫炎引起的继发性青光眼，局部应点( )

- A、1%匹罗卡品
- B、0.5%噻吗心安
- C、0.25%依色林
- D、0.5%可的松
- E、1%阿托品

答案：E

11、玻璃体积血的自发吸收时间是( )

- A、4-6个月
- B、3-4个月

- C、1-2 个月
- D、2-4 个月
- E、以上均不是

答案：A

12、3%的左氧氟沙星滴眼液的作用是( )

- A、缩瞳
- B、扩瞳
- C、降眼压
- D、升眼压
- E、消炎

答案：E

13、指测眼压 TN 是指( )

- A、眼压高
- B、眼压低
- C、眼压正常
- D、测不出
- E、以上都不是

答案：C

14、青光眼斑是指位于( )

- A、晶状体前囊下的片状白色混浊
- B、晶状体后囊下的片状白色混浊
- C、晶状体皮质的白色混浊
- D、晶状体核的白色混浊
- E、晶状体前极的白色混浊

答案：A

15、我科沙眼的主要治疗方法( )

- A、局部滴眼药水
- B、口服药物
- C、手术治疗
- D、烧灼治疗
- E、理疗

答案：A

16、什么情况下医生可以下达口头医嘱( )

- A、新病人入院
- B、手术前

- C、手术中
- D、产妇分娩时
- E、抢救病人时

答案：E

17、测视力前应评估患者哪项内容( )

- A、有无佩戴角膜接触镜
- B、是否会使用视力表
- C、是否佩戴框架眼镜
- D、以上都是

答案：D

18、治疗性泪道探通主要用于( )

- A、泪小管阻塞
- B、泪小点阻塞
- C、泪总管阻塞
- D、成人鼻泪管阻塞
- E、婴幼儿泪道阻塞

答案：E

19、下列哪项药物青光眼患者慎用( )

- A、典必殊
- B、普南扑灵
- C、派立明
- D、阿托品
- E、氟美瞳

答案：D

20、原发性开角型青光眼治疗原则不正确的是( )

- A、一旦确诊立即手术
- B、可用1%匹罗卡品
- C、可行氩激光小梁成型术
- D、当视野

答案：A

21、A超主要用于生物测量( )

- A、主要为白内障患者
- B、近视眼患者，尤其是病理性近视
- C、其他与眼轴变化相关的疾病
- D、屈光手术前的检查

E、以上都是

答案：E

22、我国首位致盲的眼病是( )

A、青光眼

B、视网膜脱离

C、老年性白内障

D、糖尿病性视网膜病变

答案：C

23、患者既往有高血压病史，术后下列哪项药物不建议应用( )

A、复达欣

B、明可欣

C、卡络磺钠

D、地塞米松

答案：D

24、下列哪项是眼内进入不明液体的现场急救应( )

A、包扎右眼，转送医院

B、硼酸液点眼

C、消炎药点眼

D、涂红霉素眼膏

E、大量清水反复冲洗

答案：E

25、我国人群目前视力损伤的首位原因是( )

A、白内障

B、屈光不正

C、视网膜疾病

D、青光眼

E、角膜混浊

答案：B

26、视力丧失最快的眼底病变是( )

A、视网膜中央动脉阻塞

B、视网膜中央静脉阻塞

C、球后视神经炎

D、视乳头炎

E、视网膜脱离

答案：A

27、急性闭角型青光眼最典型的症状是( )

- A、眼部及头部胀痛
- B、昏迷
- C、躁动
- D、樱桃红斑
- E、水肿

答案：A

28、下列哪种疾病需半卧位( )

- A、视网膜脱离
- B、白内障
- C、青光眼
- D、玻璃体积血
- E、以上都是

答案：D

29、我科对于春季角结膜炎治疗，不正确的是( )

- A、长期应用类固醇，以减轻症状及发作
- B、可用抗组胺类药
- C、应用非甾体消炎药
- D、必要时可用 2%环胞霉素 A
- E、冷敷

答案：A

30、下列哪项眼药水需冷藏保存( )

- A、小牛血清去蛋白提取物
- B、安达芬
- C、贝复舒
- D、爱尔卡因
- E、以上都是

答案：E

31、DR 的患者最容易发生下列哪种类型的视网膜脱离( )

- A、孔源性视网膜脱离
- B、渗出性视网膜脱离
- C、牵拉性视网膜脱离
- D、以上均不是

答案：C

32、视网膜脱离的诊断依据有( )

- A、患者主诉有飞蚊症
- B、眼底检查：视网膜隆起
- C、眼底检查：视网膜有裂孔
- D、以上都是

答案：D

33、指测眼压时，下列记录哪个表示眼压最低( )

- A、T-1
- B、T-2
- C、T-3
- D、Tn
- E、T+1

答案：C

34、矫正近视眼应用哪种透镜( )

- A、凹透镜
- B、凸透镜
- C、平光镜
- D、以上都是

答案：A

35、泪道冲洗时，清水完全沿原路返回，则表明阻塞部位是( )

- A、泪小管阻塞
- B、泪小点阻塞
- C、泪总管阻塞
- D、鼻泪管阻塞
- E、鼻泪管阻塞合并慢性泪囊炎

答案：A

36、患者突发头痛 眼部胀痛，呕吐，该病例可能的诊断是( )

- A、原发性开角型青光眼
- B、原发性闭角型青光眼
- C、角膜炎
- D、急性闭角型青光眼
- E、Fuchs 综合征

答案：D

37、下列检查中，最适宜眼眶骨折的检查是( )

- A、X线摄片
- B、超声波

- C、CT
- D、MRI
- E、以上都不是

答案：C

38、治疗虹膜状体炎的重要原则和关键措施是( )

- A、缩瞳
- B、应用激素
- C、抗生素
- D、散瞳
- E、中药

答案：D

39、哮喘患者禁用下列哪项眼药水( )

- A、托百士
- B、苏为坦
- C、可乐必妥
- D、典必殊
- E、美开朗

答案：E

40、眼球钝挫伤所致的前房积血最常见的并发症是( )

- A、并发性白内障
- B、玻璃体积血
- C、黄斑囊样水肿
- D、视神经萎缩
- E、继发性青光眼

答案：E

41、不属于眼压高低的决定因素有( )

- A、身高，体重
- B、上巩膜静脉压
- C、房水生成速率
- D、房水通过小梁网流出的阻力

答案：A

42、远视力检查时，患者在5m仍看不清第一行视标，应让患者( )

- A、眯眼
- B、往前走直至看清第一行视标
- C、坐下



- D、歪头
- E、两眼同时看

答案：B

43、下列属于高渗脱水剂，能够降眼压的是( )

- A、贝他根
- B、甘露醇
- C、乙酰唑胺
- D、适利达
- E、匹罗卡品

答案：B

44、青光眼的最主要特征为( )

- A、视力下降
- B、眼痛
- C、眼球充血
- D、眼压升高
- E、虹视

答案：D

45、眼压正常值为( )

- A、10-20mmhg
- B、20-30mmhg
- C、30-40mmhg
- D、50-60mmhg
- E、10-21mmhg

答案：E

46、飞蚊症的患者玻璃体的变化为( )

- A、多数有玻璃体混浊
- B、70%有威胁视力的病变
- C、多数需要手术治疗
- D、可能伴有闪光感
- E、注视暗色背景明显

答案：D

47、我科目前哪项手术常规下需要全麻下进行( )

- A、巩膜扣带术
- B、小梁切除术
- C、冷冻术

- D、DCR
- E、Phaco

答案：D

48、不属于葡萄膜炎解剖部位分类的是( )

- A、前葡萄膜炎
- B、中间葡萄膜炎
- C、视网膜脉络膜炎
- D、后葡萄膜炎
- E、全葡萄膜炎

答案：C

49、近视患者的眼轴通常比正常人( )

- A、过宽
- B、过窄
- C、过短
- D、过长
- E、不一定

答案：D

50、视网膜脱离最明显的症状( )

- A、眼前有漂浮物
- B、视力明显下降
- C、眼痛
- D、眼部充血
- E、散光

答案：B

51、取深层角膜异物时应注意( )

- A、异物取出后点抗生素眼液
- B、务必一次取净
- C、严格执行无菌操作
- D、包扎
- E、缝合伤口

答案：C

52、老年性白内障分为( )

- A、皮质性
- B、核性
- C、囊下性

D、以上均是

答案：D

53、视网膜脱离患者行 VR 术，玻璃体腔注入惰性气体，该气体是( )

A、C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>

B、C<sub>1</sub>F<sub>4</sub>

C、C<sub>6</sub>F<sub>2</sub>

D、C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>

答案：D

54、下列不属于 ICGA 强荧光的表现是( )

A、自发荧光

B、异常血管

C、组织渗漏

D、荧光染色

E、荧光遮蔽

答案：E

55、下列哪项眼药水是麻药( )

A、典必殊

B、普南扑灵

C、派立明

D、阿托品

E、爱尔卡因

答案：E

56、下列哪项是正视眼随年龄的增高逐渐失去调节能力的原因( )

A、晶状体混浊

B、睫状肌功能减弱

C、瞳孔变小

D、视网膜变性

E、晶状体纤维硬化

答案：E

57、眼科 OCT 的临床应用有( )

A、发现眼底疾病的微小病变，协助诊断

B、确定眼科疾病的病变位置

C、测量眼部局部病变厚度、面积、容积等，用于眼科疾病的随诊、疗效判断

D、以上都是

答案：D

58、我科黄斑变性患者一般注射下列哪些药物( )

- A、可乐必妥
- B、康柏西普
- C、典必殊
- D、苏为坦
- E、以上都不是

答案：B

59、沙眼病原体的首次分离者是( )

- A、Halbestaedter
- B、Prowazek
- C、汤飞凡
- D、郭秉宽
- E、陈耀真

答案：C

60、霰粒肿是指( )

- A、急性化脓性炎症
- B、慢性化脓性炎症
- C、慢性炎性肉芽肿
- D、渗出性炎症

答案：C

61、前房积血可分为几级( )

- A、2级
- B、3级
- C、4级
- D、5级
- E、6级

答案：B

62、我科下列哪项手术不需要剪眼毛( )

- A、视网膜脱离
- B、青光眼
- C、玻璃体腔内注药术
- D、白内障
- E、以上都不是

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236051114102010051>