

四川省遂宁中学校高新校区 2023-2024 学年高一下学期 5 月


月考数学试卷

学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____

一、单选题

1. 已知复数 $z = \frac{5i}{1+2i}$, 则在复平面内表示复数 z 的点位于 ()
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
2. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 则异面直线 AC 与 BC_1 的所成角为 ()
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$
3. 已知等腰 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{2}{3}\pi$, 则 $\overrightarrow{BC}$ 在 $\overrightarrow{BA}$ 上的投影向量为 ()
A. $\frac{3}{2}\overrightarrow{BA}$ B. $-\frac{3}{2}\overrightarrow{BA}$ C. $3\overrightarrow{BA}$ D. $-3\overrightarrow{BA}$
4. 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} = (2, k), \vec{a} - \vec{b} = (1, 1)$. 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $k =$ ()
A. -2 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 2
5. 设 α 是给定的平面, A, B 是不在 α 内的任意两点, 则 ()
A. 在 α 内存在直线与直线 AB 平行 B. 存在过直线 AB 的平面与 α 垂直
C. 在 α 内不存在直线与直线 AB 异面 D. 在 α 内不存在直线与直线 AB 垂直
6. 已知梯形 $ABCO$ 按斜二测画法得到的直观图为如图所示的梯形 $A'B'C'O'$, 且 $A'B' = 1$, $O'A' = 2$, $O'C' = 4$, 现将梯形 $ABCO$ 绕 OA 旋转一周得到一个几何体, 则该几何体的侧面

积为 ()



- A. 15π B. 18π C. 25π D. 28π

7. 已知非零向量 $\vec{a}$ 和单位向量 $\vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 30° , 则 $|\vec{a}| =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. 3

8. 已知正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 $\sqrt{6}$, 其所有顶点均在同一个表面积为 32π 的球面

上, 且该球的球心在底面 $ABCD$ 上, 则棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 ()

- A. $\frac{14}{3}\sqrt{6}$ B. $14\sqrt{6}$ C. $\frac{28}{3}\sqrt{6}$ D. $28\sqrt{6}$

二、多选题

9. 下列各组向量中, 可以用来表示向量 $\vec{a} = (-1, 2)$ 的是 ()

- A. $\vec{e}_1 = (1, 1), \vec{e}_2 = (1, 2)$ B. $\vec{e}_1 = (-1, 1), \vec{e}_2 = (-2, 2)$
C. $\vec{e}_1 = (-1, 2), \vec{e}_2 = (3, -6)$ D. $\vec{e}_1 = (1, 2), \vec{e}_2 = (-3, -4)$

10. 已知复数 $z_1, z_2 (z_2 \neq 0)$, 下列命题中正确的是 ()

- A. 若 $z_1^2 \in \mathbf{R}$, 则 $z_1 \in \mathbf{R}$ B. 若 $\frac{z_1}{z_2} \in \mathbf{R}$, 则 $\overline{z_1 z_2} \in \mathbf{R}$

C. 若 $|z_1 z_2| = 2z_2$, 则 $z_1 \overline{z_1} = 4$

D. 若 $z_1 z_2 = |z_1|^2$, 则 $z_1 = z_2$

11. 已知函数 $f(x) = 2\sin x \cos x - 2\sqrt{3}\cos^2 x$, 则下列结论中正确的有 ()

A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π

B. $f(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{\pi\pi}{3} + \frac{k}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$

C. $f(x)$ 的对称中心为 $(\frac{\pi\pi}{3} + \frac{k}{2}, 0)$, $k \in \mathbf{Z}$

D. $f(x)$ 的单调递增区间为 $[\frac{\pi\pi}{12} + k, \frac{5\pi}{12} + k]$, $k \in \mathbf{Z}$

三、填空题

12. 一个母线长为 2 的圆锥的侧面积是底面积的 2 倍, 则该圆锥的侧面积为_____.


13. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 所有棱长均相等, 则二面角 $C_1 - AB - C$ 的正切值为_____.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别为 a, b, c , 已知 $c = 1, b > c, \sin B \sin C = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 且

$a \sin A - b \sin B = \sqrt{2} c \sin B + c \sin C$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

四、解答题

15. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是菱形, $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 点 E 是 DD_1 的中点.



(1) 求证: $BD_1 \parallel$ 平面 AEC ;

(2) 求证: 平面 $AEC \perp$ 平面 BDD_1 .


16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\triangle ABC$ 的面积为 S , 已知 $c = 2$, 且

$$a^2 + b^2 = 4\sqrt{3}S + 4.$$

(1) 求 C ;

(2) 求 $\sqrt{3}b - a$ 的取值范围.

17. 如图, 在三棱锥 $V-ABC$ 中, $\triangle VAB$ 和 $\triangle VBC$ 均是边长为 4 的等边三角形, $VC = 2\sqrt{5}$.



(1) 证明: $AB \perp VC$;

(2) 已知平面 α 满足 $VA \parallel \alpha, AC \parallel \alpha$, 且平面 $\alpha \cap$ 平面 $VBC = l$, 求直线 l 与平面 ABC 所成角的正弦值.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 3, AB - AC = 1$. M 为边 BC 上一点, $BM = 1, D$ 为边 AB 上一点,

AM 交 CD 于 P .

(1) 若 $AC=3, AD=2$, 求 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD}$.

(2) 若 $BD=\frac{3}{2}, CD=\frac{5}{2}$,

(i) 求 AC ;

(ii) 求 $\triangle APD$ 和 $\triangle MPC$ 的面积之差.

19. 已知 O 为坐标原点, 对于函数 $f(x)=a\sin x+b\cos x$, 称向量 $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ 为函数 $f(x)$ 的

伴随向量, 同时称函数 $f(x)$ 为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的伴随函数.

(1) 设函数 $k(x)=\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+\sin x$, 试求 $k(x)$ 的伴随向量 $\overrightarrow{OM}$,

(2) 记向量 $\overrightarrow{OP}=(\sqrt{3},1)$ 的伴随函数为 $f(x)$, 函数 $h(x)=f(2x)$,

① 函数 $h(x)$ 在区间 $\left[t, t+\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 M_t , 最小值为 m_t , 设函数 $H(t)=M_t-m_t$, 若

$t \in \left[\frac{\pi\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right)$, 求函数 $H(t)$ 的值域.

② 把函数 $h(-x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 得到函数 $g(x)$ 的图象, 对于 $\forall x_1 \in \left[-\frac{\pi\pi}{12}, \frac{\pi}{3}\right]$, 是

否总存在唯一的实数 $x_2 \in \left[\frac{\pi 3}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$, 使得 $h(x_1)+g(x_2)=m$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

参考答案:

1. A

【分析】首先化简复数，再根据复数的几何意义，即可判断选项.

【详解】 $z = \frac{5i}{1+2i} = i(1-2i) = 2+i$ ，对应的点在第一象限.


故选：A

2. C

【分析】利用正方体的特点，将异面直线的夹角转化为共面直线的夹角，角形 A_1BC_1 为等

边三角形，故 A_1C_1 与 BC_1 的夹角为 60° ，从而得出异面直线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

【详解】



正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AC \parallel A_1C_1$ ，异面直线 AC 与 BC_1 的所成角即为 A_1C_1 与 BC_1 所

成的角，而三角形 A_1BC_1 为等边三角形，故 A_1C_1 与 BC_1 的夹角为 60° ，所以异面直线 AC

与 BC_1 的所成角为 $\frac{\pi}{3}$.


故选：C

【点睛】熟悉正方体的特点，以及求异面直线夹角通常转化为共面直线夹角来解决,注意几何图形的特点.

3. A

【分析】由投影向量的概况结合正弦定理可求.

【详解】



由题意可得 $B = C = \frac{1}{2}(\pi - A) = \frac{\pi}{6}$,

由正弦定理可得 $\frac{BC}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{AB}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{AC}{\sin \frac{\pi}{6}}$, 可得 $AB = AC = \frac{\sqrt{3}}{3} BC$,

$\overrightarrow{BC}$ 在 $\overrightarrow{BA}$ 上的投影为 $|\overrightarrow{BC}| \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} |\overrightarrow{BC}|$,

所以 $\overrightarrow{BC}$ 在 $\overrightarrow{BA}$ 上的投影向量为 $\frac{\sqrt{3}}{2} |\overrightarrow{BC}| \cdot \frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} |\overrightarrow{BC}| \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3} \times |\overrightarrow{BC}|} \cdot \overrightarrow{BA} = \frac{3}{2} \overrightarrow{BA}$,

即 $\overrightarrow{BC}$ 在 $\overrightarrow{BA}$ 上的投影向量为 $\frac{3}{2} \overrightarrow{BA}$.

故选: A.

4. D

【分析】根据向量的运算性质, 判断 $(\vec{a} + \vec{b}) // (\vec{a} - \vec{b})$, 即可求解.

【详解】由 $\vec{a} // \vec{b}$ 知, $(\vec{a} + \vec{b}) // (\vec{a} - \vec{b})$, 则 $k = 2$.

故选: D

5. B

【分析】考虑直线 AB 与 α 相交时, 可判断 A; 过点 A 作 α 的垂线即可判断 B; 考虑

$AB \perp \alpha$ 时, 可判断 CD.

【详解】对于 A，当直线 AB 与 α 相交时，在 α 内不存在直线与直线 AB 平行，A 错误；

对于 B，当 $AB \perp \alpha$ 时，显然存在；

当 AB 与 α 不垂直时，过点 A 作直线 $l \perp \alpha$ ，则直线 l 与 AB 确定的平面与 α 垂直，B 正确；

对于 CD，当 $AB \perp \alpha$ 时，记垂足为 C ，则在 α 不过点 C 的直线都与 AB 异面且垂直，CD 错误.


故选：B.

6. C

【分析】将梯形 $A'B'C'O'$ 复原为原图即直角梯形 $ABCO$ ，确定相关的边长，结合题意以及圆台的侧面积公式，即可求得答案.

【详解】由题意将梯形 $A'B'C'O'$ 复原为原图，即直角梯形 $ABCO$ ，

其中 $AB=1, OA=4, OC=4$ ，则 $BC = \sqrt{(4-1)^2 + 4^2} = 5$ ，



故将梯形 $ABCO$ 绕 OA 旋转一周得到一个几何体为圆台，

圆台上底面半径为 1，下底面半径为 4，高为 4，母线长为 5，


故该几何体的侧面积为 $\pi(1+4) \times 5 = 25\pi$ ，

故选：C

7. C

【分析】根据向量加法的平行四边形法则求解即可.

【详解】因为 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，所以根据向量加法的平行四边形法则可得向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 如图所示，




又因为向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 30° ，所以 $|\vec{a}| = \sqrt{3}|\vec{b}| = \sqrt{3}$ ，

故选：C

8. C

【分析】利用棱台及其外接球的特征结合台体体积公式计算即可.

【详解】设球心为 O ，球 O 的半径为 R ，棱台高为 h ，



则 $4\pi R^2\pi =$ ，所以 $R = 2\sqrt{2}$ ，

由于 O 在底面 $ABCD$ 上，底面 $ABCD$ 为正方形，

易得正方形 $ABCD$ 的边长为 $\sqrt{2}R = 4$ ，面积为 16；

设底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的外接圆半径为 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{2}$ ，

易得正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 $\sqrt{2}r = 2$ ，面积为 4；

所以正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $V = \frac{1}{3} \times (16 + 4 + \sqrt{16 \times 4}) \times \sqrt{6} = \frac{28\sqrt{6}}{3}$.

故选:C.

9. ACD

【分析】判断向量 $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ 是否共线，以及是否与向量 $\vec{a}$ 共线即可得答案.

【详解】对于A，因为 $1 \times 2 \neq 1 \times 1$ ，所以 $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ 不共线，可以表示向量 $\vec{a}$ ，A正确；

对于B，因为 $-1 \times 2 = 1 \times (-2)$ ，所以 $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ 共线，又向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{e_1}$ 不共线，B错误；

对于C，因为 $\vec{a} = \vec{e_1} + 0 \times \vec{e_2}$ ，可以表示向量 $\vec{a}$ ，C正确；

对于D，因为 $1 \times (-4) \neq 2 \times (-3)$ ，所以 $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ 不共线，可以表示向量 $\vec{a}$ ，D正确；

故选：ACD.

10. BC

【分析】举例说明判断AD；利用复数运算及共轭复数、复数模的意义计算判断BC.

【详解】对于A，取 $z_1 = i$ ， $z_1^2 = -1 \in \mathbf{R}$ ，而 $z_1 \notin \mathbf{R}$ ，A错误；

对于B，设 $z_1 = x_1 + y_1 i, z_2 = x_2 + y_2 i, x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbf{R}, x_2^2 + y_2^2 \neq 0$ ，

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + y_1 i}{x_2 + y_2 i} = \frac{(x_1 + y_1 i)(x_2 - y_2 i)}{(x_2 + y_2 i)(x_2 - y_2 i)} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i, \text{ 由 } \frac{z_1}{z_2} \in \mathbf{R},$$

得 $x_2 y_1 - x_1 y_2 = 0$ ， $\overline{z_1 z_2} = (x_1 - y_1 i)(x_2 + y_2 i) = x_1 x_2 + y_1 y_2 - (x_2 y_1 - x_1 y_2) i = x_1 x_2 + y_1 y_2 \in \mathbf{R}$ ，B正确；

对于C，由 $|z_1 z_2| = 2z_2$ 及已知得 $z_2 = a > 0$ ，设 $z_1 = c + di, c, d \in \mathbf{R}$ ，

$$|z_1 z_2| = |a(c + di)| = a\sqrt{c^2 + d^2} = 2a, \text{ 解得 } c^2 + d^2 = 4,$$

则 $\overline{z_1 z_1} = (c + di)(c - di) = c^2 + d^2 = 4$ ，C正确；

对于D，取 $z_1 = i, z_2 = -i$ ， $z_1 z_2 = 1 = |z_1|^2$ ，而 $z_1 \neq z_2$ ，D错误.

故选：BC

11. AD

【分析】先利用三角恒等变换将函数解析式化简，再结合三角函数的图象和性质逐一判断选项即可.

【详解】 $f(x) = 2\sin x \cos x - 2\sqrt{3}\cos^2 x = \sin 2x - \sqrt{3}\cos 2x - \sqrt{3} = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$,

对于 A, 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 所以 A 正确;

对于 B, 令 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 则 $x = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 所以对称轴为 $x = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 故 B 错误;

对于 C, 令 $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 可得对称中心为 $\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, -\sqrt{3}\right), k \in \mathbb{Z}$, 故 C 错误;

对于 D, 令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 则 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

所以单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$, 故 D 正确.

故选: AD.

12. 2π

【分析】利用圆锥的侧面积与底面积公式计算即可.

【详解】设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l , 则 $l = 2$, 且 $\pi r l = 2\pi r^2$,

所以 $r = 1$, 侧面积为 2π .

故答案为: 2π

13. $\frac{2\sqrt{3}}{3} / \frac{2}{3}\sqrt{3}$

【分析】利用垂直关系, 构造二面角的平面角, 即可求解.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236124141225010213>