

2022年主管护师(外科护理)考试试卷(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号:_____ 姓名:_____

一、客观选择题 (共50题, 每题2分, 共计100分)

- () 1、某孕妇因为妊高征危及生命, 医生建议终止妊娠以挽救孕妇生命, 但是这样可能会造成胎儿早产而死亡, 这种终止妊娠行为所产生的效应被称为
- A、有利效应
B、不伤害效应
C、双重效应
D、患者第一效应
E、公正效应
- () 2、患者, 男性, 50岁, 外伤1周后发生破伤风入院, 目前该病人治疗的中心环节是
- A、扩容
B、抗炎
C、镇静解痉
D、中和血内游离毒素
E、处理伤口
- () 3、共用题干

李某, 女, 48岁, 糖尿病6年, 口服降糖药可以保持血糖平稳; 高血压病4年, 此次因冠心病入院, 入院检查后医生建议做搭桥手术, 患者当天即出现按平时降糖药物剂量血糖难以控制在正常范围, 且夜间难以入睡、食欲下降。护士通过与患者沟通, 了解到患者主要因为对手术的害怕而导致了焦虑、紧张的情绪, 护士即对患者进行了相应的健康教育, 使患者的情绪逐渐好转, 血糖也逐渐降到以前的水平, 睡眠和食欲改善。

在该案例中, 护士的健康教育主要对患者起到了什么作用

- A、提高依从性
B、密切了护患关系
C、心理治疗
D、加强信任
E、降低医疗成本
- () 4、关于高渗性脱水, 说法不正确的是
- A、以丢失水分为主

- B、细胞内脱水严重
 - C、Na从细胞外向细胞内流
 - D、抗利尿激素增加
 - E、尿比重增高
- () 5、肱骨髁上骨折最常引起
- A、肱动脉损伤
 - B、桡动脉损伤
 - C、尺神经损伤
 - D、股骨转子骨折
 - E、旋股内、外动脉损伤
- () 6、下列有关ICU病房设置的叙述不正确的是
- A、应靠近相关科室
 - B、有多种灯光的电灯
 - C、床头应有多项电源板
 - D、床间距宜超过1.5m
 - E、一间病房内不宜超过2张病床
- () 7、开放性腹部损伤有肠管脱出时，原则上应
- A、立即向腹腔还纳
 - B、及早行清创术
 - C、止痛处理
 - D、抗感染
 - E、暂不向腹腔回纳
- () 8、患者刘某，29岁，于今日5时分娩(顺产)，侧切伤口使用碘伏冲洗，应用碘伏的浓度为
- A、含有效碘250mg / L
 - B、含有效碘500mg / L
 - C、含有效碘1000mg / L
 - D、含有效碘2000mg / L
 - E、含有效碘2500mg / L
- () 9、被后人称为“管理过程之父”的是
- A、法约尔
 - B、泰勒
 - C、韦伯

- D、梅奥
- E、卢因
- () 10、关于慢性化脓性骨髓炎的叙述正确的是
- A、患肢肌肉萎缩变形
- B、纤维包壳形成
- C、术前患肢平放制动
- D、死腔内有坏死的肉芽组织
- E、以大剂量抗生素治疗为主
- () 11、脊髓外观似完整，但内部有不同程度改变的是
- A、脊髓震荡
- B、脊髓挫伤
- C、脊髓受压
- D、脊髓断裂
- E、马尾神经损伤
- () 12、作为一种规范伦理学，护理伦理学主要依据的3个基本理论是
- A、义务论、美德论、动机论
- B、规范论、美德论、动机论
- C、义务论、功利论、规范论
- D、义务论、美德论、功利论
- E、规范论、动机论、功利论
- () 13、桡骨远端伸直型骨折病人复位后行石膏固定时腕关节应处于
- A、背伸位
- B、尺侧偏斜位
- C、屈腕尺偏位
- D、桡侧偏斜位
- E、背伸桡偏位
- () 14、根据内容划分，冲突可以分为
- A、目标冲突、认知冲突、感情冲突、程序冲突
- B、建设性冲突、破坏性冲突
- C、个人冲突、人际冲突、群体冲突
- D、人际冲突、群体冲突、组织间冲突

E、积极性冲突、消极性冲突

() 15、共用题干

护士小张用紫外线灯为某病室进行空气消毒。

消毒前，小张发现紫外线灯管积聚大量灰尘，应用下列哪种棉球擦拭灯管

A、无水乙醇棉球

B、75%乙醇棉球

C、生理盐水棉球

D、次氯酸钠棉球

E、碘伏棉球

() 16、对健康教育计划中总体目标组成的描述，错误的是

A、Who:对象

B、What: 实现什么变化

C、When: 实现变化的期限

D、How: 如何实现变化

E、Howtomeasure: 测量的方法

() 17、某医院腹腔镜室，由于病人较多，腹腔镜反复使用，清洗匆忙，消毒时间为25min，经监测发现腹腔镜管道有致病菌，其导致直接原因是

A、清洗充分，刷洗到位

B、酶清洗液多次使用

C、腹腔镜部件复杂，不能拆卸

D、消毒液浓度不够

E、浸泡消毒时间不足，只达到高水平消毒，未达到灭菌效果

() 18、在车祸现场，应先抢救的伤员是

A、颈椎损伤

B、开放性气胸

C、股骨颈骨折

D、肠穿孔

E、肩关节脱位

() 19、护士对血栓闭塞性脉管炎病人进行健康教育，正确的内容是

A、室内温度宜保持在15℃以上

B、严格戒烟

C、可将热水袋直接放患肢处取暖

D、可用热水泡足

E、将热水袋直接放于足部取暖

() 20、护理道德评价的类型包括 ()

A、客观评价, 自我评价

B、社会舆论评价, 传统习俗评价

C、社会评价 (含同行评价)、自我评价

D、行业评价, 自我评价

E、官方评价和非官方评价

() 21、门静脉的正常压力是

A、8~10cmH₂O

B、13~24cmH₂O

C、25~30cmH₂O

D、33~44cmH₂O

E、43~54cmH₂O

() 22、冠状病毒是一种包膜病毒, 与噬菌体侵染细菌的机制有所不同, 病毒进入人体细胞的方式通常为 ()。

A、胞吞或膜融合

B、诱导宿主细胞膜裂解

C、经离子通道注入

D、被动扩散运输

E、直接传播

() 23、张某, 男, 20岁, 自己的父亲曾经吸过毒并且已经去世, 母亲怕子女吸毒而对子女管教很严。张某中学毕业后做生意时无意中染上毒瘾, 有一次, 张某私自购买了某成瘾药物, 由于服用剂量过大而导致昏迷。

张某的成瘾行为主要受到

A、遗传因素的影响

B、环境因素的影响

C、学习因素的影响

D、个性因素的影响

E、政治因素的影响

() 24、导致原发性血小板减少性紫癜患儿出血的主要原因是

血小板减少

- A、病毒感染
 - B、毛细血管脆性增加
 - C、毛细血管通透性增加
 - D、血小板数量减少
 - E、血小板功能异常
- () 25、膀胱内药物灌注，目前认为效果最好的是
- A、噻替哌
 - B、丝裂霉素
 - C、阿霉素
 - D、卡介苗
 - E、羟喜树碱
- () 26、全肺切除术后放置胸腔闭式引流管的目的是
- A、重建胸腔负压
 - B、排出积气
 - C、排出积液
 - D、调节两侧胸腔压力
 - E、便于观察病情
- () 27、不属于医院感染的情况是
- A、本次感染直接与上次住院有关
 - B、由于诊疗措施激活的潜在性感染
 - C、新生儿在分娩过程中和产后获得的感染
 - D、患者原有的慢性感染在院内急性发作
 - E、在原有感染基础上出现其他部位新的感染
- () 28、能预防局麻药中毒的术前用药是
- A、氯丙嗪
 - B、异丙嗪
 - C、阿托品
 - D、哌替啶
 - E、苯巴比妥钠
- () 29、患者，男性，40岁，发现右肾多发结石，左肾盂结石直径1.2cm，当发生肾绞痛时，护士可准备哪些药物
- A、哌替啶+山莨菪碱

- B、吗啡
- C、复方氨林巴比妥注射液
- D、巴比妥
- E、氯丙嗪

() 30、急性乳房炎脓肿形成后，正确的处理是

- A、立即切开引流
- B、乳晕下脓肿应做轮辐状切口
- C、多房脓肿应做多个切口
- D、乳房后脓肿应反复穿刺抽脓
- E、可在脓肿最低点做对口引流

() 31、女性，28岁，妊娠8个月，转移性右下腹痛10小时，伴恶心、呕吐。查体：体温37.5℃，右肋下处有压痛，无腹肌紧张和反跳痛。血常规：WBC $10.1 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞83%。

该病人诊断较为困难的原因不包括

- A、盲肠被子宫推压上移
- B、机体免疫功能下降
- C、腹肌被拉直
- D、腹膜炎不易局限
- E、大网膜不易包裹炎症部位

() 32、男，50岁，浙江渔民，近1年来慢性腹泻，每日2~3次，大便稀，带脓血，伴里急后重，粪便检出血吸虫虫卵。

血吸虫病的传播途径是

- A、粪-口传播
- B、血液传播
- C、飞沫传播
- D、直接接触传播
- E、间接接触传播

() 33、留置胸膜腔引流管的目的不包括

- A、排出积气
- B、排出积液、积血
- C、促进肺尽早复张
- D、平衡纵隔两侧的压力

- E、便于观察病情
- () 34、不属于接触隔离的疾病是
- A、破伤风
 - B、感染性腹泻
 - C、皮肤白喉
 - D、新生儿带状疱疹
 - E、多重耐药的金黄色葡萄球菌感染
- () 35、管理者工作千头万绪，为防止时间浪费，可用的时间管理方法是
- A、充分利用自己的最佳工作时间
 - B、保持时间利用的连续性方法
 - C、消耗时间的计划化，标准化方法
 - D、记录统计时间法
 - E、拟订时间进展表
- () 36、护理道德的原则是 ()
- A、不伤害原则、行善原则、公正原则、尊重原则
 - B、不伤害原则、互利原则、平等原则、遵从原则
 - C、平等原则、主动原则、行善原则、尊重原则
 - D、不伤害原则、行善原则、平等原则、互利原则
 - E、协调原则、公正原则、尊重原则、进取原则
- () 37、衣、食、住、用等人类繁衍最基本的物质需要属于
- A、生理需要
 - B、安全需要
 - C、爱与归属的需要
 - D、尊重的需要
 - E、自我实现的需要
- () 38、美国心理学家维纳将成功与失败归因为四种可能性，下列错误的是
- A、能力
 - B、态度
 - C、努力
 - D、任务的难度
 - E、机遇
- () 39、胃大部切除术的切除范围不包括

A、切除胃的远侧2/3~3/4

B、胃体的近侧部分

C、胃体的远侧部分

D、胃窦部、幽门

E、十二指肠球部近侧

() 40、格拉斯哥昏迷记分法，昏迷最深的是

A、2分

B、3分

C、8分

D、14分

E、15分

() 41、使用抗生素治疗败血症时，下列做法正确的是

A、体温正常后1~3天方可停药

B、体温正常后7天即可停药

C、体温正常后7~10天再停药

D、体温正常后4周停药

E、体温正常后8周方可停药

() 42、患者，女性，30岁，半年前扭伤左膝关节，后左膝关节内侧疼痛，肿胀逐渐加重，X线见左胫骨上段4cm×5cm大小的透光区，中央有肥皂泡阴影，骨端膨大。近1个月来肿胀明显，但夜间疼痛加剧，关节活动受限，再次拍X线片示胫骨上段病变扩大，肥皂泡沫阴影消失，呈云雾状阴影，肿瘤组织已侵入软组织。

最恰当的处理是

A、截肢

B、刮骨术+植骨

C、肿块切除

D、刮除+骨水泥填充

E、广泛切除+关节置换

() 43、高渗性脱水的患者，其脱水程度为中等，患者缺水量为体重的

A、2%~4%

B、3%~5%

C、4%~6%

D、5%~7%

E、6%~7%

() 44、共用题干

患儿，5岁，体重25kg，在家玩耍时不慎打翻开水瓶，双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱、皮薄，疼痛明显，水疱破裂后创面为红色。

该患儿的烧伤面积为

A、10%

B、39%

C、41%

D、46%

E、70%

() 45、防止急性胃穿孔内容物外漏的主要措施是

A、半卧位

B、用抗生素

C、输液

D、持续胃肠减压

E、以上都不是

() 46、“新型冠状病毒感染的肺炎”发病到入院的中位时间是()。

A、5天

B、7天

C、9天

D、11天

E、15天

() 47、为确保健康传播效果，传播者应注意的情况不包括

A、树立良好的形象

B、收集选择对受者有价值的信息

C、根据传播者的情况，选择正确的传播渠道

D、确保信息准确、鲜明、生动、易懂、适用

E、及时了解受者对信息的反应及传播效果，不断调整传播行为

() 48、用于新生儿脐带消毒的碘附，有效碘含量是

A、50mg/L

B、250mg/L

C、500mg/L

D、2500mg/L

E、5000mg/L

() 49、在人际传播中，以注视对方的眼神表示专心的倾听的传播技巧是

A、仪表语

B、动态体语

C、同类语言

D、时空语

E、形象语

() 50、小组讨论时，适宜的小组人数一般为

A、15~20人

B、6~10人

C、10~15人以上

D、3~6人

E、2~5人

参考答案

一、客观选择题

1、C

【解析】双重效应是指某一行为的有害效应并不是直接的、有意的效应，而是间接的、预见的效应。

2、C

【解析】控制和解除痉挛是破伤风治疗的中心环节。应让病人住隔离病房，避免声、光等刺激；根据病情交替使用镇静和解痉药物。

3、C

【解析】护士通过健康教育缓解了患者焦虑、紧张的情绪，属于心理治疗方面的作用。

4、C

【解析】高渗性脱水以失水为主，失水多于失钠，导致细胞外液处于高渗状态，从而产生：①水从细胞内向细胞外转移，导致细胞内脱水；②体液渗透压增高，抗利尿激素分泌增加，肾小管重吸收水分增加，最终导致尿比重增高。

5、A

【解析】股骨颈骨折股骨头缺血坏死是由于旋股内、外动脉损伤；肱骨干中、下1/3处骨折常引起尺神经损伤；肱骨髁上骨折最常引起肱动脉损伤。

6、E

【解析】ICU病房设置病床要求：一个ICU单位以6~8张床为宜，床间距宜超过1.5m，多采用矩形和开放式，必要时用帷幕隔开。而不是一间病房内不宜超过2张病床。因此，答案E不正确。

7、E

【解析】开放性损伤肠管脱出时严禁将肠管还纳入腹腔，应用等渗盐水无菌纱布覆盖并妥善保护肠管。

8、D

【解析】口腔黏膜及创面消毒，用含有效碘1000~2000mg/L的碘附擦拭，作用3~5分钟；冲洗法：对阴道黏膜创面的消毒，用含有效碘2000mg/L的碘附冲洗，作用到使用产品的规定时间。

9、A

【解析】法国人法约尔对组织管理进行了系统的、独创的研究，1925年出版了《工业管理与一般管理》一书，后人把他称为“管理过程之父”。法约尔提出，管理活动包含五种职能：计划、组织、指挥、协调、控制。

10、D

【解析】慢性化脓性骨髓炎以手术治疗为主，可去除死骨和炎性肉芽组织，消灭死腔。术前患肢抬高制动，消除肿胀，减轻疼痛，防止畸形和病理性骨折。

11、B

12、D

13、C

【解析】桡骨远端伸直型骨折后远端向背侧和桡侧移位。复位后以小夹板或背侧石膏托固定在手腕、尺偏、旋前位2周，之后改用中立位固定2周。

14、A

【解析】根据内容划分，冲突可以分为目标冲突、认知冲突、感情冲突、程序冲突。根据影响划分，冲突可以分为建设性冲突、破坏性冲突。根据范围划分，冲突可以分为人际冲突、群体冲突、组织间冲突。

15、A

【解析】紫外线灯管应每周2次用无水乙醇棉球擦拭灰尘及污垢。7选A。紫外线消毒的效果受环境温度、湿度的影响。该病室内湿度过高，为保证良好的消毒效果，应延长消毒时间。8选B。

16、D

17、E

18、B

【解析】进行车祸现场急救时，若患者发生心搏和呼吸骤停，应立即复苏，抢救生命。必须优先抢救窒息、大出血、开放性气胸、休克、腹腔内脏脱出等特别危急的伤员。

19、B

【解析】血栓闭塞性脉管炎病人的室内温度宜保持在21℃以上。由于末梢神经对热的敏感性降低，因此不可使用热水袋、热水泡脚，以避免引起烫伤。要严格戒烟。6~

20、C

21、B

【解析】门静脉的正常压力是13~24厘米水柱。

22、A

【解析】有包膜的病毒侵入细胞的方式是胞吞或膜融合，冠状病毒是一种包膜病毒，所以其进入人体细胞的方式通常为胞吞或膜融合。

23、B

【解析】1. 在危害健康行为中，违规行为指违反法律法规、道德规范并危害健康的行为，如药物滥用、性乱等。

2. 人类的行为由内因和外因共同决定，即受到遗传、环境及学习因素的影响。自然环境和社会环境是人类行为发展的外在环境。

24、D

【解析】原发性血小板减少性紫癜是由于血小板数量减少而出现止血机制发生异常，从而导致出血。

25、B

【解析】膀胱内药物灌注，目前认为效果最好的是丝裂霉素。

26、D

【解析】全肺切除术后的胸腔引流管一般呈钳闭状态，为保证术后患侧胸腔内有一定的渗液，减轻或纠正明显的纵隔移位。

27、D

【解析】答案A、B、C、E属于医院感染。不属于医院感染的情况还有：1. 皮肤黏膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现。2. 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现。3. 新生儿经胎盘获得（出生后48小时内发病）的感染，如单纯疱疹、弓形体病、水痘等。

28、E

【解析】苯巴比妥钠为镇静催眠药、抗惊厥药，能预防局部麻醉药中毒。

29、A

30、A

31、B

【解析】妊娠8个月出现转移性右下腹痛；查体：体温37.5℃，右肋下处有压痛，无腹肌紧张和反跳痛。血常规：WBC $10.1 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞83%。该病人最可能的诊断是妊娠期急性阑尾炎；该病人诊断较为困难的原因包括盲肠被子宫推压上移；腹肌被拉直；腹膜炎不易局限；大网膜不易包裹炎症部位；如果病人病情进一步加重，应该考虑行剖腹产手术，同时处理原发病灶。

32、D

【解析】该渔民慢性腹泻1年，大便稀带脓血，伴里急后重，粪便检出血吸虫虫卵，可确诊为慢性血吸虫病。血吸虫病主要传播途径为直接接触传播。

33、E

【解析】留置胸膜腔引流管目的是：①引流胸膜腔内渗液、血液及气体。②重建胸膜腔内负压，维持纵隔的正常位置；③促进肺肺的膨胀。

34、B

【解析】需接触隔离的疾病或情况是皮肤白喉、多重耐药的金黄色葡萄球菌感染、大面积烧伤、破伤风、新生儿带状疱疹等，而感染性腹泻需要消化道隔离。

35、E

【解析】管理者工作千头万绪，事先拟订时间进展表，可作为解决时间浪费的方法。

36、A

37、A

【解析】1. 护士对就业保障、工作的环境安全、职业安全、经济保障等的需要属于安全的需要。

2. 护士对友谊、良好人际关系、得到别人的关心和爱护的需要属于爱与归属的需要。

3. 生理需要包括人类最原始的基本需要，如衣、食、住、用，即人类繁衍最基本的物质需要。

4. 尊重需要即人的自尊、尊重别人和被别人尊重的心理状态。包括自尊心、自信心、威望、荣誉、表扬、地位等。

5. 自我实现的需要是指促使自己的潜在能力得到最大限度的发挥，使自己的理想、抱负得到实现的需要。马斯洛认为这是人最高层次的需要。

38、B

【解析】美国心理学家维纳将成功与失败归因为四种可能性：能力、努力、任务的难度、机遇。

39、B

【解析】胃大部切除术的范围是胃远侧 $2/3\sim 3/4$ ，包括部分胃体的远侧部分、胃窦部、幽门和十二指肠球部的近胃部分。

40、B

【解析】因为格拉斯哥昏迷记分法分数越低表示昏迷程度越严重；最高为15分，表示意识清楚；8分以下为昏迷，最低为3分。

41、C

【解析】抗生素治疗应剂量足够，疗程够长，取得稳定的疗效后，方可停用，不可随便减量或停药。败血症应病情好转，体温正常7~10天再停药。

42、A

【解析】骨肿瘤病人X线见有肥皂泡阴影，骨端膨大。该患者可能的诊断是骨巨细胞恶变最恰当的处理是截肢；手术后应定期进行化学药物治疗。

43、C

【解析】一般将高渗性缺水分为三度，轻度缺水，缺水量占体重的2%~4%；中度缺水，缺水量占体重的4%~6%；重度缺水，缺水量超过体重的6%。

44、B

【解析】本组题考查烧伤的相关考点，相关计算应熟记。5岁小儿的双下肢面积为 $[46-(12-5)]\%=39\%$ 。2题选B。该患儿烫伤后皮肤出现大水疱、皮薄，疼痛明显，水疱破裂后创面为红色，这均是浅二度烧伤的特点。3题选B。创面涂抹甲紫可能会影响烧伤深度判断，因此是不正确的急救措施。4题选B。该患儿烧伤后第一个24小时应补的晶体和胶体液总量为 $2*39*25=1950\text{ml}$ 。5题选B。

45、D

46、C

【解析】新型冠状病毒感染的肺炎的潜伏期是1~14天，多为3~7天。同时其发病到入院的中位时间是9天。

47、C

【解析】为了确保健康传播效果，传播者应特别注意以下几点：1. 树立良好的形象。2. 收集、选择对受者有价值的信息。3. 确保信息的准确、鲜明、生动、易懂、适用。4. 根据受者的特点，选择正确的传播渠道。5. 及时了解受者对信息的反应及传播效果，不断调整传播行为。答案C错在根据受者

而不是传播者的情况。

48、E

【解析】新生儿脐带消毒用碘酊和75%乙醇处理，或用含有效碘5000mg / L的碘附处理。

49、B

【解析】以注视对方的眼神表示专心的倾听，是通过无言的动作传情达意，这属于非语言传播技巧中的动态体语。

50、B

2022年主管护师(外科护理)考试试卷(二)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号:_____姓名:_____

一、客观选择题 (共50题, 每题2分, 共计100分)

- () 1、考虑制定计划的前提条件是指计划工作的
- A、方案条件
 - B、辅助计划条件
 - C、预算条件
 - D、人口条件
 - E、假设条件
- () 2、腹部实质性脏器破裂最主要的临床表现是
- A、肠麻痹
 - B、胃肠道症状
 - C、全身感染症状
 - D、内出血征象
 - E、腹膜刺激征
- () 3、下列贫血发生原因不是由于红细胞生成减少造成的是
- A、缺铁性贫血
 - B、巨幼细胞贫血
 - C、再生障碍性贫血
 - D、溶血性贫血
 - E、白血病
- () 4、共用题干

男性, 33岁, 左小腿被锈铁钉刺伤一段时间后出现乏力、头疼、打哈欠, 继而有张口困难、蹙眉和苦笑面容等表现, 全身肌肉阵发性痉挛, 但神志一直清醒, 诊断为破伤风。

痉挛严重发作时。应特别注意观察病人是否发生了

- A、脱水
- B、窒息
- C、心衰

D、肌肉损伤

E、呼吸性酸中毒

() 5、患者，女性，15岁。突感左胸部疼痛4小时，呼吸困难逐渐加重，颈、胸部可闻及捻发音，气管偏向右侧。护理原则首先应为

A、开胸探查

B、协助咳嗽

C、应用止疼药

D、胸腔穿刺、排气减压

E、清创、封闭伤口

() 6、肝癌的定位检查中首选的检查方法是

A、CT

B、B超

C、AFP测定

D、选择性腹腔动脉造影

E、肝穿刺针吸细胞检查

() 7、某工地工人在施工过程中不慎被钢筋刺破胸壁。

在运送过程中病人应采取的卧位是

A、去枕平卧位

B、仰卧位

C、患侧卧位

D、俯卧位

E、健侧卧位

() 8、医院健康教育的重点是

A、医务人员教育

B、患者教育

C、住院教育

D、病房教育

E、门诊教育

() 9、可能出现骨折专有体征的骨折是

A、青枝骨折

B、裂缝骨折

C、螺旋骨折

D、嵌插骨折

E、椎体压缩骨折

() 10、女，25岁，月经周期为28天，现在是月经干净后第8天。宫颈黏膜涂片检查结果是典型羊齿叶状结晶，表明其所处于的阶段为

A、月经期

B、月经前

C、排卵后

D、已妊娠

E、接近排卵

() 11、人类行为的基本要素不包括

A、行为主体

B、行为客体

C、行为动机

D、行为手段

E、行为结果

() 12、女性，52岁，胃溃疡病史多年，于劳累后突发右上腹刀割样剧痛，并迅速向全腹扩散，伴大汗、面色苍白。查体：全腹压痛、反跳痛，腹肌紧张。

该患者可能发生了

A、胃溃疡活动期

B、胃溃疡出血

C、胃溃疡穿孔

D、胃溃疡癌变

E、胃溃疡急性发作

() 13、管理的经济方法的优点是

A、提高社会效益

B、易犯官僚主义的错误

C、提高经济效益

D、有利于发挥基层人员的主动性

E、增加了主管人员的主观主义作风

() 14、口腔科的牙钻结构复杂，且经常接触破损的黏膜，常有血液污染。牙钻属于

A、高度危险性物品

- B、低度危险性物品
- C、中度危险性物品
- D、需高水平消毒的物品
- E、需中水平消毒的物品

() 15、会阴部手术时应采取

- A、仰卧位
- B、半坐卧位
- C、侧卧位
- D、俯卧位
- E、截石位

() 16、女性，69岁，跌倒后造成左股骨颈骨折，行走困难，被收入院。

若X线片显示其远端骨折线与两髂嵴连线的夹角（Pauwells角）为 60° ，说明此骨折属于

- A、头下型骨折
- B、经颈型骨折
- C、基底部骨折
- D、内收型骨折
- E、外展型骨折

() 17、阿米巴性肝脓肿的主要感染途径是

- A、阿米巴滋养体从胆道上行进入肝
- B、阿米巴滋养体从肠穿孔进入腹腔再进入肝
- C、阿米巴滋养体从淋巴系统进入肝
- D、阿米巴滋养体从肝动脉进入肝
- E、阿米巴滋养体从结肠溃疡侵入门静脉所属分支进入肝

() 18、下列不是口服避孕药的副反应的是

- A、类早孕反应
- B、突破性出血
- C、阴道分泌物增加
- D、部分妇女体重增加
- E、少数妇女面部色素沉着

() 19、通过加强医院消毒、灭菌、隔离和屏障护理、无菌技术等措施的应用，基本上能达到有效预防和控制的是

- A、交叉感染

- B、自身感染
- C、二重感染
- D、内源性感染
- E、难治性感染

() 20、以下哪项不属于计划工作的原则

- A、系统化原则
- B、重点原则
- C、弹性原则
- D、效益原则
- E、创新原则

() 21、下列关于左、右主支气管的描述中错误的是

- A、气管在隆凸处分为左、右主支气管
- B、右主支气管较左主支气管粗、短、直
- C、进行气管插管时，若插入过深时易误插入右主支气管
- D、异物易吸入左主支气管
- E、肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关

() 22、溃疡病幽门梗阻病人的主要临床表现是

- A、腹胀
- B、食欲减退
- C、营养不良
- D、阵发性腹痛
- E、呕吐大量宿食

() 23、张力性气胸的紧急处理应

- A、抗感染
- B、剖胸探查
- C、固定胸壁
- D、穿刺排气减压
- E、迅速封闭胸壁伤口

() 24、下列有关洗手目的的描述中，错误的是

- A、可保持手部卫生
- B、可防止经手的交叉感染

- C、可防止耐药细菌定植和扩散
 - D、可降低医院感染发生率
 - E、可清除手上的一切微生物
- () 25、Colles骨折病人行石膏固定时腕关节应处于
- A、背伸位
 - B、尺侧偏斜位
 - C、屈腕尺偏位
 - D、桡侧偏斜位
 - E、背伸桡偏位
- () 26、男性，70岁，因前列腺增生造成排尿困难。尿潴留，已15小时未排尿。目前正确的护理措施是
- A、让病人坐起排尿
 - B、让病人听流水声
 - C、用温水冲洗会阴部
 - D、热敷F腹部
 - E、行导尿术
- () 27、乳腺癌根治术后第2天护理、措施不正确的是
- A、患侧垫枕，抬高患肢
 - B、保持伤口引流管通畅
 - C、观察患侧肢端的血液循环
 - D、指导肩关节的活动
 - E、禁止在患侧手臂测血压、输液
- () 28、护士对颈椎病病人进行术后出院指导，正确的是
- A、每天做快速转头运动锻炼
 - B、1个月后疾病症状可完全消失
 - C、日常生活中减少颈部活动，尽量保持颈部固定
 - D、枕头高度以头颈部未压上时有一拳高为宜
 - E、适度颈部锻炼，避免过度运动
- () 29、过氧乙酸原液浓度低于何值时禁止使用
- A、11%
 - B、12%
 - C、13%

D、14%

E、15%

- () 30、患者男性，32岁。车祸致双下肢挤压伤，神志尚清楚，表情淡漠，明显口渴，面色苍白，皮肤湿冷，脉率118次/分，血压90/60mmHg，中心静脉压1mmHg，毛细血管充盈迟缓，血pH值为7.32。

对该患者进行救治，应从何时开始使用抗生素

A、抢救开始时

B、休克控制后

C、决定手术前

D、手术后

E、病情进一步恶化

- () 31、物质性质量标准的主要形式是

A、统一化

B、一体化

C、规格化

D、系列化

E、规范化

- () 32、“新型冠状病毒感染的肺炎”的报告时间为()

A、1小时

B、2小时

C、12小时

D、24小时

E、36小时

- () 33、医院感染资料汇总统计分析后绘制成图表表示，若要说明连续性资料，表示事物数量在时间上的变动情况或一种现象随另一种现象的变动情况则选用

A、统计地图

B、圆形图

C、直条图

D、线段图

E、直方图

- () 34、患者女性，28岁。胃大部切除术后4天，体温38.5℃，切口疼痛，应考虑

A、外科手术热

B、切口感染

C、腹腔感染

D、肺部感染

E、膈下脓肿

() 35、骨结核患儿夜啼的原因是

A、舌后坠引起打鼾

B、营养消耗多，夜间容易饥饿

C、夜尿次数增加，被服被尿湿

D、夜间盗汗浸湿被服，患儿感觉不适

E、肌肉放松后体位改变，造成患处疼痛

() 36、关于倾倒综合征患者的饮食指导不正确的是

A、少食多餐

B、餐后散步

C、高蛋白质饮食

D、餐时限制饮水

E、避免过甜、过咸食物

() 37、王先生，患破伤风，频繁抽搐，呼吸道分泌物较多，有窒息的危险，为保持呼吸道的通畅，应采取的措施是

A、吸痰、给氧

B、超声雾化吸入

C、环甲膜穿刺

D、气管插管、辅助呼吸

E、气管切开

() 38、下面不属于健康教育的流行病学诊断所回答的问题是

A、威胁目标人群生命与健康的疾病或健康问题是什么？

B、影响该疾病或健康问题的危险因素是什么？

C、这些疾病或健康问题的受害者在性别、年龄、种族和职业上有何特征？

D、这些疾病或健康问题在地区、季节、持续时间上时有何规律？

E、目标人群疾病或健康问题发生的行为危险因素是什么？

() 39、急性阑尾炎的典型临床表现是

A、腹泻、发热、转移性右下腹痛

B、突发右下腹绞痛、恶心、呕吐、右下腹压痛

- C、突发腹痛、恶心、呕吐、右下腹包块、压痛
- D、右下腹绞痛向会阴部放射、恶心、呕吐
- E、转移性右下腹痛、恶心、呕吐、右下腹压痛
- () 40、原发性肝癌最常见的类型是
- A、小癌型
- B、结节型
- C、溃疡型
- D、块状型
- E、弥漫型
- () 41、对DIC病人早期进行抗凝治疗时，首选的药物是
- A、肝素
- B、双嘧达莫(潘生丁)
- C、链激酶
- D、尿激酶
- E、阿司匹林
- () 42、碱中毒易发生手足抽搐是因为
- A、低钾
- B、低氯
- C、低钙
- D、高钠
- E、高钾
- () 43、下列需进行外科手消毒的是
- A、无菌操作前
- B、接触病人体液后
- C、脱手套后
- D、外科手术前
- E、戴口罩前
- () 44、女性，40岁。胆道术后，T管引流2周，拔管前先试行夹管1~2天，夹管期间应注意观察的内容是
- A、饮食、睡眠
- B、腹痛、发热、黄疸
- C、粪便的颜色

- D、引流口有无渗液
- E、神志、血压和脉搏
- () 45、医疗机构从业人员行为规范是什么时候发布实施的 ()
- A、2011年5月26日
- B、2012年5月26日
- C、2011年6月26日
- D、2012年6月26日
- E、2013年1月26日
- () 46、患者手术切口部位的皮肤消毒手术野的消毒步骤
- A、手术野及其外15cm以上由上往下擦拭
- B、手术野及其外15cm以上由右向左擦拭
- C、手术野及其外10cm以上由内向外擦拭
- D、手术野及其外10cm以上由外向内擦拭
- E、手术野及其外15cm以上由内向外擦拭
- () 47、手术护理的道德要求为 ()
- A、平等的道义性，安全的重要性，优质的必要性，舒适的可能性
- B、技术的先进性，作风的严谨性，工作的负责性，环境的合理性
- C、平等的道义性，安全的重要性，技术的先进性，作风的严谨性
- D、服务的热情性，技术的先进性，环境的合理性，作风的严谨性
- E、平等的道义性，优质的必要性，技术的先进性，环境的合理性
- () 48、关于健康教育评价的描述，以下错误的是
- A、形成评价的方法主要有文献、档案、资料的回顾、专家咨询、专题小组讨论等
- B、过程评价起始于健康教育计划实施开始之时，贯穿于计划执行的全过程
- C、效应评价能全面反映健康教育项目的成功之处与不足，为今后的计划制订和项目决策提供依据
- D、结局评价正是着眼于健康教育项目实施后所导致的目标人群健康状况及生活质量的变化
- E、总结评价是指形成评价、过程评价、效应评价和结局评价的综合以及对各方面资料做出总结性的概括
- () 49、胸部手术后应采取
- A、去枕平卧位
- B、平卧位
- C、平卧中凹位

D、半卧位

E、高斜坡卧位

() 50、常伴有抽搐的甲状腺癌为

A、乳头状腺癌

B、髓样癌

C、滤泡状腺癌

D、未分化癌

E、腺瘤癌变

参考答案

一、客观选择题

1、E

【解析】计划工作的第三步是确定一些关键性的计划前提条件，前提条件就是指计划工作的假设条件，即执行计划时的预期环境。

2、D

【解析】选项A、B、C、E是腹部空腔脏器损伤时弥漫性腹膜炎的表现，故不正确；肝、脾、胰、肾等实质性脏器富含血管，受到创伤时主要表现为内出血，故选D。

3、D

【解析】缺铁性贫血是由于铁元素缺乏导致的；巨幼细胞贫血是叶酸和(或)维生素B缺乏所致；再生障碍性贫血和白血病是由于骨髓造血功能障碍所致；以上原因均会导致红细胞生成减少。而溶血性贫血是由于红细胞破坏过多造成的。

4、B

【解析】本组题考查破伤风相关考点。控制并解除痉挛是破伤风发作时的重要环节。6题选A。破伤风病人痉挛严重发作时要注意呼吸道通畅，防止病人出现窒息。7题选B。应将病人安置于隔离病室，保持安静，减少一切刺激，遮光，防止噪音。各种动作包括说话、走路都要低声、轻巧，治疗、护理等各项操作尽量集中，可在使用镇静药30分钟内进行，以免刺激打扰病人而引起抽搐。破伤风杆菌具有传染性，为防止播散，伤口敷料在使用后应进行高压蒸汽灭菌。8题选E。

5、D

6、B

【解析】肝癌的定位检查中首选的检查方法是B超，经济有效。

7、C

【解析】胸壁有伤口该损伤的类型为开放性损伤；现场应给予的主要急救措施是封闭伤口，变开放性气胸为闭合性气胸；在运送过程中病人应采取的卧位是患侧卧位。

8、B

【解析】医院服务对象是患者，其健康教育的重点是患者教育；患者住院后，住院教育的重点是病房教育。

9、C

【解析】可能出现骨折专有体征的骨折是螺旋骨折。

10、E

【解析】子宫颈内膜腺细胞的分泌活动受雌、孕激素的影响，并有明显的周期性变化。排卵前随雌激素水平不断增高，宫颈黏液分泌量逐渐增多，并变得稀薄透明，取黏液涂于玻片，干燥后可见羊齿植物叶状结晶。这种结晶于月经周期的第6~7天即可出现，至排卵期最典型。排卵后，受孕激素影响，黏液分泌量减少，涂片干后，可见成排的椭圆体。

11、C

【解析】行为的构成要素

人的行为由五个基本要素构成，即行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和行为结果。

(1. 行为主体 人。

(2. 行为客体 人的行为所指向的目标。

(3. 行为环境 行为主体与行为客体发生联系的客观环境。

(4. 行为手段 行为主体作用于行为客体时的方式、方法及所应用的工具。

(5. 行为结果 行为对行为客体所致的影响。

12、C

【解析】该患者有多年胃溃疡病史，于劳累后突发右上腹刀割样剧痛，并迅速向全腹扩散，伴大汗、面色苍白，查体为全腹压痛、反跳痛及腹肌紧张，这些临床表现符合胃溃疡急性穿孔。对于该患者若给予保守治疗，最重要的措施是禁食、胃肠减压，以减少胃肠内容物继续流入腹腔。

13、C

【解析】管理的经济方法就是运用经济手段和经济方法，来调节国家、集体、个人之间的经济利益，实施管理的一种方法。优点在于：①有利于提高经济效益；②促使组织员工从物质利益的角度，关注组织目标的实现；③促使主管人员减少主观主义和官僚主义的作风，提高行政效果。选项A是经济方法的一大弊端，选项B和E是行政方法的缺点，选项D是教育方法的优点。

14、A

【解析】高度危险性物品是指穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材，或与破损的组织或皮肤黏膜密切接触的器材和用品。牙钻经常接触破损的黏膜，常有血液污染，因此属于高度危险性物品。

15、E

【解析】颈部手术时应采取仰卧位；腹部手术时应采取仰卧位；胸部手术时应采取侧卧位；会阴部手术时应采取截石位。

16、D

【解析】股骨颈骨折时，若X线片显示远端骨折线与两髁嵴连线的夹角(Pauwells角)大于 50° ，为内收型骨折，小于 30° 为外展型骨折。

病人在跌倒时身体扭转，力量传导到股骨颈而发生骨折，并非骨折处直接受到外力作用，因此为间接暴力。

内收型股骨颈骨折病人患肢呈屈曲、内收、外旋、缩短畸形。

17、E

【解析】阿米巴性肝脓肿是肠道阿米巴感染的并发症。阿米巴滋养体经结肠溃疡处侵入门静脉分支进入肝脏。

18、C

【解析】备选答案C是阴道炎的表现，与口服避孕药无关。

19、A

【解析】交叉感染亦称外源性感染，因为病原体来自患者体外，如其他患者、医院工作人员，以及污染的医疗器械、血液制品、病房用物及环境等，所以通过加强医院消毒、灭菌、隔离和屏障护理、无菌技术等措施的应用，基本上能达到有效预防和控制。

20、D

【解析】计划的工作原则除了A、B、C、E外，还包括可考核性原则，就是说计划工作必须始终坚持以目标为导向，目标应具体、可测量、可考核，作为计划执行过程和评价过程的标准和尺度。

21、D

【解析】右主支气管较左主支气管粗、短而陡直，因此异物或吸入性病变（如肺脓肿）多发生在右侧，气管插管过深时亦容易误入右主支气管。

22、E

23、D

【解析】开放性气胸病人因胸膜腔与外界相通，呼吸时可出现纵隔扑动，严重影响呼吸和循环功能，应立即封闭胸壁伤口，将开放性气胸转变为闭合性气胸，再做进一步处理。9题选E。张力性气胸病人因患侧胸膜腔内压力进行性升高，呼吸和循环功能受到极大影响，故应及时穿刺排气减压。10题选D。进行性血胸病人因出血量大可致低血容量性休克，应及时剖胸、探查以止血。11题选B。

24、E

【解析】洗手是将手涂满肥皂泡沫，并对其表面进行强有力的短时揉搓，然后用流动水冲洗干净的过程。洗手可清除手上的部分微生物，主要是致病微生物，但无法清除定植在手部皮肤上的正常菌群。

25、C

【解析】Colles骨折的典型的畸形表现是侧面观“餐叉样”畸形，正面观“枪刺样”畸形，因此复位后腕关节应处于屈腕尺偏位。

26、E

【解析】该病人因前列腺增生造成排尿困难、尿潴留时间较长，目前应紧急行导尿术解除梗阻。前列腺增生的·临床表现治疗要点，护理措施为考试重点。

27、D

28、E

【解析】颈椎病病人出院后应加强颈部保护，防止颈部突然、用力、大范围活动。颈椎病恢复为慢性过程，建立恢复信心。功能锻炼要循序渐进，避免颈部过度活动。

29、B

【解析】过氧化氢稳定性差，因此需要定期检测其浓度，如原液浓度低于12%时禁止使用。

30、A

【解析】1. ①该患者有发生休克的原因：车祸致双下肢挤压伤；②有发生休克的典型症状：口渴、面色苍白、皮肤湿冷；③根据血压、脉率及毛细血管充盈情况，可判断该患者正处于休克抑制期，即中度休克期。

2. 创伤性休克为低血容量休克，中心静脉压低，因此为血容量不足。

3. 车祸后的伤口为污染创面，而休克可降低患者的抗感染能力，因此应尽早使用。

4. 休克是机体在各种有害因素侵袭下引起的以有效循环血容量骤减，组织灌注不足，细胞代谢紊乱、受损和微循环障碍为特点的病理过程。其关键和始动环节是有效循环血量不足，因此治疗休克最有效和关键的措施为补充血容量。

31、C

【解析】规格化是物质性质量标准的主要形式。

32、B

【解析】将新型冠状病毒感染的肺炎纳入传染病防治法规定的乙类传染病，但采取甲类传染病的预防、控制措施，同时将其纳入检疫传染病管理。要求在发现之后，两小时之内通过监测信息系统进行上报。

33、D

【解析】统计图有圆形图、直方图、直条图、统计地图和线段图等，其中线段图用于说明连续性资料，表示事物数量在时间上的变动情况或一种现象随另一种现象的变动情况。

34、B

【解析】外科手术热一般不超过38℃，若术后3~6天仍持续发热，则提示感染或其他不良反应，由于该患者有切口疼痛，且为切口感染的好发时间术后第4天，故提示切口感染的可能。

35、D

【解析】骨结核以青少年多见，由于夜间盗汗浸湿被服，患儿感觉不适而夜啼。

36、B

【解析】倾倒综合征患者在饮食上要少食多餐，避免过甜、过咸、过浓的流质饮食，进食低糖类、高蛋白质饮食，餐时限制饮水，进餐后平卧10~20分钟，症状可减轻或消失。多数患者在术后半年到一年内能逐渐恢复。

37、E

【解析】气管切开是保持呼吸道通畅的最有效措施。

38、E

【解析】健康教育的流行病学诊断所回答的问题除ABCD外，还包括对哪些（哪个）问题进行干预可能最敏感？预期效果和效益可能最好？

39、E

40、B

【解析】原发性肝癌的大体类型有3类：结节型、巨块型和弥漫型，其中结节型最常见。

41、A

【解析】DIC病人早期在促凝物质作用下，凝血因子被激活，血中凝血酶量增加，血液呈高凝状态，循环血液中易有血栓形成。此期应及早进行抗凝治疗；常用药物有肝素、双嘧达莫(潘生丁)、右旋糖酐和阿司匹林等。其中肝素能抑制凝血机制，阻止DIC进展，使用越早效果越好，常为首选药物。

42、C

【解析】离子化钙与非离子化钙的比率受pH值影响，pH值升高时，离子化钙转变为非离子化钙增加，造成低钙，导致手足抽搐。

43、D

【解析】下列需进行外科手消毒的是外科手术前。

44、B

45、D

46、E

【解析】手术区皮肤消毒：

消毒范围：手术切口周围15-20cm的区域，如有延长切口的可能，应扩大消毒范围。

消毒原则：①以手术切口为中心向四周涂擦。②感染伤口或肛门会阴部皮肤消毒，外周向感染伤口或会阴肛门处涂擦。

47、A

48、C

49、D

【解析】硬膜外麻醉后应采取平卧位，防止头痛；腰麻术后应采取去枕平卧位；休克患者应采取平卧中凹位，增加回心血量；颅脑手术后应采取高斜坡卧位，增加静脉回流，减轻脑水肿；胸部手术后应采取半卧位。

50、B

【解析】甲状腺癌按肿瘤的病理类型可分为：①乳头状癌，约占成人甲状腺癌的60%和儿童甲状腺癌的全部，恶性程度低，预后较好，故小题1选A。②滤泡状腺癌，约占20%，中度恶性，预后不如乳头状腺癌；③髓样癌，较少见，仅占7%，来源于滤泡旁降钙素分泌细胞，导致降钙素增高，患者出现低血钙，引起抽搐，恶性程度中等，预后不如乳头状腺癌但较未分化癌好，故小题2选B。④未分化癌，约占15%，高度恶性，早期即可发生颈部淋巴结转移，容易侵犯周围组织和器官，预后很差，故小题3选D。

2022年主管护师(外科护理)考试试卷(三)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号: _____ 姓名: _____

一、客观选择题 (共50题, 每题2分, 共计100分)

() 1、不属于成瘾行为的戒断症状主要有

- A、空虚
- B、不安
- C、呼吸急促
- D、贪食
- E、寻死觅活

() 2、女性, 患泌尿系结石。

以下属于泌尿系结石形成的原因的是

- A、新陈代谢紊乱
- B、尿液潴留
- C、营养缺乏
- D、泌尿系感染及异物
- E、日常饮水少

() 3、女性, 32岁, 车祸造成颈椎骨折和颈髓损伤, 出现双上肢迟缓性瘫痪, 双下肢痉挛性瘫痪, 躯干和四肢感觉消失。

该患者受伤后2周内的泌尿系护理措施可采用

- A、自行排尿
- B、间歇导尿
- C、持续开放导尿
- D、出现尿潴留时插导尿管
- E、导尿管每4~6小时开放一次

() 4、以下属于患者解除隔离的标准的是 ()。

- A、体温恢复正常2天以上
- B、连续两次呼吸道病原核酸检测阴性 (间隔至少1天)
- C、体温恢复正常

D、患者不再咳嗽

E、患者连续3天不再发热

() 5、结核病的常见传播途径是

A、粪-口传播

B、血液传播

C、性行为传播

D、飞沫传播

E、虫媒传播

() 6、女性，69岁，跌倒后造成左股骨颈骨折，行走困难，被收入院。

病人受伤的病因为

A、直接暴力

B、间接暴力

C、肌肉牵拉

D、骨骼劳损

E、病理性骨折

() 7、患者，女性，49岁，风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄近30年，最近一次超声心动图诊断其二尖瓣狭窄程度为重度狭窄，则其二尖瓣瓣口面积符合

A、4~6cm

B、2~4cm

C、小于2cm

D、小于1.5cm

E、小于1.0cm

() 8、心绞痛发作时疼痛持续时间一般为

A、3~5分钟

B、10分钟

C、15分钟

D、20分钟

E、30分钟

() 9、女性，52岁，胃溃疡病史多年，于劳累后突发右上腹刀割样剧痛，并迅速向全腹扩散，伴大汗、面色苍白。查体：全腹压痛、反跳痛，腹肌紧张。

若医嘱采用保守治疗，此期间最重要的措施是

A、密切观察病情变化

- B、补液
- C、应用抗生素
- D、维持有效的胃肠减压
- E、维持水、电解质平衡

- () 10、患者，女性，55岁，在家用蜂窝煤炉子做饭时感觉头痛，饭后头痛加剧，伴恶心、呕吐，感觉四肢无力，视物不清，而后昏倒。入院时患者口唇黏膜呈樱桃红色，脉搏快，多汗，神志不清伴低热。以下可明确诊断的首选检查项目是
- A、胸部CT
 - B、胃液分析
 - C、中心静脉压监测
 - D、血液碳氧血红蛋白测定
 - E、全血胆碱酯酶活力测定
- () 11、小脑幕裂孔疝急性期首发症状是
- A、意识障碍、瞳孔散大
 - B、意识障碍、呼吸暂停
 - C、癫痫持续状态
 - D、血压下降
 - E、肢体瘫痪
- () 12、女性，45岁，偶然发现左乳房肿块，直径约3cm，质较硬、无压痛，与皮肤有少许粘连。左侧腋下可扪及1cm大小肿大的淋巴结。

病人的术后护理措施中不正确的是

- A、抬高患侧上肢
 - B、患侧胸壁加压包扎
 - C、保持引流管通畅
 - D、早期活动患肢
 - E、不在患肢测血压
- () 13、患者女，36岁。因急性化脓性阑尾炎行急症手术，术前检查各项指标均正常。灭菌后的物品监测指标是不得检出任何微生物，细菌菌落数应不超过
- A、15CFU/件
 - B、20CFU/件
 - C、25CFU/件
 - D、30CFU/件

E、35CFU/件

() 14、硬脑膜外血肿，最常见的出血来源是

- A、板障静脉破裂
- B、挫裂伤的组织血管破裂
- C、脑膜中动脉破裂
- D、静脉窦出血
- E、脑实质血管出血

() 15、肿瘤的三级预防中的二级预防的目的是

- A、降低发病率
- B、提高生活质量
- C、延长生命
- D、降低死亡率
- E、减轻痛苦

() 16、骨肿瘤的好发部位

- A、扁骨
- B、脊椎骨
- C、长管状骨骨干
- D、长管状骨干骺端
- E、短状骨干骺端

() 17、患者男性，69岁。因头痛、头晕、右半身麻木无力2个月，呕吐2天入院。4年前发现血压高，服药可降至正常。体检：神清，血压正常，眼底视乳头模糊不清，视乳头水肿。右面部感觉减退，双眼展神经轻度麻痹，右口角力弱，右侧肢体不全瘫，右侧病理反射阳性。胸片示右肺第2肋间可见阴影。

为明确诊断，首选的检查是

- A、脑血管造影
- B、头部CT或MRI
- C、脑超声波
- D、腰穿
- E、胸部CT

() 18、乳腺癌病人出现“酒窝征”的原因是

- A、粘连
- B、肿物压迫

- C、乳管被侵犯
- D、癌肿侵及Cooper韧带
- E、癌细胞堵塞表浅淋巴管

() 19、男性，40岁，体重70kg，被热液烫伤3小时后去医院就诊。查体：烫伤包括头面颈部、右上肢、右下肢(不包括臀部)、左膝关节以下至足趾及胸部一手掌大小的面积，创面大水疱，水疱壁薄，水疱下创面潮红、水肿，病人疼痛剧烈。

该病人烧伤的面积为

- A、36%
- B、40%
- C、45%
- D、50%
- E、55%

() 20、高位截瘫是由于损伤了脊髓的

- A、颈段
- B、胸段
- C、腰段
- D、骶段
- E、尾段

() 21、下列关于胫腓骨骨折的叙述中正确的是

- A、单纯胫骨干骨折最多见
- B、多由间接暴力造成
- C、在长骨骨折中最少见
- D、可能伴发骨筋膜室综合征
- E、螺旋形骨折者应行手法复位加外固定治疗

() 22、前列腺增生最主要的症状是

- A、尿频
- B、进行性排尿困难
- C、尿潴留
- D、尿失禁
- E、尿流中断

() 23、以下不宜手术治疗的疾病是

- A、甲状腺乳头状腺癌

- B、甲状腺髓样癌
- C、甲状腺滤泡状腺癌
- D、甲状腺肿继发甲亢者
- E、甲状腺未分化癌

() 24、时某，男性，65岁，右腰痛2年余，无痛性全程肉眼血尿3天；查体：右肾区叩痛，右肾可触及季肋下3指；尿常规：红细胞充满视野；肾盂静脉造影可见右肾中盏移位、拉长、变形。应诊断为

- A、肾癌
- B、肾结核
- C、肾盂癌
- D、肾胚胎癌
- E、肾囊肿

() 25、根据健康教育评价的影响因素的分类方法，评定错误属于

- A、选择因素
- B、历史因素
- C、观察因素
- D、回归因素
- E、失访因素

() 26、患者男性，56岁。因不稳定型心绞痛入院，冠状动脉造影提示3支病变，行3处冠脉内支架治疗，术后未坚持药物治疗，术后1个月突发胸部疼痛2小时入院，急诊冠状动脉造影检查提示2处支架完全闭塞，行冠状动脉搭桥术。

术后测定左房压、右房压、肺动脉压和肺动脉嵌压，下列说法正确的是

- A、测压前不需调试各零点
- B、术后48小时内连续监测记录，每30分钟1次，平稳后改为每小时1次
- C、不需无菌操作
- D、咳嗽、呕吐、躁动及用力均不会影响测压
- E、预防导管折断或导管接头脱落、出血

() 27、预防习惯性关节脱位的最主要方法是

- A、早期活动
- B、增强局部肌肉力量
- C、肢体完全制动
- D、关节复位后固定时间足够

E、减少肢体活动

- () 28、下列选项中属于影响健康传播的自然环境的是
- A、传播活动的地点、场所、社会规范、政策法规等
 - B、传播活动的地点、环境布置、社会规范、政策法规等
 - C、传播活动的地点、场所、光线、温度、环境布置等
 - D、传播活动的地点、社会经济状况、文化习俗等
 - E、传播活动的环境布置、文化习俗、社会规范、政策法规等
- () 29、以下补液原则不正确的是
- A、先盐后糖
 - B、先慢后快
 - C、先晶后胶
 - D、尿畅补钾
 - E、液种交替
- () 30、对于颈椎前路手术的患者，主要需教会患者
- A、俯卧位训练
 - B、侧卧位训练
 - C、向手术方推拉气管训练
 - D、向非手术方推拉气管训练
 - E、半卧位训练
- () 31、以下哪类患者不宜使用主动-被动型护患关系模式 ()
- A、新生儿
 - B、全麻患者
 - C、深昏迷患者
 - D、恢复期患者
 - E、中度昏迷患者
- () 32、女性，30岁，面部刀刺伤12小时，目前最适当的处理措施是
- A、清创缝合
 - B、延期缝合
 - C、换药
 - D、红外线照射
 - E、伤口留置引流后包扎
- () 33、下列关于特异性感染特点的叙述正确的是

- A、均有红肿热痛和功能障碍
 - B、同一种致病菌可引起同一种疾病
 - C、不同致病菌可引起同一种疾病
 - D、手术后感染多属此类
 - E、一种致病菌只能引起一种特定感染
- () 34、吉兰-巴雷综合征典型的脑脊液改变是
- A、细胞数增高，蛋白质增高
 - B、细胞数降低，蛋白质降低
 - C、糖、氯化物降低
 - D、淋巴细胞明显增多
 - E、细胞数正常，蛋白质增高
- () 35、胰腺癌有明显黄疸病人术前必须补充的维生素是
- A、维生素A
 - B、维生素B
 - C、维生素C
 - D、维生素D
 - E、维生素K
- () 36、测量生活质量的客观指标不包括下列哪项
- A、目标人群生活环境的物理状况
 - B、目标人群的经济状况
 - C、目标人群的文化状况
 - D、目标人群的疾病状况
 - E、目标人群对生活满意程度的感受
- () 37、禁忌采用腹腔镜胆囊切除术的是
- A、胆囊结石
 - B、慢性胆囊炎
 - C、胆囊息肉
 - D、有出血倾向
 - E、胆囊结石继发胆管结石
- () 38、碱化尿液可用
- A、碳酸氢钠

B、别嘌呤醇

C、甲氨蝶呤

D、麦冬

E、灭吐灵

() 39、脑室引流术后患者引流管护理方法正确的是

A、引流管开口与侧脑室齐平

B、定期夹闭导管

C、每日引流量不超过500ml

D、定时无菌生理盐水冲洗

E、引流管无脑脊液流出即可拔管

() 40、男性，40岁，因车祸发生脾破裂、失血性休克，准备手术。在等待配血期间，静脉输液宜首选

A、5%葡萄糖溶液

B、5%葡萄糖等渗盐水

C、平衡盐溶液

D、林格液

E、5%碳酸氢钠溶液

() 41、以下关于急性肾衰少尿期的处理不正确的是

A、卧床休息

B、控制入液量，一般为500ml+前一天出液量

C、供给足够的热量，应大于125.5kg/(kg·d)

D、尽量避免食用含钾高的食物和药物

E、需大量输血时可输库存血

() 42、下列表明疝内容物已发生缺血坏死的是

A、疝块增大，不能回纳

B、疝块紧张发硬

C、疝块有压痛

D、阵发性腹痛伴呕吐

E、全腹有压痛，腹肌紧张

() 43、开放性颅脑损伤是

A、脑震荡

B、脑挫裂伤

- C、颅底骨折
- D、颅盖骨折
- E、硬脑膜外血肿

- () 44、下列对过氧乙酸用法描述错误的是
- A、稀释液临用前配制，使用时限 \leq 48小时
 - B、适用于内镜的灭菌
 - C、原液浓度低于12%时禁止使用
 - D、对金属有腐蚀性，对织物有漂白作用
 - E、用于环境消毒，选择0.3%溶液喷洒
- () 45、用于浸泡金属器械时需加亚硝酸钠防锈
- A、75%乙醇
 - B、2%过氧乙酸
 - C、0.5%碘伏
 - D、10mg / L二溴海因
 - E、2%戊二醛
- () 46、肾上腺髓质肿瘤主要分泌
- A、肾上腺素
 - B、去甲肾上腺素
 - C、多巴胺
 - D、肾素
 - E、皮质固醇
- () 47、第二腰椎以下脊柱骨折脱位可导致
- A、脊髓震荡
 - B、脊髓挫伤
 - C、脊髓受压
 - D、脊髓断裂
 - E、马尾神经损伤
- () 48、“知信行模式”构成要素中不包括
- A、知识
 - B、技能
 - C、态度
 - D、信念

E、行为

() 49、下列叙述错误的是

A、高度危险物品必须用灭菌方法处理

B、部分中度危险物品可选用中水平消毒法

C、胃镜必须采用高水平消毒方法

D、低度危险物品一般可采用低水平消毒方法

E、受到一般细菌污染的物品，必须选用高水平消毒方法

() 50、患者刘某，男，63岁，入院诊断为：2型糖尿病，护士在对其进行了健康教育需求评估后计划对其进行“糖尿病对机体的危害”和“如何进行血糖自我监测”两方面的教育。

护士对患者进行“如何进行血糖自我监测”方面的教育是想改善患者的

A、知识

B、态度

C、情感

D、技能

E、能力

参考答案

一、客观选择题

1、D

【解析】成瘾行为在戒断时会出现一系列戒断症状，如感到空虚、焦虑不安、呼吸急促甚至寻死觅活。

2、D

【解析】2. 泌尿系局部因素：尿路感染、梗阻、及异物；流行病因素；尿液因素：尿pH改变、尿液浓缩及尿中抑制晶体形成物质不足、形成结石物质排出过多。

3、C

【解析】该患者为颈髓损伤出现了高位截瘫，翻身时要有专人托扶头部。受伤2周内患者的尿管应持续开放，2周后可定时开放训练自律性膀胱。

4、B

【解析】出院指标第一是病情稳定，发热情况好转。第二是肺部影像学明显好转，没有脏器功能障碍。患者呼吸平稳，意识清楚，交流正常，饮食正常，体温恢复正常3天以上，连续两次呼吸道病原核酸检测阴性（间隔至少1天），可解除隔离出院或根据病情转至相应科室治疗其他疾病。

5、D

【解析】甲型肝炎和戊型肝炎的主要传播途径是粪-口传播。乙肝、丙肝、丁肝病毒均主要经血液传播。淋病主要通过性行为传播。结核菌可通过呼吸道、消化道传播，以呼吸道传播最为常见。

6、B

【解析】股骨颈骨折时，若X线片显示远端骨折线与两髁嵴连线的夹角(Pauwells角)大于 50° ，为内收型骨折，小于 30° 为外展型骨折。

病人在跌倒时身体扭转，力量传导到股骨颈而发生骨折，并非骨折处直接受到外力作用，因此为间接暴力。

内收型股骨颈骨折病人患肢呈屈曲、内收、外旋、缩短畸形。

7、E

【解析】本题考查了二尖瓣狭窄的发病机制。正常成人二尖瓣瓣口面积为 $4\sim 6\text{cm}^2$ 。瓣口面积减至 2.0cm^2 以下为轻度狭窄，瓣口面积小于 1.5cm^2 为中度狭窄，小于 1cm^2 时为重度狭窄。

8、A

【解析】心绞痛发作时疼痛出现后逐步加重，然后在 $3\sim 5$ 分钟内消失，可数天或数星期发作一次，亦可一日内发作多次。

9、D

【解析】该患者有多年胃溃疡病史，于劳累后突发右上腹刀割样剧痛，并迅速向全腹扩散，伴大汗、面色苍白，查体为全腹压痛、反跳痛及腹肌紧张，这些临床表现符合胃溃疡急性穿孔。对于该

患者若给予保守治疗，最重要的措施是禁食、胃肠减压，以减少胃肠内容物继续流入腹腔。

10、D

【解析】本题考查了CO中毒的检查。

11、A

【解析】枕骨大孔疝是小脑扁桃体及延髓经枕骨大孔被挤向椎管中，又称小脑扁桃体疝。病人常有进行性颅内压增高的临床表现，生命体征紊乱出现较早，意识障碍出现较晚。早期即可突发呼吸骤停而死亡。11题选B。小脑幕切迹疝是因一侧幕上压力增高，使位于该侧小脑幕切迹缘的颞叶的海马回、钩回疝入小脑幕裂孔下方，导致中脑受压、动眼神经受累，出现意识障碍、瞳孔散大。12题选A。

12、D

【解析】中年女性发现乳房无痛性肿块，与皮肤有粘连。左侧腋下可扪及1cm大小肿大的淋巴结。该病人最可能的诊断是乳癌；要进一步进行的检查是乳房钼靶X线摄片；该病人的治疗方法可能为乳癌改良根治术；病人的术后护理措施中不正确的是早期活动患肢，这样容易导致皮下积液；病人术后进行功能锻炼的方法不正确的是术后第5天进行肩关节活动。

13、B

【解析】灭菌后的物品监测指标是细菌菌落数应不超过20CFU/件

14、C

【解析】硬脑膜外血肿常因颞侧颅骨骨折致脑膜中动脉破裂所引起。

15、D

【解析】本题考查肿瘤的预防。一般分三级：一级预防为病因预防，目的是消除或减少可致癌的因素，降低癌症发病率，防止癌症发生。二级预防是肿瘤的早期发现、早期诊断和早期治疗，其目的是降低癌症死亡率。三级预防为肿瘤诊断及治疗后的康复，目的在于提高病人生存质量、减轻痛苦、延长生命等。

16、D

【解析】肿瘤多发于长骨的干骺端，也就是骨骼生长最活跃的部位，如股骨下端、胫骨上端、肱骨上端。

17、B

【解析】因为头痛、呕吐、视乳头水肿是颅内压增高的典型临床表现，选项A、B、C、E与题干信息不符，所以考虑患者有颅内压增高。

选项A脑血管造影主要用于疑有脑血管畸形或动脉瘤等疾病的病例。选项C、E对颅内占位性病变无诊断价值；颅内高压时禁止做腰穿，排除选项D。头部CT是诊断颅内占位性病变的首选辅助检查措施，不仅能对绝大多数占位性病变做出定位诊断，而且还有助于定性诊断。CT具有无创伤性的特点，易于被患者接受。在CT不能确诊的情况下，可进一步行MRI检查，以利于确诊，故选B。

选项A较少见，多出现在有头部外伤时；选项B常有血压突然升高而发病，头痛剧烈，病情加重；选项D常有发热。故排除A、B、D。因为颅内占位性病变，考虑颅内肿瘤；同时右肺第2肋间可见阴影，考虑是肺部肿瘤脑转移，所以考虑脑转移瘤，排除E，故选C。

因为颅内占位性病变（颅内肿瘤）是导致颅内压增高的原因，而手术是治疗颅内肿瘤最直接、最有效的方法，所以开颅病灶切除是解除颅内压增高的最有效措施。选项A是颅内高压处理的禁忌措施，选项B、D、E为保守治疗措施，不能去除病因，故选C。

18、D

【解析】若癌肿侵及Cooper韧带，可使其缩短而致癌肿表面皮肤凹陷，呈“酒窝征”。

若皮内和皮下淋巴管被癌细胞阻塞而引起淋巴回流障碍，出现真皮水肿，皮肤呈“橘皮样”改变。

19、D

【解析】该患者剧烈疼痛、大水疱等为浅Ⅱ。烧伤。面积为头面颈部9%、右上肢9%、右下肢包括右足、右小腿、右大腿20.5%、左膝关节以下10%、胸部一手掌1%共约50%。

20、A

【解析】骨折在胸、腰椎引起脊髓损伤，出现下肢瘫痪，称为截瘫；如颈髓损伤，双上肢也出现瘫痪，即为高位截瘫。

21、D

【解析】胫腓骨骨折可能伴发骨筋膜室综合征，因小腿周围筋膜致密，肌肉容易缺血。

22、B

【解析】前列腺增生最初的症状为尿频，最重要的症状为排尿困难。

23、E

【解析】不宜手术治疗的疾病是甲状腺未分化癌，未分化癌适用放射外照射治疗。

24、A

25、C

【解析】评定错误指由于测量者的主观愿望使项目取得预期效果，达到预定目标，而可能导致测试者在效果评价中有意无意地放松了对评价标准的掌握，而可能使项目效果偏离真实情况。该因素属于观察因素中的测量者因素。

26、E

【解析】冠状动脉搭桥术后血压监测，平均动脉压宜控制在70~90mmHg，并保持平稳，故C错误，A正确。动脉测压所测得的压力比袖带式间接测压更为精确，故B错误。动脉测压部位常经桡动脉插管测压，故D错误。收缩压<80mmHg或降至原先值的2/3属低血压，故E错误。

因为术后48小时内连续监测记录，每15分钟1次，平稳后改为每30分钟1次，故B错误。测压前要调试好各零点，要严格无菌操作，故A、C错误。咳嗽、呕吐、躁动及用力均会影响测压，应在安静10~15分钟后再测定，故D错误。

27、D

【解析】关节复位后固定有利于关节囊、韧带及周围软组织修复，一般固定2~3周方可达到效果，不可过早活动，以免出现习惯性脱位。但时间不可过长，以免引起关节僵硬。

28、C

【解析】影响健康传播的环境因素包括传播活动发生的自然环境和社会环境，传播活动的地点、场所、距离、光线、温度、环境布置等属于自然环境。

29、B

【解析】补液原则是先盐后糖、先晶后胶、先快后慢、尿畅补钾、液种交替。

30、D

31、D

32、A

33、E

34、E

【解析】吉兰-巴雷综合征发病第2周后，大多数患者脑脊液内蛋白增高而细胞数正常或接近正常，脑脊液蛋白质升高的机制普遍认为：①神经根脱髓鞘后，蛋白溢入脑脊液；②由于神经根的炎症，使脑脊液中蛋白回吸收障碍，而水分吸收相对较好，使蛋白浓缩；③机体的迟发性自身免疫反应中的球蛋白进入蛛网膜下腔。因免疫反应发生在周围神经的髓鞘，不在中枢神经内，故脑脊液细胞数不增加，称为蛋白-细胞分离现象，此现象为本病的特征。

35、E

【解析】胰头癌有明显黄疸病人由于胆汁不进入肠道，使脂溶性维生素K不能正常吸收，导致凝血酶原合成不足。因而，从入院起即应注射维生素K，直到手术。

36、E

37、D

38、A

39、C

【解析】引流管开口应高于侧脑室10~15cm；保持引流管通畅，不需定时冲洗；每日引流量不超过500ml；若引流管无脑脊液流出，应查明原因并处理。

40、C

【解析】失血性休克患者应及时给予补液输血，若不能及时输血，可首选平衡盐溶液。

41、E

42、E

【解析】疝块缺血坏死可引起明显的腹膜炎，出现腹膜刺激征。

43、C

44、A

【解析】过氧乙酸适用于耐腐蚀物品、环境、室内空气等的消毒。专用机械消毒设备适用于内镜的灭菌。稀释液应现用现配，使用时限≤48小时。

45、E

【解析】1. 0.5%碘伏可用于术前刷手。

2. 胃镜消毒需要用高水平消毒剂，戊二醛属于灭菌剂，适用于不耐热的医疗器械和精密仪器等消毒与灭菌，如内镜等。

3. 二溴海因可用于饮水消毒、医疗卫生单位环境消毒和诊疗用品消毒，餐(茶)具、果蔬等消毒。

4. 2%戊二醛对手术刀片等碳钢制品有腐蚀性，用于浸泡金属器械时需加亚硝酸钠防锈。

46、A

【解析】肾上腺髓质肿瘤主要分泌肾上腺素。

47、E

48、B

【解析】“知信行模式”构成要素包括知识-信念（态度）-行为。

49、E

【解析】高度危险物品必须用灭菌方法处理。中度危险物品可选用中水平或高水平消毒法，但是内镜，如胃镜、喉镜、气管镜应选用高水平消毒法；低度危险物品一般可用低水平消毒法。受到一般细菌和亲脂病毒等污染的物品，可选用中水平或低水平消毒法。

50、D

【解析】护士对患者进行“糖尿病对机体的危害”方面的教育是想改善患者的知识。护士对患者进行“如何进行血糖自我监测”方面的教育是想改善患者的技能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236223120050010201>