

2023-24 年浙江省《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库附参考答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

- A: 氨甲环酸
- B: 维生素 K1
- C: 尿激酶
- D: 低分子肝素

答案：B

2. （2020 年真题）关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用
- B: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药
- C: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快
- D: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

答案：A

3. 可引起巨幼红细胞性贫血的药物是（）

- A: 乙胺嘧啶
- B: 伯氨喹
- C: 甲氟喹
- D: 氯喹

答案：A

4. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时,合理的用法是 ()

- A: 一日一次,睡前使用
- B: 一日一次,晨起使用
- C: 一日一次,固定时间使用
- D: 一日二次,早晚使用

答案: A

5. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 赛洛唑啉
- B: 麻黄碱
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 羟甲唑啉

答案: D

6. 具有肾保护作用的降压药是

- A: 硝苯地平
- B: 缬沙坦
- C: 沙拉新
- D: 氢氯噻嗪

答案: B

7. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 酮康唑
- C: 特比萘芬
- D: 灰黄霉素

答案: A

8. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 克拉霉素
- B: 呋塞米
- C: 胺碘酮
- D: 硫酸镁

答案：C

9. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 特布他林
- B: 碘化钾
- C: 普萘洛尔
- D: 利多卡因

答案：C

10. 兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

- A: 保护胃黏膜
- B: 抑制 H
- C: 阻断 H
- D: 中和胃酸，升高胃内 pH

答案：B

11. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

- A: 促进女性性器官的发育成熟
- B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备
- C: 大剂量抑制卵巢排卵
- D: 抑制子宫平滑肌的收缩

答案：A

12. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 核糖体的 30S 亚基
- D: 细胞内膜 PBP

答案：B

13. 睾酮替代治疗的给药方式不包括

- A: 直肠给药
- B: 注射给药
- C: 透皮给药
- D: 肠道外给药

答案：A

14. （2015 年真题）治疗细菌性结膜炎宜选用（）。

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 左氧氟沙星滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

答案：B

15. 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是（）

- A: 头孢唑林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢呋辛
- D: 头孢米诺

答案：B

16. 与奥美拉唑-替硝唑三联治疗胃溃疡的是

- A: 克林霉素
- B: 罗红霉素
- C: 红霉素
- D: 克拉霉素

答案：D

17. 抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 莫沙必利
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 奥关拉唑

答案：D

18. 治疗轻度或中度原发性或肾性高血压宜选用

- A: 卡托普利
- B: 肼屈嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 硝苯地平

答案：A

19. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的药物是

- A: 氯喹
- B: 青蒿素
- C: 伯氨喹
- D: 奎宁

答案：B

20. 主要作用于远曲小管和集合管、直接阻止 Na^+ 通道而抑制 Na^+-K^+ 交换，伴有血钾升高的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 螺内酯
- C: 甘露醇
- D: 氨苯蝶啶

答案：D

21. 偶发失眠和暂时失眠可使用

- A: 苯巴比妥
- B: 卡马西平
- C: 地西洋
- D: 唑吡坦

答案：D

22. 下列属于二磷酸腺苷 P_2Y_{12} 受体阻断药的是()

- A: 氯吡格雷
- B: 阿替普酶
- C: 双嘧达莫
- D: 阿司匹林

答案：A

23. 早产儿、新生儿出血宜选用()

- A: 叶酸
- B: 肝素
- C: 维生素 K
- D: 尿激酶

答案：C

24. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 帕洛诺司琼
- C: 劳拉西泮
- D: 氯丙嗪

答案：C

25. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是 ()

- A: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用
- B: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂
- C: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用
- D: 可用于过敏性皮炎的治疗

答案：B

26. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 甲苯氢醌
- C: 氨甲环酸
- D: 酚磺乙胺

答案：D

27. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 克林霉素
- B: 甲硝唑
- C: 多黏菌素
- D: 呋喃妥因

答案：B

28. (2016 年真题) 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 维生素 B12
- B: 重组人促红素
- C: 人血白蛋白
- D: 硫酸亚铁

答案：B

29. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()

。

- A: 特比萘芬
- B: 伏立康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 氟胞嘧啶

答案：A

30. 在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

- A: 丙酸诺龙
- B: 鲨肝醇
- C: 小檗胺
- D: 维生素 B4

答案：B

31. 下列不可用于治疗前列腺增生的是

- A: 坦洛新
- B: 特拉唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 西地那非

答案：D

32. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

- A: 血钠
- B: 血氯
- C: 血氨
- D: 血钾

答案：C

33. （2021 年真题）属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物（）

- A: 吡拉西坦
- B: 多奈哌齐
- C: 尼莫地平
- D: 依达拉奉

答案：B

34. 链霉素属于

- A: 氨基糖苷类
- B: β -内酰胺类
- C: 酰胺醇类
- D: 四环素类

答案：A

35. 适用于心功能比较稳定的Ⅱ～Ⅲ级心力衰竭患者的药物是

- A: 卡维地洛
- B: 氯沙坦
- C: 维拉帕米
- D: 多巴酚丁胺

答案：A

36. 以下可作为缓解轻、中度急性哮喘症状首选药的是

- A: 特布他林
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 氨茶碱

答案：A

37. 易引起吉海反应的药物是()

- A: 诺氟沙星
- B: 四环素
- C: 庆大霉素
- D: 青霉素

答案：D

38. 氯吡格雷临床应用

- A: 缺铁性贫血
- B: 急性中性粒细胞减少症
- C: 缺血性脑卒中
- D: 失去药效

答案：C

39. 下列关于眼部细菌感染说法错误的是()

- A: 眼科术后引起细菌性眼内炎，可向眼内注射万古霉素
- B: 淋球菌性结膜炎采用眼局部抗菌药物治疗即可
- C: 急性期或严重的衣原体感染可口服阿奇霉素治疗
- D: 局部给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

答案：B

40. 洋地黄的主要适应症不包括

- A: 急、慢性充血性心力衰竭
- B: 心房扑动
- C: 房室传导阻滞
- D: 阵发性室上性心动过速

答案：C

41. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨苯蝶啶
- D: 阿米洛利

答案：B

42. 物质代谢过程中催化“一碳单位”转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 A
- C: 维生素
- D: 叶酸

答案：D

43.（2016 年真题）患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 餐后 1 小时
- B: 餐后半小时
- C: 餐时
- D: 餐前半小时

答案：C

44. 以下药物肾结石患者禁用的是

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 非布司他
- D: 别嘌醇

答案：B

45.（2016 年真题）那于 GLP-1 受体激动剂的是

- A: 那格列奈
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 艾塞那肽

答案：D

46. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 依诺肝素
- B: 普伐他汀
- C: 拉西地平

D: 普萘洛尔

答案: A

47. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是()

A: 甘露醇

B: 毛果芸香碱

C: 噻吗洛尔

D: 曲伏前列素

答案: B

48. 患者，男，58 岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为 2 型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

A: 格列齐特

B: 格列美脲

C: 格列本脲

D: 格列喹酮

答案: C

49. 某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

A: 中午 12 时左右

B: 上午 8 时左右

C: 下午 4 时左右

D: 空腹

答案: B

50. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是()

- A: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- B: 属于蒽环类抗肿瘤药物
- C: 典型不良反应为骨髓抑制和心脏毒性
- D: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用

答案：A

51. 对 α 和 β 受体均有阻断作用的药物是

- A: 去甲肾上腺素
- B: 酚妥拉明
- C: 普萘洛尔
- D: 拉贝洛尔

答案：D

52. 促使脓性痰中 DNA 分解，使脓痰黏度下降的药物是

- A: 氨溴索
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 表面活性剂
- D: 糜蛋白酶

答案：D

53. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

- A: 碳酸钙
- B: 碳酸氢钠
- C: 维生素 C

D: 维生素 B

答案：B

54. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

A: 奥布卡因

B: 羟苄唑

C: 20%甘露醇

D: 阿托品

答案：D

55. 甲睾酮的作用不包括哪一项()

A: 抗雌激素作用

B: 抑制蛋白质的合成

C: 促进男性性器官的发育与成熟

D: 抑制腺垂体分泌促性腺激素

答案：B

56. 有减轻体重作用的口服降糖药是

A: 吡格列酮

B: 那格列奈

C: 格列苯脲

D: 达格列净

答案：D

57. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

A: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药 3 周后停药 1 周

B: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应

C: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周

D: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素

答案: D

58. 正常成人一次口服 20mg / kg，1 小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为 2 小时，连续服药 7 日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出 8%~16%，随粪便排出 82%~94%的是

A: 唑来膦酸

B: 依替膦酸二钠

C: 帕米膦酸二钠

D: 阿仑膦酸钠

答案: B

59. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

A: 红霉素

B: 克拉霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案: A

60. 下述不属于胃黏膜保护剂的是

A: 谷氨酰胺

B: 硫糖铝

C: 前列腺素

D: 枸橼酸铋钾

答案: A

61. 常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

- A: 地诺前列酮
- B: 缩宫素
- C: 普拉睾酮
- D: 麦角新碱

答案：B

62. 可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 庆大霉素
- C: 替加环素
- D: 环丙沙星

答案：B

63. 糖皮质激素的抗炎作用是

- A: 提高中枢神经系统的兴奋性
- B: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- C: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：C

64. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 地尔硫革
- B: 美西律
- C: 胺碘酮
- D: 普萘洛尔

答案：D

65. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 增加肾毒性
- B: 增加锥体外系不良反应的风险
- C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：B

66. 甲氧苄啶联用环孢素使

- A: 抗凝作用增强
- B: 半衰期缩短
- C: 肾毒性增加
- D: 白细胞减少风险增加

答案：C

67. 属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是()

- A: 噻吗洛尔
- B: 曲伏前列素
- C: 毛果芸香碱
- D: 甘露醇

答案：A

68. (2015 年真题) 不易导致便秘或腹泻不良反应的抗酸药是 ()。

- A: 铝碳酸镁
- B: 三硅酸镁
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化铝

答案：A

69. 通过将身体的水分吸到肠道或防止大便巾的水分被吸收来增加肠道中的水分来发挥致泻作用的是

- A: 乳果糖
- B: 酚酞
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 甘油

答案：A

70. 下列哪种药物长期使用将引起药物性鼻炎()

- A: 糖皮质激素
- B: 减鼻充血药
- C: 肥大细胞膜稳定剂
- D: 抗组胺药

答案：B

71. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 整合素受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- D: 环氧酶抑制剂

答案：D

72. 双炔失碳酯()

- A: 抗着床
- B: 抑制排卵作用
- C: 减少精子数目
- D: 促进蛋白质合成

答案：A

73. 双香豆素与阿司匹林合用可

- A: 产生协同作用
- B: 竞争性对抗
- C: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- D: 与其竞争结合血浆蛋白

答案：A

74. 催产和引产不适用麦角新碱的原因是

- A: 抑制胎儿呼吸
- B: 维持时间短
- C: 孕妇血压升高
- D: 子宫强直性收缩

答案：D

75. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠
- D: 奎尼丁

答案：A

76. 无孕激素活性具有抗着床作用的避孕药是

- A: 双炔失碳酯
- B: 戈那瑞林
- C: 绒促性素
- D: 溴隐亭

答案：A

77. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

- A: 15 倍
- B: 25 倍
- C: 100 倍
- D: 40 倍

答案：C

78. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

- A: 应在绝经后 6 年之内开始
- B: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定
- C: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险
- D: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

答案：D

79. （2017 年真题）治疗青光眼宜选用（）

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 碘苷滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂
- D: 托吡卡胺滴眼剂

答案：A

80. 阿奇霉素（）

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

C: 肾毒性较大

D: 用于非典型致病原感染

答案: D

81. 有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

A: 选择性 COX-2 抑制剂

B: 芳基乙酸类

C: 芳基丙酸类

D: 水杨酸类

答案: D

82. 可乐定的降压机制是()

A: 扩张血管

B: 激动外周 α

C: 影响 NA 释放

D: 激动中枢突触后膜和外周突触前膜的 α

答案: D

83. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是

A: 氨苯蝶啶

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案: A

84. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 中枢神经系统毒性

B: 肝脏损害

C: 白细胞减少

D: 眼部水肿

答案：A

85. 治疗蛲虫病的首选药是()。

A: 噻嘧啶

B: 甲硝唑

C: 吡喹酮

D: 阿苯达唑

答案：D

86. 重度阻滞 Na⁺通道的药物是

A: 普罗帕酮

B: 普萘洛尔

C: 普鲁卡因胺

D: 利多卡因

答案：A

87. 治疗银屑病药主要作用不包括

A: 作用于皮肤表皮细胞

B: 促进细胞有丝分裂

C: 改善表皮细胞增殖速率

D: 恢复其正常分化状态

答案：B

88. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

A: 哌拉西林

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 阿莫西林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/237045103056010024>