## 危重患者的抢救、诊疗与护理

## 一、选择题

A.病情危重√

1. 危重症患者的特点()[多选题]\*

| B.随时有生命危险√                     |
|--------------------------------|
| C.病情变化突然、紧急√                   |
| D.抢救治疗措施多,需立即实施 <mark>√</mark> |
| E.病情稳定                         |
| 2. 抢救原则()[多选题] *               |
| A.就地抢救✓                        |
| B.及时搬动                         |
| C.就近原则✓                        |
| D.先救命后治病✓                      |
| 3. 急救时护士应具备的素质()[多选题]*         |
| A.良好的服务态度✓                     |
| B.有较强的急救护理意识√                  |
| C.良好的心理素质√                     |
| D.有效的反应速度和反应质量√                |
| 4. 当患者出现生命危险,医生未到前,护士应()[多选题]* |
| A.吸氧 <b>√</b>                  |

B.吸痰√ C.测量生命体征√ D.建立静脉通道V E.心外按压√ F.除颤 G.抽血 5. 工作人员必须熟练掌握各种器械、仪器的性能及使用方法和各种抢救技术操作技术,严密观察病情, 准确及时记录()[多选题]\* A.用药剂量√ B.给药方法√ C.病人情况√ 6. 抢救病人时对护士的要求()[多选题]\* A.了解病人的病情√ B.护士要沉着冷静准确,头脑清楚反应敏捷√ C.维持抢救现场秩序\ D.熟悉抢救物品,抢救车必须第一时间到位√ E.立即搬运 7. 口头医嘱执行流程哪项是正确的() [单选题]\* A.认真聆听→准确记录→大声复述→确认无误→立即执行→补开医嘱V B.认真聆听→大声复述→准确记录→确认无误→立即执行→补开医嘱 C.认真聆听→大声复述→确认无误→准确记录→立即执行→嘱补开医 D.认真聆听→大声复述→确认无误→准确记录→立即执行→补开医嘱

| 8. 定位抢救的特点包括()[多选题]*      |
|---------------------------|
| A.经过专业的抢救培训√              |
| B.分工明确 <mark>√</mark>     |
| C.强调团队协作✓                 |
| D.位置固定√                   |
| E.统一、有序开展抢救工作 <b>√</b>    |
| 9. 一人抢救法的操作正确的是() [多选题]*  |
| A.必要时实施心肺复苏 <b>√</b>      |
| B.及时回护士站呼叫帮助              |
| C.要求沉着冷静灵活应变√             |
| D.先处理致命性因素√               |
| 10. 抢救结束后() [多选题] *       |
| A.做好抢救记录✓                 |
| B.药品清理√                   |
| C.器械清理消毒√                 |
| D.及时补充抢救车药品物品V            |
| 11. 抢救车管理"五定"不包括() [单选题]* |
| A.定班次管理 <mark>√</mark>    |
| B.定点放置                    |
| C.定数量品种                   |
| D.定期消毒灭菌                  |
| E.定期检查维护                  |

| 12. 呼吸机不能正常工作时处理措施正确的是(     |
|-----------------------------|
| A.立即停用呼吸机,用简易呼吸器替代 <b>√</b> |
| B.应给鼻导管给氧                   |
| C.通知值班医生√                   |
| D.通知有关部门,调配呼吸机√             |
| 13. 立即解除危及生命的情况不包括 [单选题]    |
| A 立即开放气道                    |
| B 保持气道通畅                    |
| C心肺复苏                       |
| D 立即对外表能控制的大出血进行止血          |
| E 对发热者进行物理和药物退热√            |
| 14. 休克的要害问题是 [单选题] *        |
| A 血压下降                      |
| B 心率增快                      |
| C 尿量减少                      |
| D低温                         |
| E 组织灌注不足与缺氧√                |
| 15. 使用人工呼吸器的适应证()[多选题]*     |
| A 呼吸停止√                     |
| B 呼吸肌疲劳√                    |
| C呼吸频率过快                     |
| D 呼吸中枢衰竭√                   |

) [多选题] \*

16. 危重病人进行 ECG 监护时应注意:[多选题]\* A 尽可能减少活动√ B 正确确定电极位置√ C 安置电极时彻底清洁该处皮肤√ D 电极放于肌肉丰富的地方√ 17. 危重患者的特点 \*[多选题] \* A 病情变化突然、紧急√ B 病情危重,随时有生命危险√ C 抢救治疗措施较多,需立即实施√ 18. 危重患者抢救工作中哪种做法是错误的 [单选题] \* A 接诊医生发现病人病情危重立即抢救并报告上级医生 B 抢救执行口头医嘱时护士必须复述无误后方可执行 C不宜搬动的急危重病人应先就地抢救 D 急用的空安剖输液输血袋应及时清理V 19. 发现心脏骤停患者应首选 [单选题] \* A 心肺复苏术√ B 先行 12 导心电图检查 C建立静脉通道 D立即电除颤 20. 快速性心律失常哪一种表现不属于血流动力学不稳定的情况 [单选题] \* A 神志改变 B 心悸√

C进行性胸痛 D低血压 E 休克 21. 休克时监测尿量的目的是了解 [单选题] \* A 肾皮质功能 B 血压 C心功能 D气管血流灌注√ E酸中毒 22. 哪种情况提示血容量未补足 [单选题] \* A 四肢末端由湿冷青紫转为温暖红润 B 脉搏由快弱转为正常有力 C 尿量大于 30ml/h D 中心静脉压 2-4cmH2O√ 23. 严重过敏反应的紧急处理不包括 [单选题] \* A 立即在现场开展抢救√ B 保持气道通畅 C 大流量吸氧,保持血样饱和度 95%以上 D 建立静脉通道,积极进行液体复苏 24. 抢救原则包括: [多选题] \* A 就地抢救√ B 先救命,后治病√

| C 先治病,后救命                                       |
|---|
| D 先使用抗生素  |
| 25. 高级生命支持(ALS)包括:[多选题] *                       |
| A 氧疗√   |
| B 呼吸支持✓   |
| C 循环支持√   |
| D 药物支持√   |
| 26. 对病情变化、抢救经过、各种用药等,应详细、及时正确记录,因抢救患者未能及时书写相关医疗 |
| 文书的,有关人员应当在抢救结束后()小时内补记,并加以注明。 [单选题]*           |
| A.6 <mark>√</mark>                              |
| B.3   |
| C.半   |
| D.1   |
| 27. 高效抢救的要求包括() *[多选题] *                        |
| A.抢救物品的良好备用状态√                                  |
| B.熟悉抢救流程、物品存放位置√                                |
| C.过硬的操作技能√                                      |
| D.掌握抢救仪器、物品、药物使用 <mark>√</mark>                 |
| E.医护间的良好合作、分工明确 <mark>√</mark>                  |
| 28. 生理性的心率过快见于: [单选题]                           |
| A 高热  |
| B 妊娠√   |

| C缺氧                                     |
|---|
| D感染                                     |
| 29. 病情观察的内容包括:[多选题]*                    |
| A 一般情况的观察√                              |
| B 生命体征✓                                 |
| C意识∖瞳孔√                                 |
| D 尿量 <b>√</b>                           |
| 30. 急性心肌梗死早期(24 小时内)的死亡原因主要是:() [单选题] * |
| A.心源性休克                                 |
| B.心律失常√                                 |
| C.心力衰竭                                  |
| D.心脏破裂                                  |
| E.心肌梗死后心绞痛                              |
| 31. 提示昏迷程度加重的是:() [单选题] *               |
| A.双侧对称性浅反射减弱                            |
| B.深反射亢进或消失                              |
| C.双侧腱反射不对称                              |
| D.出现病理反射                                |
| E.浅反射由减弱到消失 <del>V</del>                |
| 32. 反映早期休克比较敏感的指标是:() [单选题] *           |
| A.血压                                    |
| B.脉搏 <b>√</b>                           |

| C.皮肤温度                               |
|--------------------------------------|
| D.意识                                 |
| E.尿量                                 |
| 33. 急性心肌梗死急性期要慎用洋地黄的原因是:() [单选题] *   |
| A.减慢心率                               |
| B.降低血压使组织灌注不足                        |
| C.加重肺淤血,使缺氧更明                        |
| D.增加心肌耗氧,加重心肌缺氧√                     |
| E.增加心室壁张力,使心肌收缩力增加                   |
| 34. 一氧化碳中毒患者发生昏迷应尽早给予:() [单选题] *     |
| A.高压氧治疗✓                             |
| B.高流量氧治疗                             |
| C.鼻导管吸氧                              |
| D.脱水降颅内压                             |
| E.盐皮质激素                              |
| 35. 下列哪种药物较适用于癫痫持续状态:() [单选题] *      |
| A.巴比妥                                |
| B.阿米妥                                |
| C.苯妥英钠                               |
| D.三聚乙醛                               |
| E.安定 <mark>√</mark>                  |
| 36. 烧伤患者在早期口渴,最适合饮用下列哪种液体:() [单选题] * |
|                                      |

| A.大量冷开水                        |
|--------------------------------|
| B.大量糖水                         |
| C.少量多次饮盐水√                     |
| D.大量茶水                         |
| E.大量橘子水                        |
| 37. 符合浅昏迷临床表现是:() [单选题]*       |
| A.对疼痛刺激有反应√                    |
| B.可以唤醒                         |
| C.无意识的自主运动消失                   |
| D.四肢腱反射消失                      |
| E.定向力障碍                        |
| 38. 诊断有机磷中毒最重要的指标为:() [单选题] *  |
| A.确切的接触史                       |
| B.毒蕈碱样和烟碱样症状√                  |
| C.右眼鼻侧盲                        |
| D.左眼鼻侧盲                        |
| E.双眼颞侧盲                        |
| 39. 严重创伤性休克后,首先应预防的是:() [单选题]* |
| A.感染 <b>√</b>                  |
| B.输血并发症                        |
| C.急性心力衰竭                       |
| D.急性呼吸 <b>窘</b> 迫综合征           |

| 40. 休克病人的最佳体位是:() [单选题]*         |
|----------------------------------|
| A.头高足低位                          |
| B 头低足高位                          |
| C 头和腿部各抬高 30 度√                  |
| D 侧卧位                            |
| 41. 阿托品的禁忌症是:() [单选题] *          |
| A.感染性休克                          |
| B.胃肠绞痛                           |
| C.前列腺肥大✓                         |
| D.胆绞痛                            |
| 42. 开放性气胸的现场急救为:() [单选题] *       |
| A.立即给氧                           |
| B.胸膜腔穿刺抽气                        |
| C.清创术                            |
| D 立即用清洁物品封闭伤口√                   |
| 43. 休克患者血压低,中心静脉压低提示() [单选题]*    |
| A.血容量严重不足 <mark>√</mark>         |
| B.严重酸中毒                          |
| C.容量血管过度收缩                       |
| D.心功能不全                          |
| 44. 判断胸外心脏按压有效最简便可靠的方是() [单选题] * |
| A 触及颈动脉✓                         |

| B触及桡动脉                            |
|-----------------------------------|
| C观察尿量变化                           |
| D 观察神志                            |
| 45. 治疗脑水肿的首选药是() [单选题]*           |
| A.甘露醇 <b>√</b>                    |
| B.螺内酯                             |
| C.呋塞米                             |
| D.氯噻嗪                             |
| E.氢氯噻嗪                            |
| 46. 用于心肺复苏的药物中,目前首选的仍然是() [单选题]*  |
| A、肾上腺素 <b>√</b>                   |
| B、利多卡因                            |
| C、阿托品                             |
| D、碳酸氢钠                            |
| E、苯妥因钠                            |
| 47. 室颤最有效的治疗方法是() [单选题]*          |
| A、利多卡因静脉注射                        |
| B、胸外心脏按压                          |
| C、开胸心脏按压                          |
| D、直流电击除颤✓                         |
| E、人工心脏起搏                          |
| 48. 实施电击除颤时,成人首次单相波除颤能量为() [单选题]* |
|                                   |

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如 要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/23710010606">https://d.book118.com/23710010606</a> 6006041