

2025 年执业药师之西药学综合知识与技能考试题库

单选题（共 50 题）

1、粪外观所对应的疾病，霍乱

- A. 米泔水样
- B. 暗红果酱色
- C. 白陶土便
- D. 柏油便，黑色有光泽
- E. 细条便

【答案】 A

2、对于形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对药品调配环节防范措施中的

- A. 及时沟通
- B. 保证足够的人力配备
- C. 环境整齐、安静
- D. 规范操作、坚持核对
- E. 掌握选择正确药物的知识与信息

【答案】 C

3、人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

- A. 平喘药
- B. 抗过敏药

C. 抗抑郁药

D. 调节血脂药

E. 长效 β 受体拮抗剂

【答案】 C

4、患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3~5min，休息后减轻。入院检查：体温37.8℃，心率130次/分，血压80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A. 发作时可含服作用较快的硝酸酯制剂，首次服用硝酸甘油时，应注意可能发生直立性低血压

B. 阿司匹林是常用药，主要不良反应为胃肠道出血或阿司匹林过敏

C. 稳定性心绞痛患者，合并高血压、糖尿病、心力衰竭的患者可选用卡托普利、依那普利等药物

D. 他汀类药物能有效降低TC和LDLC，其主要不良反应是头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等

E. 地尔硫革和维拉帕米不能应用于已有严重心动过缓、高度房室传导阻滞和病态窦房结综合征的患者

【答案】 D

5、提示“胰酶肠溶胶囊不宜嚼碎服用，以免药粉残留口腔内、发生溃疡，是针对

A. 交代药物的用量

B. 交代用药注意事项

C. 交代用药途径及用药方法

D. 交代药品贮存条件与方法

E. 交代多药合用服药的间隔时间

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

【答案】 C

6、下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是

- A. 新癬片联用吲哚美辛胶囊
- B. 曲克芦丁片联用维生素 C 片
- C. 鼻炎康片联用马来酸氯苯那敏片
- D. 消渴丸联用格列本脲片
- E. 妇科十味片联用碳酸钙片

【答案】 B

7、（2018 年真题）过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用（ ）

- A. 色甘酸钠滴眼液
- B. 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C. 玻璃酸钠滴眼液
- D. 氧氟沙星滴眼液
- E. 碘苷滴眼液

【答案】 A

8、以下药物中，可影响华法林吸收的为（ ）

- A. 奥美拉唑
- B. 雷尼替丁
- C. 硫酸铝
- D. 胶体果胶铋
- E. 伊托必利

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

【答案】 C

9、急诊处方印刷用纸的颜色是

- A. 淡红色
- B. 淡绿色
- C. 淡蓝色
- D. 淡黄色
- E. 白色

【答案】 D

10、处方中“餐后给药”的外文缩写是

- A. ac
- B. pc
- C. po
- D. qn
- E. prn

【答案】 B

11、关于现代药学的发展,以药品供应为中心阶段的特征是

- A. 以促进合理用药为主
- B. 以药品工业化生产为中心
- C. 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作
- D. 以新药研制为中心
- E. 以患者为中心。强调改善患者生命质量

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

【答案】 C

12、口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

- A. 瘦肉精中毒
- B. 异烟肼中毒
- C. 麦角胺中毒
- D. 亚硝酸盐中毒
- E. 拟除虫菊酯类农药中毒

【答案】 A

13、急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶开始升高

- A. 1
- B. 2~12
- C. 12~72
- D. 48~72
- E. 72~96

【答案】 B

14、对医师处方的规范性和适宜性进行监测，对发现的问题与医师沟通，及时调整用药方案的过程，属于

- A. 药物重整
- B. 药学干预
- C. 个体化药物治疗
- D. 药物治疗管理

E. 健康教育

【答案】 B

15、某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP 190/110mmHg，R 30次/分，Bp 108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A. 慢性支气管炎急性发作

B. 支气管哮喘

C. 急性左心衰竭

D. 肺动脉栓塞

E. 慢性肺源性心脏病

【答案】 C

16、（2017年真题）与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是（ ）

A. 维A酸片

B. 左旋多巴片

C. 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

D. 非洛地平片

E. 去氨加压素片

【答案】 D

17、重度中毒可发生中毒性肝炎，出现黄疸、出血及肝功能异常属于下列哪类药物中毒

A. 阿米替林

B. 氯米帕明

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

C. 巴比妥类

D. 苯妥英钠

E. 卡马西平

【答案】 C

18、用于治疗苯二氮类药物中毒的特殊解毒剂是（ ）

A. 氟马西尼

B. 二巯丁二钠

C. 乙酰胺

D. 纳洛酮

E. 亚硝酸钠

【答案】 A

19、药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价 患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒，立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再服用阿莫西林。该 ADR 的因果关系评价结果是

A. 肯定

B. 很可能

C. 可能

D. 可能无关

E. 无法评价

【答案】 B

20、氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等抗肿瘤治疗应该禁用的是

- A. 酒
- B. 食盐
- C. 食醋
- D. 脂肪
- E. 蛋白质

【答案】 A

21、（2016 年真题）患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为（ ）。

- A. 加大丙硫氧嘧啶用量
- B. 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- C. 换用另一种抗甲状腺药物
- D. 放射性 ^{131}I 治疗
- E. 手术治疗

【答案】 B

22、可致体重增加的抗癫痫药为（ ）

- A. 左乙拉西坦
- B. 苯妥英钠
- C. 丙戊酸钠
- D. 苯巴比妥
- E. 拉莫三嗪

【答案】 C

23、患者，女，38岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力2日；查体：神清、稍
有气促，心率95次/分，律齐，体温39.1℃，血压110/70mmHg；心肺听诊：
双肺呼吸音粗，未闻及明显啰音；发病以来纳差、精神欠佳、二便可、睡眠可。
诊断：急性上呼吸道感染。

- A. 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多的咳嗽应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果
- B. 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，以缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰
- C. 镇咳药连续口服1周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素
- D. 右美沙芬可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用
- E. 伴有青光眼者、肺部淤血的咳嗽患者、心功能不全者及妊娠与哺乳期妇女应慎用喷托维林

【答案】 C

24、糖尿病合并肾病者首选

- A. 二甲双胍
- B. 阿卡波糖
- C. 比格列酮
- D. 格列喹酮
- E. 胰岛素

【答案】 D

25、长期服用避孕药

- A. 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B. 可导致驾驶员多尿或多汗
- C. 可使驾驶员出现定向力障碍

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

- D. 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- E. 可引起驾驶员嗜睡

【答案】 C

26、具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是

- A. 普通胰岛素
- B. 低精蛋白锌胰岛素
- C. 预混胰岛素
- D. 甘精胰岛素
- E. 精蛋白锌胰岛素

【答案】 D

27、患者，男，33岁。中度哮喘急性发作，宜选用的药物是

- A. 短效 β_2 受体激动剂
- B. 白三烯受体阻断剂
- C. β_2 受体阻断剂
- D. 糖皮质激素
- E. 短效抗胆碱药

【答案】 A

28、患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是

- A. 复方苯甲酸软膏
- B. 氢化可的松乳膏
- C. 联苯苄唑乳膏

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- D. 酮康唑乳膏
- E. 特比萘芬乳膏

【答案】 B

29、属于苯二氮革类药物的是

- A. 艾司唑仑
- B. 丁螺环酮
- C. 阿米替林
- D. 舍曲林
- E. 度洛西汀

【答案】 A

30、主要检查性状一致、色泽均匀、片面光滑、无毛糙起孔现象的是

- A. 片剂
- B. 胶囊剂
- C. 糖浆剂
- D. 软膏剂
- E. 颗粒剂

【答案】 A

31、审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性

- A. 处方审核
- B. 处方点评
- C. 静脉药物配置

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

- D. 治疗药物监测
- E. 药物利用研究和评价

【答案】 A

32、患者,男,53岁,因纳差、食欲减退来药店购药,药师应推荐的药品是()

- A. 多潘立酮片
- B. 酵母片
- C. 乳酶生片
- D. 甲氧氯普胺片
- E. 铝碳酸镁咀嚼片

【答案】 B

33、服后不宜立刻饮水,以免冲淡药物

- A. 粉剂
- B. 糖浆剂
- C. 胶囊剂
- D. 包衣片
- E. 缓控释片(胶囊)

【答案】 B

34、超常处方

- A. 无适应证用药
- B. 黄连素用于细菌性腹泻
- C. 二甲双胍用于糖尿病患者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237143111006010025>