

2024 年执业药师之西药学综合知识与技能通关试题 库(有答案)

单选题（共 45 题）

1、发病急剧，常累及双眼（或间隔1~2天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 流行性结膜炎
- C. 流行性出血性结膜炎
- D. 过敏性结膜炎
- E. 春季卡他性结膜炎

【答案】 A

2、某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A. 首选针对革兰氏阳性菌的药物
- B. 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- C. 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
- D. 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
- E. 为病人留取标本后，尽快开始经验性治疗

【答案】 A

3、服药期间进食高脂肪可促进吸收的药品是

- A. 格列本脲
- B. 硫酸亚铁

- C. 维生素
- D. 西咪替丁
- E. 左旋多巴

【答案】 C

4、患者，女性，25岁，因面色苍白、头晕、乏力1年余，加重伴心悸1个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

- A. 葡萄糖酸亚铁
- B. 右旋糖酐铁
- C. 叶酸
- D. 琥珀酸亚铁
- E. 乳酸亚铁

【答案】 C

5、醛固酮受体拮抗剂螺内酯久用引起的主要不良反应是

- A. 水肿
- B. 多毛症
- C. 低钾血症
- D. 高钾血症
- E. 狼疮综合征

【答案】 D

6、患者，女，26岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶450mg/d治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

- A. 红细胞

- B. 血红蛋白
- C. 白细胞
- D. 嗜酸粒细胞
- E. 血小板

【答案】 C

7、以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛者的首选处方药是

- A. 苯噻啶
- B. 地西洋
- C. 卡马西平
- D. 舒马曲坦
- E. 麦角胺咖啡因

【答案】 C

8、饮茶可减少其吸收的药物是

- A. 阿仑膦酸钠
- B. 去氨加压素
- C. 硫酸亚铁
- D. 阿莫西林
- E. 辛伐他汀

【答案】 C

9、单核细胞正常参考区间是

- A. 0~0.01

B. 0.005~0.05

C. 0.03~0.08

D. 0.20~0.40

E. 0.50~0.70

【答案】 C

10、（2019年真题）正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

A. X级

B. A级

C. C级

D. B级

E. D级

【答案】 B

11、为解热或镇痛，有心功能不全史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

A. 过敏反应

B. 重度肝损伤

C. 急性肾衰竭

D. 尿潴留和水肿

E. 电解质平衡失调

【答案】 D

12、患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高160cm，体重70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

- A. 胰岛素增敏剂
- B. 促胰岛素分泌剂
- C. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 双胍类
- E. 二肽基肽酶-4 抑制剂

【答案】 D

13、可用于不明毒物中毒、与其形成腐蚀性较小化合物的洗胃液是

- A. 鸡蛋白
- B. 药用炭混悬液
- C. 1%氯化钠溶液
- D. 3%~5%鞣酸溶液
- E. 1: 5000 高锰酸钾溶液

【答案】 C

14、下列不属于痛风的非药物治疗方法的是

- A. 禁酒
- B. 多饮水，每日保持尿量 2~3L
- C. 运动治疗
- D. 保持理想体重
- E. 增加碱性食物的摄入，维持尿液 pH6.5

【答案】 C

15、患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L、甘油三酯1.52mmol/L(正常参考区间0.56~1.70mmol/L)、总胆固醇6.26mmol/L(正常参考区间<5.2mmol/L)、低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L(正常参考区间2.1~3.1mmol/L)、高密度脂蛋白胆固醇1.2mmol/L(正常参考区间1.2~1.65mmol/L)、血肌酐50μmol/L(正常参考区间45~84μmol/L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A. 氢氯噻嗪
- B. 复方利血平
- C. 依那普利
- D. 特拉唑嗪
- E. 螺内酯

【答案】 C

16、(2021年真题)影响药物治疗有效性的因素不包括()

- A. 给药途径
- B. 药品价格
- C. 药物相互作用
- D. 患者的生理状态
- E. 给药时间

【答案】 B

17、牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

- A. 多奈哌齐
- B. 可待因
- C. 吗啡

D. 阿司匹林

E. 纳洛酮

【答案】 D

18、属于妊娠 C 级毒性药品的是

A. 水溶性维生素

B. 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

C. 氧氟沙星

D. 辛伐他汀

E. 缬沙坦-氨氯地平

【答案】 C

19、就餐时随第一、二口食物给药的是

A. 胰岛素

B. 瑞格列奈

C. 二甲双胍

D. 阿卡波糖

E. 氯磺丙脲

【答案】 D

20、易引起心动过缓的药物

A. 阿霉素

B. 环磷酰胺

C. 氟尿嘧啶

- D. 紫杉醇
- E. 多西紫杉醇

【答案】 D

21、痛风患者发作间歇期应使用苯溴马隆或者丙磺舒，以阻止肾小管对尿酸盐的重吸收。

- A. 促进尿酸排泄
- B. 抑制尿酸生成
- C. 抑制粒细胞浸润
- D. 抑制前列腺素合成
- E. 促进尿酸结晶分解

【答案】 A

22、白细胞分类中，嗜酸性粒细胞参考范围为

- A. 1%~5%
- B. 50%~70%
- C. 20%~40%
- D. 3%~8%
- E. 0~1%

【答案】 A

23、非磺酰脲类促胰岛素分泌剂

- A. 罗格列酮
- B. 伏格列波糖

- C. 瑞格列奈
- D. 格列吡嗪
- E. 西格列汀

【答案】 C

24、长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

- A. 匹伐他汀
- B. 铝碳酸镁
- C. 多奈哌齐
- D. 美金刚
- E. 美托洛尔

【答案】 C

25、具有降低 TC、LDL-C 和 TG，升高 HDL-C 的作用的是（ ）

- A. 他汀类
- B. 普罗布考
- C. 烟酸类
- D. 依折麦布
- E. 胆酸螯合剂

【答案】 C

26、“助消化药不宜与抗菌药物、吸附剂同时服用”；如必须联用，应间隔的时间是

- A. 0.5 小时

- B. 1 小时
- C. 1.5 小时
- D. 2~3 小时
- E. 1~3 小时

【答案】 D

27、患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A. 硝苯地平
- B. 毛花苷丙
- C. 多索茶碱
- D. 硝普钠
- E. 胺碘酮

【答案】 B

28、（2021 年真题）避免与辛伐他汀合用的药物是（ ）

- A. 头孢哌酮
- B. 万古霉素
- C. 美罗培南
- D. 克拉霉素
- E. 左氧氟沙星

【答案】 D

29、严重肝损害和肾损害患者禁用的增强认知功能药物为（ ）

- A. 多奈哌齐
- B. 卡巴拉汀
- C. 苯海索
- D. 加兰他敏
- E. 美金刚

【答案】 D

30、下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的叙述错误的是

- A. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SS-RIs)可引起戒断反应
- B. 抗抑郁药尽量单一用药，不主张联用两种以上的抗抑郁药
- C. 难治性抑郁症可尝试合用抗抑郁药和情感稳定剂或与非典型抗精神病药合用
- D. 抗抑郁药起效较快，因此使用 2 周后即可判定疗效
- E. 抗抑郁药足量、足疗程单一用药无效时，可合用两种药物，但应注意选择作用机制不同的药物

【答案】 D

31、预混胰岛素 30R 的组成为()

- A. 30%中效胰岛素，70%短效胰岛素
- B. 70%中效胰岛素，30%短效胰岛素
- C. 30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素
- D. 70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素
- E. 30%中效胰岛素，70%长效胰岛素

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238005127064006130>