

专业实践能力

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 急性心肌梗死发生在以下哪个部位时最易合并窦性心动过缓
 - A. 前间壁心肌梗死
 - B. 局限前壁肌梗死
 - C. 下壁肌梗死
 - D. 左心房肌梗死
 - B. 广泛前壁肌梗死
2. 关于感染性心内膜炎的 Duke 诊断标准，以下描述不正确的是
 - A. 两次血培养阳性且病原菌一致
 - B. 超声心动图发现赘生物，或新的瓣膜关闭不全
 - C. X 线检查肺部可见 Kerley-B 线
 - D. 发热，体温大于 38℃

E. aneway 损害或 Roth 斑

3. 关于溶栓后出现的再灌注性心律失常，以下判断冠状动脉是否再通最敏感的是

A. 加速性室性自主心律

B. 室性心动过速

C. 房性期前收缩

D. 房室传导阻滞

E. 心房纤颤

4. 原发性高血压和肾性高血压的区别要点是

A. 有无蛋白尿

B. 有无肾功能不全

C. 心肌肥厚程度

D. 高血压的程度

E. 有无明显贫血

5. 关于室性心动过速的心电图及临床特点，以下描述不正确的是

A. QRS 波前后均无相关的 P 波

B. 第一心音强弱不等

C. QRS 波宽度 <0.12 秒

D. 听诊心律可轻度不规则

E. 迷走神经刺激不能终止心动过速

6. 以下各项体征可以用来鉴别右心衰竭与肝硬化的的是

A. 双下肢可凹性水肿

B. 肝颈静脉反流征阳性

C. 肝大

D. 脾大

E. 腹水

7. 洋地黄中毒最常见的心电图表现是

A. Q-T 间期缩短

B. ST-T 呈现鱼钩样改变

C. 窦性心动过缓

D. 室性期前收缩二联律

E. 房室传导阻滞

8. 超声心动图下自体瓣膜性心内膜炎最典型的表现是

A. 瓣叶增厚

B. 瓣膜上有赘生物

C. 主动脉细菌性动脉瘤

D. 心包积液

E. 瓣膜关闭不全

9. 下列关于完全性左束支传导阻滞的心电图特点，不正确的是.

A. T 波与 QRS 主波方向相同

B. $V_{1\sim 2}$ 导联呈宽阔的 QS 波或 rS 波形

C. $V_{5\sim 6}$ 导联无 q 波

D. QRS 时限 ≥ 0.12 秒

E. V_5 、 V_6 导联 R 波宽大

10. 以下疾病不宜使用洋地黄类药物的是

A. 二尖瓣狭窄伴快速心房纤颤

B. 阵发性室上性心动过速

C. 急性左心衰竭

D. 扩张型心肌病全心衰竭

E. 肥厚梗阻型心肌病

11. 下列不引起窦性心动过缓的药物是

A. 美托洛尔

B. 维拉帕米

C. 普罗帕酮

D. 胺碘酮

E. 阿托品

12. 以下对心包腔压力上升引起的病理生理变化描述不正确的是

A. 心室舒张受阻，充盈受限

B. 可出现奇脉

C. 心排血量降低

D. 静脉压升高

E. 动脉舒张压下降

13. 关于房性期前收缩的心电图特征，以下描述不正确的是

A. 房性期前收缩的 P 波提前发生，与窦性 P 波形态相异

B. 房性期前收缩发生较晚时可发生完全性代偿间歇

C. 房性期前收缩的代偿间歇多不完全

D. 房性期前收缩的 P 波后的 QRS 波群多宽大畸形

E. 可产生传导中断现象

14. 右心衰竭的临床表现主要是由于以下哪项原因引起的

A. 肺循环淤血

B. 心排血量降低

C. 低蛋白血症

D. 毛细血管通透性升高

E. 体循环淤血

15. 下列不是二尖瓣关闭不全的听诊特点的是

A. 第一心音减弱

B. 二尖瓣脱垂时可有收缩中期喀喇音

C. 杂音吸气增强

D. 急性者第二心音肺动脉瓣成分亢进

E. 心尖区全收缩期杂音

16. 下列各项属于左心室容量负荷过重的是

A. 缩窄性心包炎

B. 扩张型心肌病

C. 二尖瓣狭窄

D. 主动脉关闭不全

E. 房间隔缺损

17. 病毒性心肌炎急性期减轻心脏负荷的最好方法是

A. 休息

B. 抗病毒及免疫调节药物

C. 抗心律失常治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238040041065006052>