

护理妇产科护理技术模拟试题及答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于子宫破裂的描述，下列错误的是

- A、多发于经产妇
- B、胎儿进入腹腔后，胎心听得更清楚了
- C、有全腹压痛、反跳痛
- D、有血尿
- E、子宫破裂后，应积极做好手术准备

正确答案：B

2、产妇，26 岁，产后 3 天诉乳房痛，对其乳房进行评估，正确的指导是

- A、若为乳房胀痛，先喂胀痛轻的乳房，后喂较严重的乳房
- B、若为正常乳头，一侧乳房吸空一半即换另一侧乳房
- C、若患乳腺炎，先喂健侧乳房，再喂患侧乳房
- D、若一侧为平坦乳头，应先喂凸出乳头，后喂平坦乳头
- E、若为皲裂乳头，先喂破损乳头，再喂正常乳头

正确答案：C

3、容易在月经前后发病的疾病是

- A、淋菌性阴道炎
- B、慢性子宫颈炎
- C、滴虫性阴道炎
- D、前庭大腺炎
- E、老年性阴道炎

正确答案：C

4、患者，女，35 岁，已婚，诉白带增多伴外阴瘙痒 2 周，查体外阴潮红，阴道黏膜充血，上覆白色膜状物，宫颈轻度糜烂，白带查滴虫(-)。下列处理哪项不正确

- A、白带真菌检查
- B、治疗期间避免性生活
- C、用达克宁硝酸咪康唑霜擦阴道治疗
- D、加用抗生素治疗
- E、用克霉唑栓剂局部用药

正确答案：D

5、孕妇，28 岁，孕 38 周，头痛，呕吐伴自觉胎动减少一天来院。血压 180/110mmHg，尿蛋白(+++)，胎心 130 次/分。最可能是妊娠期高血压疾

病的

- A、妊娠合并慢性高血压
- B、重度子痫前期
- C、妊娠期高血压
- D、轻度子痫前期
- E、慢性高血压并发子痫前期

正确答案：B

6、胎体纵轴与母体纵轴的关系称为

- A、胎体势
- B、胎位
- C、产轴
- D、胎先露
- E、胎产式

正确答案：E

7、孕妇，29岁，孕35周，下楼不慎跌倒在地，被路人扶起，“120”出诊到达时该孕妇开始出现轻微腹痛。查体：血压128/78mmHg，脉搏76次/分；子宫软，大小与妊娠周数相符，压痛可疑，胎位清，胎心率正常。

该孕妇可能的诊断正确的是

- A、子痫导致轻型胎盘早剥
- B、外伤导致先兆子宫破裂
- C、先兆子宫破裂导致腹痛
- D、子痫导致重型胎盘早剥
- E、外伤导致轻型胎盘早剥

正确答案：E

8、正常枕先露分娩机制，正确的顺序是

- A、外旋转，衔接，下降，内旋转，俯屈，仰伸复位，胎儿娩出
- B、下降、衔接，内旋转，俯屈，仰伸复位，外旋转，胎儿娩出
- C、衔接，俯屈，内旋转，外旋转，仰伸复位，下降，胎儿娩出
- D、下降，俯屈，衔接，外旋转，内旋转，仰伸复位，胎儿娩出
- E、衔接，下降，俯屈，内旋转，仰伸，复位外旋转，胎儿娩出

正确答案：E

9、初产妇李某，30岁，孕39周，于胎儿分娩后突然出现烦躁不安、恶心、呕吐，继而出现呛咳、呼吸困难，R24次/分，HR126次/分，BF80/50mmHg。为该产妇提供的心理支持不适宜的是

- A、向家属介绍患者病情
- B、给予安慰，增强信心
- C、适当允许家属陪伴
- D、鼓励下床活动，利于康复
- E、病情稳定后共同制订康复计划

正确答案：D

10、孕妇，26岁，孕39周，午后胎动频繁，听诊胎心160次/分，考虑胎儿窘迫，可能的病因是

- A、胎盘形状异常
- B、胎儿贫血
- C、胎盘植入异常
- D、母婴血型不合
- E、脐带因素

正确答案：E

11、产妇，32岁，妊娠38周，于某日2:30pm顺产。6:40pm病人主诉腹胀、腹痛。视诊：下腹膀胱区隆起；叩诊：耻骨联合上鼓音。护士采取的正确护理措施是

- A、按摩子宫
- B、坐浴
- C、给予抗生素口服
- D、帮助产妇排尿
- E、遵医嘱使用利尿药

正确答案：D

12、患者，女，34岁，葡萄胎二次清宫后2个月，阴道不规则流血持续存在，尿HCG阳性，B超检查发现子宫肌呈蜂窝样改变。应考虑患者可能为

- A、绒癌
- B、子宫肌瘤
- C、胎血部位滋养细胞肿瘤
- D、子宫内膜癌
- E、侵蚀性葡萄胎

正确答案：E

13、产妇，26岁，孕37周，自然分娩一活女婴。产妇接受护士建议，母乳喂养。产后6小时之内开始母乳喂养，因自觉乳房不胀，婴儿没能吸

吮到足够的乳汁。护士用模型讲解母乳喂养时的婴儿含接姿势，让产妇和家属回示操作，提示仍未学会的操作是

- A、婴儿的下唇呈外翻状态
- B、婴儿的身体紧贴母亲
- C、吸吮时嘴下方露出很多乳晕
- D、含乳头时下颌紧贴乳房
- E、乳头和乳晕在婴儿口中

正确答案：C

14、骨盆入口狭窄时，不易发生

- A、胎先露内旋转受阻
- B、臀位或横位
- C、胎膜早破
- D、会阴严重损伤
- E、继发性宫缩乏力

正确答案：D

15、患者，女性，45岁，经量增多，经期延长2年，头晕、乏力2个月。妇科查体：子宫呈不规则增大，如孕3个月大小，表面结节状突起，质硬。首先考虑该患者的诊断是

- A、子宫内膜癌
- B、绒毛膜癌
- C、子宫颈癌
- D、浸润性葡萄胎
- E、子宫肌瘤

正确答案：E

16、某孕妇，被诊断为重度子痫前期，判断目前临床诊断的依据应除外

- A、血压 $\geq 160/110\text{mmHg}$
- B、尿蛋白（一）
- C、尿蛋白定量为 $2.0\text{g}/24\text{h}$
- D、头痛、眩晕、视物不清等自觉症状明显
- E、血清谷丙转氨酶升高，持续性上腹不适

正确答案：B

17、30岁，初产妇，妊娠38+5周，规律宫缩5小时，枕左前位，估计胎儿体重3000g，胎心136次/分。阴道检查：宫口开大3cm，未破膜，S+1，骨盆外测量未见异常。此时恰当的处理是

- A、调整宫缩节律
- B、静脉滴注缩宫素
- C、准备阴道助产
- D、等待自然分娩
- E、人工破膜加速产程进展

正确答案：D

18、某妇女流产后出现月经不调，表现为月经周期正常，经期延长，伴下腹坠胀、乏力，疑诊黄体萎缩不全。为确诊做诊刮，其时间预约在

- A、月经的第1天
- B、月经前3天
- C、月经周期的任意时间
- D、月经周期的第5天
- E、月经后10天

正确答案：D

19、孕妇，28岁，进入分娩状态，护士发现该孕妇在其宫口开大3cm后，出现烦躁不安，对于自然分娩没有信心，一再要求剖宫产。该护士针对此孕妇应采取的最主要护理措施是

- A、做剖宫产准备
- B、检测胎心
- C、鼓励孕妇多进食，恢复体力
- D、提供心理支持，减轻焦虑
- E、教会孕妇用力的方法

正确答案：D

20、林某，G1P0，临产7小时，头先露，宫口已开全，胎头下降程度为+4。此时决定其自然分娩的主要因素是

- A、腹肌收缩力及自主呼吸配合
- B、盆底收缩力及自主呼吸配合
- C、子宫收缩力及自主呼吸配合
- D、腹肌收缩力及膈肌收缩力
- E、子宫收缩力及膈肌收缩力

正确答案：C

21、慢性宫颈炎的典型症状是

- A、泡沫状白带
- B、白带增多

- C、外阴瘙痒有灼热感
- D、凝乳状白带
- E、下腹坠胀

正确答案：B

22、妊娠合并心脏病孕妇，最易发生心力衰竭的时间是

- A、妊娠 20~24 周
- B、妊娠 28~30 周
- C、妊娠 36~38 周
- D、妊娠 32~34 周
- E、妊娠 38 周以上

正确答案：D

23、下列有关产褥感染的处理原则，不正确的是

- A、胎盘残留者，应控制感染后再清宫
- B、有会阴侧切伤口时健侧卧位
- C、禁用缩宫素，避免感染扩散
- D、选用有效的抗生素
- E、半卧位

正确答案：C

24、初孕妇，32 岁，孕 37 周，有轻度妊娠高血压综合征。今晨不慎摔倒，2 小时后自觉下腹不适，有少量阴道出血，急诊入院。检查：宫缩弱，持续 30 秒，间歇 10 分钟。宫高 33cm，子宫软，右侧子宫有轻度局限性压痛，胎心率 140 次 / 分。最恰当的处理原则是

- A、立即行剖宫产术
- B、卧床休息
- C、给予解痉药
- D、硫酸镁抑制宫缩
- E、期待疗法

正确答案：A

25、孕妇，25 岁，孕 35 周出现无痛性阴道流血，腹部产科检查胎位 ROA，先露已衔接，胎心正常，考虑其可能为

- A、完全性前置胎盘
- B、边缘性前置胎盘
- C、部分或完全性前置胎盘
- D、完全或边缘性前置胎盘

E、部分或边缘性前置胎盘

正确答案：E

26、某孕妇，28岁，妊娠24周，护士对其进行预防妊高征的健康教育中，下列哪项内容是不正确的

- A、坚持定期检查
- B、摄入高蛋白、高脂肪、高维生素饮食
- C、采取左侧卧位休息
- D、每日补充钙剂2g
- E、保持心情愉快

正确答案：B

27、孕妇徐某，孕28周，产前检查发现该孕妇为臀先露，应采取的最佳措施是

- A、等待自然转为头先露
- B、外倒转术
- C、艾灸至阴穴
- D、B超确诊
- E、膝胸卧位

正确答案：A

28、绝经后期的表现应除外

- A、阴道黏膜变薄
- B、阴道分泌物增多
- C、生殖器官萎缩
- D、易导致膀胱炎
- E、性功能减退

正确答案：B

29、李女士，30岁，孕39周，临产10小时，骨盆正常，胎心145次/分，LOP，宫缩20秒/7~8分钟，宫口开3cm，S-1，羊水清，目前处理正确的是

- A、静滴缩宫素
- B、抬高双脚防脐带脱垂
- C、行剖宫产
- D、阴道助产
- E、肌注哌替啶

正确答案：A

30、对正常分娩来说，胎膜破裂的时间常为

- A、胎儿娩出期
- B、潜伏期
- C、活跃期
- D、胎盘娩出期
- E、临产前

正确答案：C

31、产妇，徐某，G1P0，孕 38 周，胎方位：臀先露，估计胎儿体重 2500g 医生与产妇及家属谈话，同意试产。临产后 6 小时，宫口扩张 3cm。以后 9 小时内，宫口扩张 6cm，胎先露+1，胎心好，宫缩 20 秒/8 分钟，宫缩节律性正常，对称性较弱。依据产妇徐某的产程表现，产力类型属于

- A、协调性宫缩过强
- B、不协调性宫缩乏力
- C、协调性宫缩乏力
- D、不协调性宫缩过强
- E、子宫收缩正常

正确答案：B

32、张女士，32 岁，结婚 5 年，夫妻性生活正常，未孕。现停经 40 天，因突然右下腹剧烈疼痛伴有阴道点滴出血半天，急诊入院。查体：血压 100/50mmHg，白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.7。盆腔检查：阴道内有少许暗红色血，宫颈抬举痛明显，后穹窿饱满，子宫触诊不满意。为该患者提供的护理应除外

- A、立即灌肠行术前准备
- B、观察体温变化
- C、严密观察血压、脉搏、呼吸
- D、立即输液，做好输血准备
- E、患者立即取半卧位

正确答案：A

33、宫颈癌患者常见的早期症状是

- A、接触性出血
- B、阴道排液
- C、疼痛
- D、大小便异常

E、不规则阴道流血

正确答案：A

34、33岁，初孕妇，宫内孕38+4周，凌晨6:00下床时自觉阴道流出大量稀水样液体，于当日上午10:00入院，正确的护理措施是

A、患者取头高脚低位，以平车送往病房

B、病人可自由活动

C、以轮椅送入病房

D、患者可沐浴

E、患者取头低脚高位，以平车送往病房

正确答案：E

35、某女士，28岁，行吸宫术终止妊娠，为她提供的术后护理内容中，正确的是

A、手术完成后，需要留观12h

B、术后少量阴道流血可持续2周以上

C、术后4周禁止性生活及盆浴

D、术后需要卧床休息3周

E、术后10h内不允许患者自己下地活动

正确答案：C

36、某初孕妇23岁，妊娠38周，枕左前位。患者有先天性房间隔缺损病史。目前心功能II级，规律宫缩，宫口开大8cm，胎头在坐骨棘水平下2cm，其护理措施正确的是

A、严密观察产程，宫口开全后行阴道助产缩短第二产程

B、立即剖宫产术结束妊娠

C、待宫口开全后鼓励产妇屏气用力缩短第二产程

D、给予缩宫素，加强子宫收缩

E、给予洋地黄类药物，预防心力衰竭

正确答案：A

37、关于羊水栓塞的常见病因，下列叙述不正确的是

A、前置胎盘

B、子宫颈裂伤

C、急产

D、宫缩乏力

E、胎盘早剥

正确答案：D

38、孕妇，29岁，孕38周，因自诉阵发性腹部疼痛入院。首选的护理措施是

- A、嘱绝对禁食观察是否合并内外科疾病
- B、以腹部触诊法严密观察宫缩并勤听胎心
- C、做好精神心理护理和剖宫产术前准备
- D、立即行凝血功能检查和准备宫腔镜检查
- E、告知腹部B超检查的必要性以取得配合

正确答案：B

39、“某患者诉说在单位妇科学普查时确诊”宫颈糜烂”，护士应告知她疗效较好、疗程最短的治疗方法是”

- A、物理疗法
- B、手术治疗
- C、阴道冲洗
- D、宫颈上药
- E、局部用硝酸银

正确答案：A

40、王某，28岁，经产妇，妊娠37周，以“阴道无痛性多量流血5小时”为主诉急诊入院。查体示：血压80/60mmHg，脉搏110次/分。无宫缩，宫底在剑突下2横指，臀先露，胎心率90次/分，骨盆外测量正常。针对该患者最恰当的处理是

- A、静滴缩宫素
- B、外转胎位术
- C、密切随访观察
- D、立即剖宫产
- E、立即人工破膜

正确答案：D

41、患者34岁，妊娠足月临产，滞产，胎儿胎盘娩出后，出现间歇性阴道出血，量较多。检查子宫体柔软。其出血原因最大可能是

- A、软产道损伤
- B、子宫收缩乏力
- C、胎盘剥离不全
- D、凝血功能障碍
- E、子宫破裂

正确答案：B

42、患者，女，30岁，孕3产1，诉“2周前出现性生活后阴道有血性白带”。妇科检查：子宫颈中度糜烂，有接触性出血，子宫正常大小，双侧附件阴性。子宫颈刮片细胞学检查为巴氏3级。提示该患者为

- A、可疑癌症
- B、轻度炎症
- C、中度炎症
- D、宫颈癌
- E、高度可疑癌症

正确答案：A

43、对月经的描述，正确的是

- A、两次月经第1日的间隔时间为1个月经周期
- B、月经失血量>100ml为病理状态
- C、在分泌期，子宫内膜主要受雌激素影响
- D、月经血是凝固的，至少有小血块
- E、初潮时多是有排卵型月经

正确答案：A

44、患者，女，38岁，诊断为侵蚀性葡萄胎，下列哪项是该患者的临床表现

- A、阴道流血呈咖啡色
- B、先有出血后有HCG升高
- C、伴有新生的葡萄胎排出
- D、清宫术后半年阴道流血
- E、阴道转移最为多见

正确答案：D

45、患者，女，30岁，妊娠35周，受到撞击后腹部剧烈疼痛1小时。查体：体温36℃，脉搏110次/分，血压140/100mmHg，阴道无流血，宫口未开，未破膜，子宫足月妊娠大小，板状硬，有压痛，胎心率90次/分，胎位不清。该患者可能发生的问题是

- A、早产
- B、宫外孕
- C、前置胎盘
- D、胎盘早期剥离
- E、流产

正确答案：D

46、王女士，27岁，孕39周，LOA，临产12小时，胎膜未破，宫口开大1cm，S-2，胎心140次/分，下列处理哪项不正确

- A、给予缩宫素静脉滴注
- B、B超检查
- C、肌内注射地西洋
- D、观察待产
- E、骨盆内测量

正确答案：E

47、某产妇，骨盆外测量显示：入口前后径9.5cm，对角径11cm，其他无异常。孕40周时胎心好，行缩宫素静脉滴注试产。护士发现产妇在试产过程中很焦虑，该护士给予的护理措施，正确的是

- A、专人看护
- B、试产2~4小时，胎头仍未入盆，加强宫缩
- C、可应用少量镇静药
- D、勤肛查
- E、有宫缩后灌肠

正确答案：A

48、产褥期，须在宫颈内口闭合后才能实施的护理措施是

- A、温水消毒液会阴坐浴
- B、指导产妇产后保健操
- C、教产妇给新生儿换尿布
- D、指导产妇母乳喂养技能
- E、会阴切口红外线照射

正确答案：A

49、初产妇，35岁，妊娠35周，曾人工流产2次。因近半个月反复少量无痛性阴道流血而入院。检查：血压90/60mmHg，宫缩持续20秒，间歇5~6分钟，强度弱，胎方位LSA(骶左前位)，胎心率140次/分。最有助于诊断的病史是

- A、高龄初产妇
- B、人工流产史
- C、反复无痛性阴道流血
- D、规律宫缩
- E、胎儿情况

正确答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238075032020006036>