

临床技能学_南方医科大学中国大学 mooc 课后章节答案期末考试题库
2023 年

1. 外科消毒法的创始人及推广者是

答案:

约瑟夫 李斯特

2. 首先倡导外科手术者戴橡皮手套的是

答案:

霍尔斯特德

3. 以下不属于换药目的的是

答案:

保护伤口

4. 以下哪种属于生物清创法

答案:

蛆疗

5. 清创术后的并发症不包括

答案:

排异反应

6. 案例分析：对于精密医疗设备、器械（如各种内镜等）的消毒方式常用的为

答案:

消毒液浸泡法

7. 案例分析：60岁男性患者，因诊断“乙状结肠癌”行手术治疗，术后第三天行换药，发现腹部切口缝线针眼稍红肿，此时可予以的处置措施是？术后第五天，患者发热，诉切口疼痛，换药时发现切口远心端局部有脓性分泌物流出，以下处置方式错误的是

答案:

保留缝线，继续换药

8. 患者男，36岁，某单位文员，近2月来常感到左手拇指间歇性疼痛，活动时疼痛明显，近期加重，口服止痛药后无明显效果，应予以下列哪项处理较恰当：

答案：

更换口服药物的同时进行局部封闭治疗并休息

9. 患者男，45岁，发现背部肿物1年余，现予以手术切除，以下缝合方式中最适合用于切口处缝合皮肤的是：

答案：

减张缝合

10. 患者男，34岁，车祸致右侧小腿畸形肿胀3小时，急诊摄X片如下，下列说法中错误的是：



答案：

该患者可进行胫骨结节牵引以复位

11. 患者男，49 岁，摔伤致左侧腕部疼痛、肿胀 4 小时，查体可见典型“刺刀样”畸形，门诊 X 片示左侧 colles 骨折，以下处理方法中错误的是：

答案：

为保证固定效果，应使用管型石膏进行固定

12. 患者女，19 岁，车祸致左侧胫腓骨开放骨折，伤口处有活动性出血，作为急救人员，应选择的最有效的止血措施是：

答案：

止血带止血

13. 首次定义手术刀的人是：

答案：

希波克拉底

14. 下列哪项止血技术发现最早：

答案：

结扎止血

15. 下列哪项不是临床常用的结的种类：

答案：

蝴蝶结

16. 哪一代缝线是非吸收性化学合成线：

答案：

第一代缝线

17. 下列哪项不是缝合的目的

答案：

阻止伤口愈合

18. 常用于阑尾残端包埋的缝合方法是：

答案：

荷包缝合

19. 患者，男，25岁，有哮喘史，今晨突发右侧胸痛，伴气促，胸片提示右侧大量气胸，肺部压缩90%，以下处理正确的是：

答案：

告知患者病情，行胸腔闭式引流术

20. 患者，女，60岁，近半年来常感腹部隐痛，伴腹胀，近2日腹痛、腹胀加剧，停止解大便及排气，伴呕吐，呕吐物多。腹部查体：腹部膨隆，可见肠型及蠕动波。首选的检查为：（

答案：

直肠指诊

21. 腹腔穿刺的适应证不包括：

答案：

卵巢囊肿者放液

22. 以下哪项不是腹腔穿刺术的禁忌证

答案:

肝硬化腹水

23. 关于腹腔穿刺所经解剖结构, 下列正确的是

答案:

皮肤、浅筋膜、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌、腹横筋膜、腹膜外脂肪、壁腹膜

24. 关于腹腔穿刺术的注意事项, 以下哪一项不正确

答案:

放腹水的速度应尽量快

25. 对大量腹水的肝硬化患者行腹腔穿刺术, 关于操作过程不正确的是

答案:

垂直进针

26. 李某，男性，76岁，吸烟40余年，反复咳嗽、活动后气短2年余，2周前出现痰中带血丝，易疲乏，3天来胸闷、气短加重，无发热，无胸痛。既往有冠心病病史，有利多卡因过敏史，无特殊遗传病史。近期饮食不佳，体重减轻。入院后行胸片提示左侧中等量胸腔积液。该患者不能立即进行胸腔穿刺操作的临床情况是

答案：

凝血功能差，有出血倾向

27. 以下哪项不是胸腔穿刺术的适应证

答案：

凝血功能障碍

28. 关于胸腔穿刺术的注意事项，以下哪一项不正确

答案：

抽胸水的速度应尽量快，尽快完成操作

29. 患者男性，28岁，临床诊断：左侧结核性胸膜炎并胸腔积液。入院已行2次胸腔穿刺术，共抽出草绿色胸腔积液2400ml。在第3次胸穿术中抽液时，患者突发剧咳、呼吸困难、胸闷、咳大量泡沫样痰，左肺可闻及广泛细湿啰音，最可能的原因是

复张性肺水肿

30. 患者，女，50 岁，因弥漫性大 B 细胞淋巴瘤入院治疗，在较短的观察期内，患者出现轻微劳力性呼吸困难，无胸痛或咯血。查胸片及胸部 CT 显示：双侧胸腔积液（右侧较多），拟对该患者行胸腔穿刺术，关于操作过程不正确的是

答案：

先左侧后右侧进行胸腔穿刺抽液

31. 骨髓穿刺的适应证不包括：

答案：

凝血功能障碍患者明确病因

32. 临床上首选的骨髓穿刺部位是

答案：

髂后上棘穿刺点

33. 关于骨髓穿刺术的注意事项，以下哪一项不正确

:

穿刺前打麻药需要垂直进针麻醉

34. 患者女 19 岁，发现双下肢出血点 5 天。查体：双下肢可见散在出血点。血常规提示 WBC $13 \times 10^9/L$ ，Hb $125g/L$ ，PLT $12 \times 10^9/L$ 。为明确诊断，患者目前最需要做的处理是

答案：

骨髓穿刺术

35. 简易呼吸器的连接组件不包括

答案：

通气阀

36. 挤压呼吸囊时，压力不可过大，约挤压呼吸囊的（ ）为宜，以免损伤肺组织

答案：

$1/2 \sim 2/3$

答案：

MRI

38. 关于脊柱外伤与脊髓损伤的关系的叙述，下列哪项是错误的

答案：

有的病例表现为明显脊髓损伤，但 X 线片却无骨折脱位

39. 搬运脊柱骨折病人的正确方法是

答案：

平托搬运法

40. 现场急救的四项技术是指：

答案：

止血 包扎 固定 搬运

41. 确诊低颅压头痛常用的方法是：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238132106046006075>