

# 2023 年儿科临床主治医师:儿科常见病理知识试题与答案

## 一、选择题

1 小儿急性上呼吸道感染的主要病原是 (B)

A、细菌

B、病毒

C、原虫

D、真菌

E、混合感染

2 . 小儿上感的常见体征, 哪项不正确? (D)

A、一般好

B、咽充血

C、扁桃体红肿

D、肺部湿罗音

E、颌下淋巴结肿大

3 . 婴幼儿上感的症状与年长儿不同处是 (E)

A、发热

B、咳嗽

- C、流涕
- D、纳差
- E、可高热惊厥

4 . 小儿上感的最重要的防治措施是 (D)

- A、经常户外活动
- B、经常开窗通风
- C、提倡母乳喂养
- D、合理使用抗菌素
- E、对症处理

5 . 支气管肺炎和支气管炎最主要鉴别点是: (D)

- A、发热咳嗽
- B、呼吸困难
- C、呼吸音降低
- D、固定细湿罗音
- E、血白细胞增高

6 . 重症肺炎可出现以下表现, 哪项除外 (B)

- A、心肌炎
- B、肾炎

C、心力衰竭

D、脑水肿

E、肠麻痹

7. 呼吸道合胞病毒肺炎的主要体征是 (A)

A、喘鸣音

B、细湿罗音

C、呼吸音粗

D、呼气延长

E、呼吸音降低

8. 金黄色葡萄球菌肺炎的热型常为 (B)

A、稽留热

B、弛张热

C、间歇热

D、波浪热

E、不规则热

9. 金黄色葡萄球菌肺炎的临床特点, 哪项不正确?  
(C)

A、新生儿婴幼儿多见

- B、中毒症状重
- C、肺部体征常不明显
- D、猩红热样皮疹
- E、易有并发症

10 . 重症肺炎消化系统的严重表现是 (C)

- A、食欲减退
- B、频繁吐泻
- C、消化道出血
- D、肠鸣音消失
- E、严重腹胀

11 . 婴幼儿肺炎最主要的病理生理改变是 (A)

- A、低氧血症
- B、高碳酸血症
- C、代谢性酸中毒
- D、呼吸性酸中毒
- E、混合性酸中毒

12 . 小儿肺炎时支持疗法补液总量每日每公斤不大 (C)

- A、3050ml

B、 5070ml

C>6080ml

D、 80100ml

E、 100120ml

13. 小儿重症肺炎时肾上腺皮质激素应用的疗程为 (B)

A、 13 日

B、 35 日

C、 57 日

D、 79 日

E、 914 日

14 . 支原体肺炎的临床特点，哪项不正确？ (C)

A、 起病较缓婴幼儿急

B、 中毒症状不明显

C、 肺部体征明显出现早

D、 刺激性频咳痰粘稠

E、 热型不定热程 13 周

15 . 支原体肺炎的首选药物是 (B)

A、 青霉素

B、红霉素

C、氯霉素

D、链霉素

E、洁霉素

16 . 支原体肺炎应用敏感抗生素疗程至少 (C)

A、不小于一周

B、12 周

C、23 周

D、34 周

E、45 周

17 . 婴幼儿哮喘的基本病变是 (A)

A、气管慢性炎症

B、气道黏膜水肿

C、气道高反应性

D、反复慢性咳嗽

E、气管管腔狭窄

18 . 婴幼儿哮喘和病毒性肺炎最主要的鉴别点是 (D)

A、多由病变感染诱发

- B、起病较缓慢
- C、全肺有哮鸣音
- D、有反复发作倾向
- E、血白细胞数正常

19 . 以下诸病均可发生小儿喘憋症状，哪一项除外？  
(B)

- A、腺病毒肺炎
- B、肺炎球菌肺炎
- C、呼吸道合胞病毒肺炎
- D、肺炎支原体肺炎
- E、支气管哮喘

20 . 预防哮喘复发的措施。哪项不正确？ (E)

- A、避免接触过敏原
- B、积极清除感染灶
- C、去除各种诱发因素
- D、必要时脱敏疗法
- E、常年应用强的松

21 . 小儿腹泻好发年龄多见于 (B)

- A、1 岁以下
- B、2 岁以下
- C、3 岁以下
- D、4 岁以下
- E、5 岁以下

22 . 轮状病毒肠炎好发季节是 (C)

- A、冬季
- B、秋季
- C、秋冬季
- D、春季
- E、夏季

23 . 婴儿腹泻的病因，下列哪一项是错误的 (E)

- A、食饵性腹泻
- B、肠道内感染
- C、肠道外感染
- D、过敏性腹泻
- E、消化代谢旺盛

24 . 腹泻病重型和轻型的主要区别点是 (C)



- A、发热呕吐
- B、大便超过 10 次/天
- C、有脱水中毒症状
- D、大便含黏液
- E、镜检有白细胞

25 . 诊断中度脱水的主要依据是 (D)

- A、口干明显
- B、前卤显凹
- C、泪尿、减少
- D、皮肤弹性较差
- E、肢冷

26 . 以下哪项不符合致病性大肠杆菌肠炎的特点 (A)

- A、好发于秋冬季
- B、大便腥臭有黏液
- C、病由轻转重型
- D大便镜检有少量白细胞
- E有传染性

27 . 小儿腹泻治疗原则，下列哪项不符 (B)

、防治脱水

B、禁喂母乳

C、合理用药

D、加强护理

E、预防并发症

28 . 重型腹泻低血钾时出现以下症状, 下列哪项不符(C)

A、心音低钝

B、肌张力减低

C、肠鸣音亢进

D、膝反射迟钝

E、腹胀明显

29 . 口服补液的适应症, 哪项不符 (B)

A、无呕吐

B、有腹胀

C、无脱水

D、轻度脱水

E、中度脱水

30 . 患儿 6 个月, 腹泻 5 天, 一日 78 次, 吐奶两天, 今无尿, 神萎, 哭无泪。前因眼眶深凹, 皮肤弹性极差, 四肢冰

E)

- A、饮食调整
- B、口服补液盐
- C、应用抗菌素
- D、静脉补液
- E、转送上级医院

31 . 内科腹痛的临床特点，最主要的是 (D)

- A、先热后痛或无热
- B、腹痛范围较弥散
- C、腹痛不剧烈
- D、腹部无固定压痛、肌紧张
- E、原发病症状明显

32 . 8 个月男婴阵发性哭吵半天，呕吐 3 次，面色苍白，右上腹触及可疑痞块，最简便的初步诊断方法是 (C)

- A、观察呕吐物
- B、血白细胞计数
- C、肛门指检
- D、腹部 B 超
- E、腹部 X 线平片

.6岁女童持续性腹痛1天，伴发性加剧2小时，呕吐1次，T38.8，咽（-），肺清，右下腹压痛，反跳痛，最正确的处理是（E）

- A、留下观察
- B、血白分计
- C、腹部B超
- D、静脉补液
- E、转外科治疗

34 . 麻疹传染性最强的是：（B）

- A、潜伏期
- B、前驱期
- C、出疹期
- D、恢复期
- E、伴并发症时

35 . 麻疹早期可见（A）

- A、黏膜疹
- B、玫瑰疹
- C、斑丘疹

、 尊麻疹

E、 水疮疹

36 . 麻疹与发热的关系是 (D)

A、 发热当天出疹

B、 发热后半 1 天出疹

C、 发热后 12 天出疹

D、 发热后 34 天热高出疹

E、 发热后 35 天热退出疹

37 . 麻疹患儿应隔离至出疹后 (B)

A、 3 天

B、 5 天

C、 7 天

D、 10 天

E、 14 天

38 . 麻疹最常见的并发症是 (C)

A、 口角炎

B、 喉炎

C、 肺炎

、中耳炎

E、脑炎

39 . 预防麻疹发病的最佳措施是 (D)

A、加强营养，合理饮食

B、保持居室空气流通

C、肌注免疫球蛋白

D、注射麻疹疫苗

E、流行期间不串门

40 . 引起水痘的病原是 (C)

A、水痘病毒

B、带状疱疹病毒

C、水痘-带状疱疹病毒

D、人疱疹病毒

E、柯萨基病毒

41 . 某幼儿园小班发现水痘患儿，对接触者应检疫 (C)

A、1周

B、2周

C、3周

. 幼儿急疹的出疹与发热关系是发热的 (E)

- A、 当天出齐
- B、 次日出齐
- C、 23 天出齐
- D、 34 天出齐
- E、 热退疹出

43 . 猩红热皮疹特点下列哪项不符? (D)

- A、 发热第二天出疹
- B、 全身弥漫性猩红色细小丘疹
- C、 疹间无正常皮肤
- D、 疹退后留褐色色素沉着
- E、 疹退后片状脱皮

44 . 风疹与麻疹的主要的鉴别点是 (B)

- A、 全身症状轻微
- B、 皮疹一日出齐
- C、 淡红色斑丘疹
- D、 皮疹全身分布
- E、 枕后淋巴结肿大

45 . 出疹性疾病的防治措施, 哪项不正确? (A)

A、无须隔离

B、加强护理

C、对症处理

D、注射相应疫苗

E、接触者检疫

46 . 小儿体格发育测量的各项指标中, 最重要的指标是: (B)

A、身长

B、体重

C、头围

D、胸围

E、囟门

47 . 小儿出生后, 其身长在什么时期成长速度最快:

(A)

A、从出生后至 1 岁

B、1 岁到 4 岁

C、4 岁到 6 岁

D、6 岁到青春期



E、青春期到成人

48 . 正常婴儿, 体重 4kg, 前囟 1.5#215;1.5, 后囟 0.2cm, 能微笑, 头不能竖直, 最可能的月龄是: (B)

A、7 天内

B、2 月

C、3 月

D、4 月

E、5 月

49 . 正常婴儿, 体重 7.5kg, 身高 68cm, 前囟 0.5#215;0.5, 头围 44cm, 出牙 4 只, 能独坐, 该儿最可能的月龄是: (B)

A、5 个月

B、8 个月

C、12 个月

D、18 个月

E、24 个月

50 . 6 岁小儿平均体重是: (E)

A>10公斤

B、12 公斤

C、14 公斤

D>18公斤

E、20 公斤

51 . 正常婴儿前囟关闭的最迟时间是： (C)

A、12 月

B、14 月

C、18 月

D、22 月

E、24 月

51.1 岁半小儿的乳牙应有： (D)

A、6 个

B、8 个

C、10 个

D、14 个

E、18 个

53 . 发育最晚的系统为： (D)

A、神经系统

B、淋巴系统

C、运动系统

D、生殖系统

E、消化系统

54. 对小儿生长发育的评价，下列哪项是错误的：(D)

A、各系统发育快慢不同

B、神经系统发育最快

C、生殖系统发育最慢

D、发育规律是由上到下，由远到近

E、生长发育存在个体差异

55. 1 岁内小儿应完成的预防接种，除哪项外 (C)

A、卡介苗

B、麻疹疫苗

C、伤寒疫苗

D、百白破疫苗

E、脊髓灰质炎疫苗

56. 新生儿期的定义 (B)

A、自出生脐带结扎起到满 27 天

B、自出生脐带结扎起到刚满 28 天为止

C、自出生脐带结扎起到满 1 个月

- D、自出生脐带结扎起到满 7 天
- E、自出生脐带结扎起到满 30 天

57 . 新生儿生理性体重下降占体重的 (B)

- A、 2%-5%
- B、 3%-9%
- C、 5%-7%
- D、 6%-10%
- E、 7%-15%

58 . 新生儿保健重点着重体现在: (E)

- A、 保温
- B、 喂养
- C、 护理
- D、 预防感染
- E、 以上均正确

59 . 新生儿生后 2-3 天出现轻度黄疸, 一般情况好, 最可能的诊断是: (B)

- A、 AB<sub>0</sub>溶血
- B、 生理性黄疸
- C、 败血症

D、新生儿肝炎

E、新生儿肺炎

60 . 新生儿胆红素代谢的特点是： (A)

A、胆红素生成较多

B、红细胞寿命比成人长

C、肝功能较成熟

I)、肠内(葡萄糖醛酸酶活性低

E、肝脏摄取胆红素功能较强

61 . 新生儿败血症早期症状特点为： (E)

A、发热

B、反应低下

C、黄疸、肝大

D、皮肤感染灶

E、早期症状不典型

62 . 一胎龄 35 周早产儿，冬天出生，现年龄为 1 个月零 2 天。母乳喂养，体重已由出生时 2.0kg 增至 3.0kg。现首先应添加的辅食及其添加目的是： (E)

A、米汤，以补充热量

B、菜汤，以补充矿物质

- C、米糊，以补充热量
- D、鱼肝油，以补充维生素 A
- E、鱼肝油，以补充维生素 D

63 .6 个月男婴，纯母乳喂养，查体发现面色苍白，外周血血红蛋白  $108 \frac{\text{g}}{\text{l}}$ ，医生首先应指导家长： (C)

- A、补充铁剂
- B、补充叶酸
- C、添加辅食
- D、增加户外活动
- E、补充 VitD

64 .女婴，4 个月。冬季出生，足月顺产，单纯牛奶喂养。近半个月来较烦躁，夜寐欠佳。体检应注意的体征为 (A)

- A、卢页骨软化
- B、肋串珠
- C、方颅
- D、鸡胸
- E、“O”形腿

65 .佝偻病骨样组织堆积的表现，哪项症状除外： (C)

- A、方颅
- B、肋骨串珠
- C、鸡胸
- D、手镯
- E、足镯

66 .8 个月小儿体重 7.6kg, 身高 60cm,头围 46cm。目前能独坐, 不会爬, 牙未出, 前囟 3&#215;3cm,能认识亲人和陌生人,能听懂自己名字,面部无特殊的体征,该儿最大的可能是:

(A)

- A、佝偻病
- B、呆小病
- C、营养不良
- D、脑积水
- E、21-三体综合症

67 .预防佝偻病服用维生素 D,新生儿通常开始于出生后:

(A)

- A、2 周
- B、3 周
- C、4-5 周
- D、67 周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/245221224013011331>