

硕士入学考试护理综合-4

(总分: 300.01, 做题时间: 90 分钟)

一、单项选择题(总题数: 120, 分数: 180.00)

1. 当患者胆道完全阻塞时, 因胆汁不能进入肠道, 粪便呈

(分数: 1.50)

- A. 鲜红色
- B. 暗红色
- C. 柏油样便
- D. 陶土色 ✓
- E. 果酱样便

2. 高位小肠梗阻除腹痛外最重要的症状是

(分数: 1.50)

- A. 腹胀明显
- B. 呕吐频繁 ✓
- C. 叩诊呈鼓音
- D. 停止排便、排气
- E. 腹部包块

3. 如下药物中兼有克制幽门螺杆菌作用的是

(分数: 1.50)

- A. 氢氧化铝
- B. 法莫替丁
- C. 奥美拉唑 ✓
- D. 硫糖铝
- E. 米索前列醇

4. 为患者进行灌肠时, 应协助患者采用的卧位是

(分数: 1.50)

- A. 侧卧位 ✓
- B. 俯卧位
- C. 去枕仰卧位
- D. 头高足低位
- E. 头低足高位

5. 男性, 65 岁, 低热, 咳嗽并痰中带血丝 3 个月。胸片显示左肺上叶不张, 少许胸膜腔积液。为明确病理诊断, 深入应首选

(分数: 1.50)

- A. 纵隔镜检查
- B. 开胸探查
- C. 胸腔镜检查
- D. 支气管镜检查 ✓
- E. 经胸壁穿刺活组织检查

6. 下列有关睡眠时相的描述, 对的是

(分数: 1.50)

- A. 成人进入睡眠后, 首先是快波睡眠
- B. 越靠近睡眠的后期, 慢波睡眠的持续时间越长
- C. 两种睡眠时相可直接转为觉醒状态 ✓
- D. 在觉醒状态下可以进入快波睡眠
- E. 慢波睡眠又称异相睡眠

7. 肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是

(分数: 1.50)

- A. 胃肠减压后腹痛减轻
- B. 呕吐后腹胀减轻
- C. 轻度压痛无肌紧张
- D. 肛门排便、排气 ✓
- E. 肠鸣音亢进转为消失

8. 枕骨大孔疝不一样于小脑幕切迹疝的临床体现是

(分数: 1.50)

- A. 头痛剧烈
- B. 呕吐频繁
- C. 意识障碍
- D. 呼吸骤停出现早 ✓
- E. 血压升高，脉缓有力

9. 急性胰腺炎患者禁食的目的是

(分数: 1.50)

- A. 控制饮食
- B. 减少胃液分泌
- C. 减少胰液分泌 ✓
- D. 防止呕吐
- E. 防止胃扩张

10. 观测降温效果，乙醇拭浴后何时测体温

(分数: 1.50)

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟 ✓
- D. 40 分钟
- E. 60 分钟

11. 再生障碍性贫血死亡的重要原因是

(分数: 1.50)

- A. 严重感染
- B. 颅内出血 ✓
- C. 败血症
- D. 进行性贫血
- E. 尿毒症

12. 如下对溃疡性结肠炎临床体现的描述中错误的是

(分数: 1.50)

- A. 轻者可无腹痛症状
- B. 腹痛有便意—疼痛—便后缓和的规律 ✓
- C. 腹泻为最重要症状
- D. 常伴有里急后重
- E. 可出现与自身免疫有关的肠外体现

13. 要素饮食经造瘘口注入时的温度宜为

(分数: 1.50)

- A. 37℃
- B. 38~39℃
- C. 39~40℃
- D. 40~41℃
- E. 41~42℃ ✓

14. 胆囊造影检查下列何种状况下进食高脂肪餐

(分数: 1.50)

- A. 检查前一曰午晚餐及当曰摄片显影良好后午餐
- B. 检查前一曰午餐及当曰摄片显影良好后进食 ✓
- C. 检查前一曰晚餐及当曰摄片显影良好后晚餐
- D. 检查前一曰晚餐及当曰摄片后既食
- E. 检查前一曰午餐及当曰摄片后既食

15. 易氧化和遇光变质, 须装在有色密盖瓶中保留的药物是

(分数: 1.50)

- A. 糖衣片 ✓
- B. 巴比妥
- C. 地西洋(安定)
- D. 氨茶碱
- E. 甲氧氯普胺(胃复安)

16. 目前临床上应用最广泛的治疗腹水的措施是

(分数: 1.50)

- A. 限制水、钠的摄入
- B. 利尿剂的应用 ✓
- C. 放腹水
- D. 输注清蛋白
- E. 腹水浓缩回输

17. 慢性肾小球肾炎患者的饮食护理中, 对的是

(分数: 1.50)

- A. 低盐、低蛋白质、高维生素
- B. 低盐、高蛋白质、高维生素
- C. 高盐、低蛋白质、高维生素
- D. 低盐、低蛋白质、低维生素
- E. 低盐、适量蛋白质、高维生素 ✓

18. 疾病对社会的影响不包括

(分数: 1.50)

- A. 减少社会生产力
- B. 减少和消耗社会的医疗资源
- C. 导致传染
- D. 社会经济的承担加重 ✓
- E. 挥霍社会的医疗资源

19. 胃黏膜保护剂硫糖铝最佳的服药时间应為

(分数: 1.50)

- A. 餐前 2 小时
- B. 餐前 1 小时 ✓
- C. 用餐時
- D. 餐后 2 小时
- E. 夜间顿服

20. 下列哪一种并发症是胃大部切除术后病人的远期并发症

(分数: 1.50)

- A. 术后出血
- B. 十二指肠残端破裂
- C. 胃肠吻合口破裂
- D. 倾倒综合征
- E. 胆汁反流性胃炎 ✓

21. 现代医学已开始如下列哪项作为死亡判断原则

(分数: 1.50)

- A. 心跳停止
- B. 呼吸停止
- C. 脑死亡 ✓
- D. 心电图平直
- E. 瞳孔散大

22. 文化的超地区性, 其含义是

(分数: 1.50)

- A. 有些文化仅存在于某一地区, 不是全人类性文化
- B. 文化一旦在某一地区发展, 就无法為其他地区所接受
- C. 自然科学先是地区文化, 后為超地区文化 ✓
- D. 文化伴随人类的出現和发展而产生与发展
- E. 文化发展初期, 均有明显的超地区特性

23. 原发性高血压最严重的并发症是

(分数: 1.50)

- A. 脑出血 ✓
- B. 充血性心力衰竭
- C. 肾衰竭
- D. 冠心病
- E. 糖尿病

24. 最严重的输液反应是

(分数: 1.50)

- A. 过敏反应
- B. 心脏负荷过重的反应
- C. 发热反应
- D. 空气栓塞 ✓
- E. 静脉炎

25. 风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换术后 1 个月, 凝血功能检查示 PTT 為 20s, 可告知病人

(分数: 1.50)

- A. 继续服用原剂量抗凝药 ✓
- B. 需要增長抗凝药药量
- C. 需要减少抗凝药药量
- D. 需要立既重新检查凝血功能
- E. 使用量合适, 不需要继续监测

26. 為昏迷病人插管至 15cm 時要将其头部托起, 其目的是

(分数: 1.50)

- A. 加大咽喉部通道的弧度 ✓
- B. 以免损伤食管黏膜
- C. 减轻病人痛苦
- D. 防止出現恶心
- E. 使喉部肌肉放松便于插入

27. 為尿潴留患者导尿的目的是

(分数: 1.50)

- A. 测量膀胱容量
- B. 鉴别有无尿闭
- C. 排空膀胱, 防止术中误伤
- D. 减轻患者痛苦 ✓
- E. 记录尿量、观测。肾功能

28. 男性，65 岁，以往进食時偶发哽噎感，胸骨后刺痛，餐后症状消失，近来自觉吞咽困难，明显消瘦，乏力，首先考虑

(分数: 1.50)

- A. 食管炎
- B. 食管癌 ✓
- C. 食管息肉
- D. 胃癌
- E. 胃、十二指肠溃疡

29. 颅内动静脉畸形最常見的首发症状是

(分数: 1.50)

- A. 癫痫
- B. 意识障碍、头痛、呕吐 ✓
- C. 运动障碍
- D. 語言障碍
- E. 感觉障碍

30. 不属于病人资料搜集范围的是

(分数: 1.50)

- A. 病人的一般状况
- B. 病人的生活方式
- C. 病人的用药过敏史
- D. 家庭组员的婚恋史 ✓
- E. 病人对疾病的认识

31. 慢性肾衰竭尿毒症期最重要的体现是

(分数: 1.50)

- A. 水肿
- B. 贫血
- C. 消化道症状
- D. 水、电解质及酸碱平衡失调 ✓
- E. 血肌酐增高

32. 男性，38 岁，肺叶切除术后 8 天，出現发热、刺激性咳嗽、咳血痰、呼吸困难，胸腔引流管排出大量气体，疑為支气管胸膜瘘，為了确诊，应做的检查是

(分数: 1.50)

- A. X 线胸片
- B. 支气管造影
- C. 支气管镜检
- D. 胸部 CT
- E. 向胸膜腔内注入亚甲藍液 1~2ml ✓

33. 下列选项中克制胃酸分泌最强的药物是

(分数: 1.50)

- A. 碳酸氢铝
- B. 西咪替丁
- C. 奥美拉唑 ✓
- D. 硫糖铝
- E. 枸橼酸铋钾

34. 出血坏死性胰腺炎最常見的并发症是

(分数: 1.50)

- A. 化脓性感染
- B. MODS
- C. 胰腺假囊肿

D. 胰腺组织纤维化

E. 休克 ✓

35. 急性肾小球肾炎最常见的临床体现为

(分数: 1.50)

A. 少尿、水肿

B. 少尿、高血压

C. 血尿、水肿、高血压 ✓

D. 血尿、水肿、高血压、肾衰竭

E. 水肿、高血压

36. 冠心病猝死的原因多为

(分数: 1.50)

A. 窒息

B. 脑梗死

C. 肺梗死

D. 心脏破裂

E. 严重的心律失常 ✓

37. 治疗心室颤动应首选

(分数: 1.50)

A. 利多卡因

B. 溴苄胺

C. 奎尼丁

D. 直流电除颤 ✓

E. 普鲁卡因胺

38. 当患者有炎症感染时，皮肤出现的变化是

(分数: 1.50)

A. 发红 ✓

B. 湿冷

C. 发绀

D. 皮温减少

E. 苍白

39. 男性，50岁，咽部异物感1月，肝炎病史，深入检查，首先应考虑

(分数: 1.50)

A. 食管镜

B. 胸部CT

C. 食管超声波

D. 食管X线钡餐检查 ✓

E. 带网气囊食管脱落细胞检查

40. 过敏性紫癜最常见的类型是

(分数: 1.50)

A. 腹型

B. 紫癜型 ✓

C. 关节型

D. 肾型

E. 混合型

41. 留置胸膜腔闭式引流管的病人出现引流管脱出，首先要

(分数: 1.50)

A. 给病人吸氧

B. 立既汇报医生

C. 急送手术室处理

- D. 把脱出的引流管重新插入
- E. 用无菌凡士林纱布、厚层纱布封闭引流口 ✓
42. 下列哪项是护理道德修养的特点
(分数: 1.50)
- A. 重要性
- B. 自觉性 ✓
- C. 被动性
- D. 复杂性
- E. 理论性
43. 风湿性心瓣膜病, 病变最常受累的瓣膜是
(分数: 1.50)
- A. 二尖瓣和积极脉瓣
- B. 三尖瓣和肺动脉瓣
- C. 积极脉瓣
- D. 三尖瓣
- E. 二尖瓣 ✓
44. 肝性脑病患者用精氨酸治疗的目的是
(分数: 1.50)
- A. 為大脑提供能量
- B. 减少肠道 pH 值, 减少氨吸取
- C. 增长尿酸合成, 减少血氨 ✓
- D. 克制大脑假神经递质合成
- E. 克制肠道产尿素酶的细菌
45. 健康教育学围绕什么中心而发展
(分数: 1.50)
- A. 以人类社会發展為中心
- B. 以健康教育發展為中心
- C. 以提高人类健康水平為中心 ✓
- D. 以提高健康保健水平為中心
- E. 以人类健康发展為中心
46. 下列不属于门脉高压侧支循环的是
(分数: 1.50)
- A. 食管和胃底静脉曲张
- B. 腹壁静脉曲张
- C. 脐周静脉曲张
- D. 痔静脉曲张
- E. 下肢静脉曲张 ✓
47. 胆道 T 管引流的病人胆道远端畅通的体现是
(分数: 1.50)
- A. 腹痛和黄疸减轻, 引流量增多
- B. 体温正常, 引流量增多
- C. 上腹胀痛, 引流量骤减
- D. 食欲好转, 黄疸消退, 引流量减少 ✓
- E. 黄疸消退, 引流量增多, 食欲无变化
48. 质子泵克制剂用于上消化道出血的重要机制是
(分数: 1.50)
- A. 使局部血管收缩
- B. 增进凝血因子的作用
- C. 增进血小板的生成

- D. 增进胃酸分泌，减少胃液 pH
- E. 克制胃酸分泌，提高胃液 pH ✓
49. 三腔两囊管的护理要点不包括
(分数: 1.50)
- A. 使用前检查管路与否漏气
- B. 先向胃气囊充气
- C. 胃气囊充气量为 150~200ml
- D. 每隔 12 小时气囊放气 20~30 分钟
- E. 若无出血可立既拔管 ✓
50. 消化性溃疡最重要的症状是
(分数: 1.50)
- A. 恶心、呕吐
- B. 缓脉、多汗
- C. 腹胀、腹痛
- D. 暖气、反酸
- E. 节律性上腹部疼痛 ✓
51. 胃溃疡病人经典的疼痛节律是
(分数: 1.50)
- A. 疼痛—进食—缓和
- B. 进食—疼痛—缓和 ✓
- C. 疼痛—禁食—疼痛
- D. 疼痛—便意—便后缓和
- E. 便意—疼痛—便后缓和
52. 下列属于血液透析相对禁忌证的是
(分数: 1.50)
- A. 急性肾衰竭伴高钾血症
- B. 慢性肾衰竭
- C. 急性药物中毒
- D. 急性毒物中毒
- E. 严重高血压 ✓
53. 肝性脑病第三期的重要体现是
(分数: 1.50)
- A. 性格变化和行為异常
- B. 意识錯乱和睡眠障碍
- C. 昏睡和精神錯乱 ✓
- D. 意识完全丧失
- E. 扑翼样震颤无法引出
54. 休克患者的脉搏特性是
(分数: 1.50)
- A. 强大有力
- B. 细弱无力 ✓
- C. 动脉管壁变硬，失去弹性
- D. 单位时间内脉率少于心率
- E. 每隔一种正常搏动后出现一次早搏
55. 护理人员应嘱坐在轮椅上的患者
(分数: 1.50)
- A. 扶好扶手，尽量向后坐
- B. 扶好扶手，尽量向前坐
- C. 扶好扶手，身体向前倾 ✓

- D. 两手放膝上，向前坐
- E. 两手放膝上，尽量向后坐

56. 护理人员应用自己的专业知识及技能决定护理措施及护理服务，属于

(分数: 1.50)

- A. 独立性护理功能 ✓
- B. 合作性护理功能
- C. 技术性护理功能
- D. 依赖性护理功能
- E. 艺术性护理功能

57. 急性心肌梗死的对的护理措施是

(分数: 1.50)

- A. 绝对卧床休息 ✓
- B. 高蛋白、高脂肪饮食
- C. 不必减少或停止探视
- D. 出现心前区疼痛可以不处理
- E. 防止褥疮，每两小时翻身 1 次

58. 出现黑便提醒上消化道出血量在

(分数: 1.50)

- A. >5ml
- B. 5~20ml
- C. 20~30ml
- D. 30~50ml
- E. 50ml 以上 ✓

59. 下列消毒剂中属于气体杀菌剂的是

(分数: 1.50)

- A. 甲醛
- B. 环氧乙烷 ✓
- C. 过氧乙酸
- D. 乙醇
- E. 戊二醛

60. 下列降压药物在治疗过程中常易引起干咳症状的是

(分数: 1.50)

- A. 美托洛尔
- B. 维拉帕米
- C. 尼群地平
- D. 伊贝沙坦
- E. 卡托普利 ✓

61. 缺铁性贫血补充铁剂的首选措施是

(分数: 1.50)

- A. 口服给药 ✓
- B. 静脉给药
- C. 肌肉注射
- D. 皮下注射
- E. 皮内注射

62. 周围型肺癌是指癌肿位于

(分数: 1.50)

- A. 主支气管如下
- B. 细支气管，位置在肺的周围
- C. 叶支气管如下

- D. 肺门以外的肿瘤，位置在肺的周围
- E. 肺段支气管开口如下，位置在肺的周围 ✓

63. 内痔的好发部位是截石位的

(分数: 1.50)

- A. 2 点、7 点、11 点
- B. 2 点、6 点、10 点
- C. 3 点、9 点、12 点
- D. 3 点、7 点、11 点 ✓
- E. 4 点、8 点、12 点

64. 有关科尔伯格道德发展理论的陈說，錯誤的是

(分数: 1.50)

- A. 道德判断是一种是非对錯的问题 ✓
- B. 不一样文化环境中道德发展的内容不一样
- C. 并非所有人的道德发展都能到达最高水平
- D. 每个人道德观念形成的時間并不完全相似
- E. 前习俗道德期以赏或罚作為道德判断的原则

65. 终末血尿提醒病变位于

(分数: 1.50)

- A. 尿道
- B. 膀胱颈以上
- C. 后尿道或膀胱基底部 ✓
- D. 肾脏
- E. 输尿管

66. 晚期肝硬化最常見的死亡原因是

(分数: 1.50)

- A. 上消化道出血
- B. 感染
- C. 肝性脑病 ✓
- D. 原发性肝癌
- E. 肝肾综合征

67. 鼓励肾盂肾炎患者多饮水的重要目的是

(分数: 1.50)

- A. 加速退热
- B. 维持体液平衡
- C. 减少药物毒副作用
- D. 保持口腔清洁
- E. 增进细菌、毒素排出 ✓

68. 奥瑞姆認為人的自护能力包括多少方面

(分数: 1.50)

- A. 11 个
- B. 10 个 ✓
- C. 9 个
- D. 8 个
- E. 7 个

69. 化学致冷袋维持時間為

(分数: 1.50)

- A. 1 小時
- B. 2 小時 ✓

C. 3 小時

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/246042100225010234>