

## 放射肿瘤科考试练习题及答案（三）

### 一、单选题（共 90 题，每题 1 分）

1、患者，男，18 岁，2 个月前因急性脓胸经多次胸腔穿刺抽脓及抗菌治疗后，仍有低热、消瘦，胸部 X 片右胸仍可见有包裹性脓腔，入院后行胸腔闭式引流术，每日引流脓液 30~50ml，胸片及胸部 CT 显示右下胸部有一 10cm×6cm 残腔，壁厚约 2mm，未见钙化，肺内未见病变，进一步治疗应选择 C

- A、继续改进胸腔引流
- B、将闭式引流改为开放引流
- C、胸膜纤维板剥除术
- D、胸膜肺切除术
- E、改进全身情况，消除中毒症状和营养不良

2、慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时，最主要的临床表现是 C

- A、咳嗽加重
- B、咳白色泡沫痰与黏液痰
- C、咳脓性痰且痰量增加
- D、肺部有哮鸣音
- E、肺底部有细湿啰音

3、男性，30 岁，左上腹被车撞伤 2 小时，面色苍白，烦躁，脉搏细弱，120 次 / 分，血压 70 / 50mmHg，下列哪项检查最有诊断意义 D

- A、急查血红蛋白
- B、腹部 X 线检查
- C、腹部超声
- D、腹腔穿刺
- E、腹部 CT

4、女，35岁，腹胀、便秘、乏力6个月。近1周来症状加重伴呕吐。查体：  
T37.6℃，右腹可触及5cm×3cm大小包块，质中等，边界不清，轻触痛。胸片示  
右侧胸膜肥厚，右上肺钙化灶。首先考虑的临床诊断是 B

- A、右侧卵巢肿物
- B、肠结核
- C、结肠癌
- D、克罗恩病
- E、阑尾周围脓肿

5、下列不能提示胃溃疡恶变的是 E

- A、疼痛失去原有规律性、间歇性
- B、进行性消瘦和贫血
- C、上腹可触及肿块
- D、大便潜血试验持续阳性
- E、呕吐胆汁样物

6、上消化道大出血最常见的原因是 D

- A、门脉高压症
- B、出血性胃炎
- C、胃癌
- D、胃十二指肠溃疡
- E、应激性溃疡

7、男性，45岁，今年2月发热、咳嗽，胸透发现右上肺片状阴影，抗感染治疗好转，4月又类似发作一次，自8月中旬以来又发热、咳嗽，胸片又发现右上肺大片致密阴影，给予抗感染治疗未见好转。查体肺部未闻干湿啰音，白细胞 $11.0 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞80%，淋巴细胞20%，哪项诊断可能性最大 C

- A、肺炎链球菌性肺炎延迟消散
- B、病毒性肺炎
- C、阻塞性肺炎

D、干酪性肺炎

E、肺炎支原体肺炎

8、患者，女，35岁，2个月来每于饭后1小时上腹疼痛。进食不缓解，呕吐后减轻。需做以下哪项检查有助于诊断 **B**

A、胃液分析

B、胃镜

C、腹部B超

D、CT

E、粪隐血试验

9、男性，76岁。患COPD病史30年，因咳黄痰伴发热、呼吸困难住院治疗。在治疗过程中表现四肢抖动，神志恍惚，血气结果： $pH7.46$ ， $PaO_269\text{mmHg}$ ， $PaCO_279\text{mmHg}$ ， $HCO_3^-42\text{mEq/L}$ ， $BE17\text{mEq/L}$ 。问题：下列哪一类型酸碱紊乱可能性大？ **C**

A、呼吸性酸中毒

B、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

C、呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

D、呼吸性碱中毒

E、以上都不是

10、患者，男性，66岁，咳嗽，听诊右侧呼吸音减低。最有可能的选择是 **D**

A、右侧液气胸

B、右侧肺大泡

C、右侧气胸

D、右侧胸腔积液

E、支气管扩张并感染

11、慢性支气管炎发展成阻塞性肺气肿的过程中最先发生的病理改变是 **B**

A、肺泡膨胀

B、细支气管不完全阻塞

C、肺泡壁弹性减退

D、肺小动脉痉挛

E、肺部感染

12、以下措施用于肝硬化食管静脉曲张破裂出血治疗哪项是错误的：A

A、吗啡镇静

B、输新鲜血

C、垂体后叶素

D、内镜下注射硬化剂

E、三腔管压迫止血

13、患者，男，36岁，便血2年，初为排便后有少量鲜血滴出，无痛，便后出血自行停止。近半年来偶有块状物自肛门脱出，便后自行回缩，最可能的诊断是D

A、直肠癌

B、混合痔

C、外痔

D、内痔

E、直肠脱垂

14、患者，男，45岁。疲乏、贫血4个月入院。既往有肝炎病史10年，查体：睑结膜略苍白，腹软，可见腹壁静脉曲张，肝肋下未触及，脾大，移动性浊音阳性。

Plt $50 \times 10^9 / L$ ，血小板减少最可能的原因是D

A、营养不良

B、溶血

C、骨髓抑制

D、脾功能亢进

E、出血

15、关于上消化道出血的定义，正确的是D

A、贲门以上部位出血

B、幽门以上部位出血

C、空肠以上部位出血

D、Treitz 韧带以上部位出血

E、回肠以上部位出血

16、男性。60 岁，近 2 个月餐后很快上腹痛，反酸，制酸治疗无效，暖气。近 1 月反复呕吐，吐物为酸酵性宿食，可能的疾病是 D

A、慢性胃体炎幽门梗阻

B、慢性胃窦炎并幽门梗阻

C、胃体溃疡并幽门梗阻

D、幽门管溃疡并幽门梗阻

E、巨大溃疡

17、男性，36 岁。餐后中上腹痛 4 小时伴黄疸。化验血、尿淀粉酶升高，B 超示胆总管下段结石影，可采用 C

A、抗胆碱能药物

B、抗生素

C、Oddi 括约肌切开术

D、抑肽酶

E、禁食及胃肠减压

18、为明确出血原因。待病情稳定后，最好行下列哪项检查 C

A、腹部 B 超

B、吞线试验

C、胃镜检查

D、钡餐透视

E、腹部 CT

19、DOTS 是下列哪一项的英文缩写 C

A、全球肺结核防治规则

B、肺结核治疗原则

C、全程督导短程化学治疗

D、卡介苗接种

E、结核菌素试验

20、男，22岁。饥饿性上腹痛伴反酸1个月余。2小时前呕吐1次，暗红色，量为200ml。体重无明显变化。否认慢性肝病史。查体：贫血貌，腹软，上腹部有压痛，无反跳痛，肝脾肋下未触及。应首先考虑的出血原因是A

A、消化性溃疡

B、急性糜烂性胃炎

C、胃粘膜脱垂

D、食管胃底静脉曲张破裂

E、胃癌

21、Courvoisier征是指胰腺癌患者出现 A

A、无痛性胆囊肿大

B、左上腹或脐周血管杂音

C、肝大

D、腹膜转移

E、胰源性腹水

22、男性，18个月患儿，阵发性哭闹一天，伴有呕吐，呕吐物内有蛔虫，腹痛时右上腹部可触及一肿块，轻压痛，右髂窝空虚，肠鸣音亢进，大便呈果酱样，蛔虫卵阳性，立位腹部X线平片见数个小液气平面，首先应考虑为 C

A、肠道蛔虫

B、蛔虫性肠梗阻

C、肠套叠

D、肠肿瘤

E、肠扭转

23、某肺源性心脏病病人急性加重2天入院，神志清楚， $\text{PaO}_2 30\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 72\text{mmHg}$ ，吸入40%浓度氧后，测 $\text{PaO}_2 80\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 98\text{mmHg}$ ，出现昏迷，发生上述情况的原因是 E

- A、气道阻力增加
- B、感染中毒性脑病
- C、心排血量降低
- D、基础代谢率增加
- E、通气受到抑制

24、肺血栓栓塞症是 A

- A、肺栓塞最常见的类型
- B、来自动脉系统或左心的血栓栓塞肺动脉或其分支
- C、以呼吸功能亢进为主要临床表现
- D、有冠状动脉循环功能障碍
- E、可引起心肌梗死

25、某肺源性心脏病患者，经综合治疗一般状况好转，已可在床上活动，今晨出现兴奋躁动， $\text{PaCO}_2 60\text{mmHg}$ ， $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$ 。pH7.5，BE+20mmol / L，血K+3.2mmol / L，血Cl-64mmol / L。此患者治疗应采取 E

- A、补碱性药物
- B、停止吸氧
- C、加大利尿药物剂量
- D、给氯丙嗪
- E、补氯化钾和盐酸精氨酸

26、纵隔偏向患侧常见于 D

- A、血胸
- B、开放性气胸
- C、张力性气胸
- D、慢性脓胸
- E、急性脓胸

27、下列哪种疾病不适合行胆囊切除术？ B

- A、胆囊结石

B、胆总管结石

C、胆囊癌

D、慢性胆囊炎，胆囊积水

E、胆囊息肉

28、诊断性腹腔穿刺和腹腔灌洗术，在诊断腹部损伤时，其阳性率可达 A

A、90%

B、80%

C、70%

D、60%

E、50%

29、下列有关肺心病和心力衰竭的说法哪项是错误的 A

A、国内研究表明，肺心病者肺动脉楔压均超过正常范围

B、以右心衰为主

C、少数患者也可见左心衰

D、反复肺部感染，细菌毒素对心肌的毒性作用可促进心衰

E、心肌缺氧，乳酸堆积，高能磷酸键合成降低，使心肌功能受损

30、下列关于门静脉的描述，哪项是错误的？ D

A、未阻断的情况下，门静脉压的正常值约在 13~24cmH<sub>2</sub>O 之间

B、门静脉压力增高时可出现交通支扩张、腹水等

C、门静脉主干是由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成

D、门静脉与腔静脉之间的交通支最主要的是腹膜后交通支

E、门静脉无瓣膜

31、患者，女性，50岁，乳腺病变术后两年评估。最有可能的选择是 B

A、张力性气胸

B、肺部转移瘤

C、胸腔积液

D、弥漫性肺气肿



E、主支气管异物

32、一名男性患者，35岁，3天前受寒后头痛，畏寒，继而高热，咳嗽，咳铁锈色痰，左侧胸痛，气急不能平卧，X线检查：左肺下叶可见大片阴影。应诊断为 D

A、肺转移瘤

B、肺出血肾炎综合征

C、肺癌继发感染

D、大叶性肺炎

E、支气管扩张症

33、关于消化性溃疡的叙述，下列哪项不正确 D

A、在临床上，十二指肠溃疡较胃溃疡多见

B、绝大多数病例病变位于胃和十二指肠

C、男性发病多于女性

D、十二指肠溃疡较胃溃疡容易癌变

E、全世界均多见，童年及老年非罕见

34、下列哪一项不是继发性腹膜炎的病因 D

A、化脓性输卵管炎

B、阑尾穿孔

C、胃十二指肠溃疡穿孔

D、肝硬化继发腹水感染

E、后腹膜血肿继发感染

35、男性，42岁，慢性肝炎史，近2个月右上腹持续闷痛，低热，消瘦明显，体检：贫血貌，肝于右肋弓下触及边缘，质硬，轻度压痛，HB80g/L，AFP(+)，便潜血试验阳性，最可能是 E

A、慢性胆囊炎急性发作

B、肝脓肿并胆道出血

C、阿米巴性肝脓肿

D、慢性肝炎，肝硬化

36、十二指肠溃疡伴有幽门不全梗阻者应眩灸治疗方法是 B

- A、胃管减压，输液疗法
- B、胃大部切除术
- C、高选择性迷走神经切断术
- D、选择性迷走神经切断术加幽门成形
- E、胃空肠吻合术

37、男性，40岁，上腹部疼痛5年，腹胀纳差。查体：上腹轻压痛。胃液分析：

MAO为3mmol/L。最可能的疾病是 B

- A、溃疡性胃癌
- B、慢性萎缩性胃炎
- C、慢性浅表性胃炎
- D、十二指肠球溃疡
- E、胃溃疡

38、冠心病导致心梗与肺栓塞的区别 E

- A、心电图改变
- B、胸闷
- C、胸痛
- D、心电图心肌缺血样改变
- E、心肌酶水平标志性变化

39、男，17岁，3小时前被自行车撞于右胸部，伤后疼痛，呼吸困难，查体：脉搏120次/分，血压12.0/9.0kPa。呼吸19次/分，右胸压痛(+)，叩诊浊音，右肺听诊呼吸音消失，诊断最可能是 D

- A、张力性气胸
- B、血胸
- C、气胸
- D、血气胸

40、患严重急性胰腺炎的病人不需要 B

- A、抗生素
- B、哌替啶
- C、液体治疗
- D、氯化钠
- E、钙

41、患者，男性，45岁，咳嗽多日，左侧胸痛伴发热。最有可能的选择是 B

- A、右肺肺炎
- B、左侧肺炎
- C、右肺气胸
- D、左侧气胸
- E、胸部 CT 正常

42、不属于十二指肠球部溃疡并发症的是 C

- A、急性穿孔
- B、幽门梗阻
- C、癌变
- D、出血
- E、慢性穿孔

43、怀疑前列腺癌骨转移时哪一项化验指标特异性最强 E

- A、碱性磷酸酶
- B、CEA 测定
- C、血中儿茶酚胺含量测定
- D、谷丙转氨酶测定
- E、酸性磷酸酶

44、治疗暴发型溃疡性结肠炎的首选方法是： C

- A、大剂量抗胆碱能药物

C、大剂量肾上腺糖皮质激素

D、免疫抑制剂

E、手术治疗

45、诊断急性胰腺炎的重要依据是 D

A、上腹部疼痛

B、腹胀，排气、排便停止

C、肠鸣音减弱

D、血清淀粉酶超过 500U / dl(Somogyi 法)

E、腹部 X 线平片

46、男，68 岁。反复咳嗽、咳痰、气促 41 年，心悸、水肿 5 年，近 1 周来症状加重入院。查体：呼吸急促，双肺可闻及干、湿啰音，P2 亢进，三尖瓣区闻及 3 / 6 级收缩期杂音。肝右肋下 4cm，压痛 (+)，肝颈回流征阳性，下肢水肿。此时首选的治疗是使用 D

A、强心剂

B、利尿剂

C、心血管扩张剂

D、抗生素

E、祛痰剂

47、女性，26 岁，低热。腹泻 3 个月，大便为糊样，无脓血。近 1 周阵发性脐周痛。查体：右下腹触及 4cm×5cm 包块。质中等，轻触痛，肠鸣音亢进。血沉 67mm / h，PPD 皮试强阳性，最可能的疾病是 A

A、肠结核

B、盲肠癌

C、右侧卵巢囊肿

D、阑尾炎

E、阑尾周围脓肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246230133144010230>