

2024 辽宁省古塔区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

- A: 姿势反射障碍
- B: 不宁腿综合征
- C: 体位性低血压
- D: 神经精神障碍

答案：A

2. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 注射剂配制溶媒、浓度
- B: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效
- C: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
- D: 合理用药信息

答案：D

3. 痉挛性便秘可选

- A: 比沙可啶
- B: 硫酸镁
- C: 聚乙二醇粉
- D: 乳果糖

答案：C

4. （2018 年真题）阿托伐他汀钙的日剂量范围是（）

A: 40~200mg

B: 10~80mg

C: 5~20mg

D: 10~20mg

答案：B

5. 60 岁以上老年人用药剂量应酌减，一般给予成人剂量的

A: 45355

B: 45295

C: 45356

D: 45327

答案：A

6. 青霉素较难在乳汁中出现的机制是

A: 呈弱酸性

B: 解离度大

C: 在母体血浆中处于结合状态

D: 呈弱碱性

答案：A

7. 以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

A: 查药品，对药名、剂型、规格、数量

B: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量

C: 查临床诊断，对用药合理性

D: 查处方，对临床诊断

答案：A

8. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 莫西沙星
- B: 红霉素
- C: 头孢唑林
- D: 青霉素

答案：B

9. （2015 年真题）患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是（）。

- A: 阿米卡星
- B: 头孢哌酮舒巴坦
- C: 头孢拉定
- D: 亚胺培南西司他丁

答案：C

10. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

- A: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- B: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血
- C: 规律性上腹痛
- D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：D

11. （2017 年真题）药师在审核处方时，无需要求确认或重新开处方的情形是（）

- A: 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
- B: 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲

C: 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上

D: 诊断为麻疹,使用阿莫西林抗感染治疗

答案: C

12. 患者,女,66岁,身高156cm,体重61kg。空腹血糖7.8mmol/L,餐后血糖11.2mmol/L,糖化血红蛋白8.7%。

A: 换用其他作用机制的口服降糖药

B: 增加一种口服降糖药

C: 启用胰岛素治疗

D: 增加现用口服降糖药的剂量

答案: C

13. 服药时饮茶可降低疗效的是

A: 维生素A

B: 西咪替丁

C: 硫酸亚铁

D: 格列本脲

答案: C

14. 处方是医院药品消耗及药品经济收入结帐的凭证和原始依据

A: 有效性

B: 法律性

C: 经济性

D: 技术性

答案: C

15. 用于疼痛治疗、耐受性最好的非甾体抗炎药是

A: 贝诺酯

B: 阿司匹林

C: 布洛芬

D: 塞来昔布

答案：C

16. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

A: 罗格列酮

B: 阿司匹林

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案：A

17. 在病情危重抢救时最常用的是

A: 口服给药

B: 静脉注射

C: 直肠给药

D: 肌肉注射

答案：B

18. 干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

A: 四环素

B: 青霉素

C: 链霉素

D: 磺胺嘧啶

答案：B

19. 抑制 5- α 还原酶而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 前列康
- D: 黄酮哌酯

答案：A

20. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

- A: 青霉素
- B: 洛伐他汀
- C: 奥美拉唑
- D: 红霉素

答案：B

21. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 碳酸氢钠
- C: 小檗碱
- D: 胰酶

答案：D

22. 具有末梢神经炎毒性，必要时需补充 B 族维生素和神经营养剂的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 环磷酰胺

C: 长春新碱

D: 甲氨蝶呤

答案: C

23. 属于 P-糖蛋白抑制剂的药物是

A: 卡马西平

B: 利福平

C: 圣约翰草提取物

D: 维拉帕米

答案: D

24. 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC 药物的是

A: 《中国国家处方集》

B: 《马丁代尔药物大典》

C: 《美国药典药物信息》

D: 《药物事实与比较》

答案: D

25. 癫痫的药物治疗癫痫强直-阵挛性发作首选

A: 拉莫三嗪

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案: D

26. 常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 磺胺醋酰

B: 碳酸氢钠

C: 苯巴比妥

D: 麻黄碱

答案: B

27. 在药物信息咨询服中，二级信息资料最突出的优势是

A: 提供的信息最新

B: 读者能够自己评价信息，免受他人观点影响

C: 对某一个具体问题提供的信息全面、详实

D: 能够很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选

答案: D

28. (2015 年真题) 细菌感染患者可出现 ()。

A: 血小板增多

B: 中性粒细胞增多

C: 红细胞/血红蛋白减少

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案: B

29. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体: 右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果: 血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 氢氯噻嗪和阿司匹林

B: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

C: 美托洛尔和辛伐他汀

D: 美托洛尔和赖诺普利

答案: A

30. 焦虑障碍最常见的表现形式为

- A: 急性焦虑
- B: 广泛性焦虑
- C: 惊恐发作
- D: 社交焦虑障碍

答案：B

31. 以下药物中，可能导致癫痫发作（药源性神经系统疾病）的药物是

- A: 碳酸镁
- B: 诺氟沙星
- C: 利血平
- D: 麻黄碱

答案：D

32. 具有球后视神经炎不良反应的药物是

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：B

33. 归属"患者基本情况"的是

- A: 主要实验室检查数据
- B: 联合用药
- C: 医保和费用支付情况
- D: 临床诊断

答案：C

34. (2016 年真题) 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是 ()。

- A: 乳酶生片
- B: 西地碘片
- C: 硫普罗宁片
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案: D

35. 可导致男性乳房发育的降压药是

- A: 螺内酯
- B: 氯沙坦
- C: 硝苯地平
- D: 利血平

答案: A

36. 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

- A: I 期临床试验
- B: II 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: IV 期临床试验

答案: A

37. 容易在乳汁中排泄的药物的理化特性主要是

- A: 弱酸性
- B: 在脂肪中极易溶解
- C: 在水中容易溶解
- D: 分子量<200

答案：D

38. 提示"每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用"，是针对

- A: 药品有效期
- B: 特殊剂型用法
- C: 药品贮存
- D: 特殊装置药品

答案：C

39. 早期 AD 患者选用

- A: 加兰他敏
- B: 司来吉兰
- C: 金刚烷胺
- D: 普拉克索

答案：A

40. 患者，男，43 岁。误服过量工业碘，可中和碘，用于碘中毒的洗胃液是

- A: 牛奶与水等量混合
- B: 淀粉溶液
- C: 3%~5%鞣酸溶液
- D: 活性炭混悬液

答案：B

41. 急性痛风性关节炎常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的部位是

- A: 第一跖趾关节?

B: 膝关节?

C: 腕关节?

D: 踝关节?

答案: A

42. 医师咨询"加替沙星用于糖尿病患者抗感染", 属于

A: 药物相互作用

B: 给药途径

C: 新药信息

D: 禁忌证

答案: D

43. 可出现体位性低血压的是

A: 哌替啶

B: 苯二氮

C: 双嘧达莫

D: 甲氧氯普胺

答案: C

44. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

A: 链霉素

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案: D

45. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起的尿常规检查异常是

A: 尿沉渣尿酸盐结晶

- B: 尿沉渣管型异常
- C: 尿沉渣结晶异常
- D: 尿沉渣白细胞增多

答案：B

46. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid iv gtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid iv gtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 30ml，早餐时一次性服用
- B: 每次 10ml，每日 3 次，餐后给药
- C: 每次 10ml，每日 3 次，餐前给药
- D: 30ml，晚餐时一次性服用

答案：A

47. 与患者进行沟通时沟通技巧不包括

- A: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度
- B: 尽量使用专业性术语
- C: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多
- D: 认真聆听，使用通俗易懂的语言

答案：B

48. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次/分，R22 次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

A: 抗肿瘤药物均采用静脉给药

B: 每 21 天为 1 个疗程

C: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药

D: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量

答案：D

49. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

A: 药物制剂因素

B: 生活和饮食习惯

C: 生理因素

D: 药物的使用

答案：A

50. 氟乙酰胺中毒最突出的表现是

A: 抽搐

B: 呕吐物有蒜臭味

C: 口内有金属味

D: 腐蚀性口腔炎

答案：A

51. 不需要向指定的药品经营单位采购，但需要向具有相关药品经营资质企业购买的是

A: 贵重药品

B: 麻醉药品和第一类精神药品

C: 第二类精神药品

D: 高警示药品

答案：C

52. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

B: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

C: 四环素 500mgtid+甲硝唑 400mgtid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

D: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

答案：C

53. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 D 级的是

- A: 卡马西平
- B: 二甲双胍
- C: 雷尼替丁
- D: 泮托拉唑

答案：A

54. 患者，77 岁，因感冒发热咳嗽，自服酚麻美敏片、维 C 银翘片，三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 氯苯那敏
- C: 银翘
- D: 维生素

答案：B

55. 可沉淀大部分有机物及无机物的是

- A: 鸡蛋白
- B: 药用炭混悬液
- C: 3%~5%鞣酸溶液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：C

56. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶开始升高

- A: 2~12
- B: 1
- C: 48~72
- D: 12~72

答案：A

57. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 病因未明而应用两种以上的药物
- B: 美扑伪麻片用于伴有青光眼的感冒患者
- C: 滥用糖皮质激素、人血白蛋白
- D: 忽略药品说明书的提示用药

答案：C

58. 急、慢性肾小球肾炎可引起

- A: 尿酸碱度增高
- B: 尿酸碱度降低
- C: 尿蛋白检测阳性
- D: 尿胆红素检测阳性

答案：C

59. (2015 年真题) 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药是 ()。

- A: 奥美拉唑
- B: 维生素 B6
- C: 昂丹司琼
- D: 雷尼替丁

答案：C

60. 左旋多巴的禁用范围是

- A: 3 岁以下幼儿

- B: 1 岁以下婴儿
- C: 12 岁以下儿童
- D: 8 岁以下儿童

答案：A

61. 处方是医疗机构的重要医疗文书，具有

- A: 法律性、技术性和经济性
- B: 技术性、经济性和合法性
- C: 技术性、有效性和经济性
- D: 经济性、法律性和合理性

答案：A

62. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

- A: 西格列汀
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 格列吡嗪

答案：B

63. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 血糖不降
- B: 低血糖症状

C: 过敏反应

D: 血压升高

答案：B

64. 服药后饮水冲淡对感受器刺激作用的药物是

A: 抗尿结石药

B: 利胆药

C: 苦味健胃药

D: 抗利尿药

答案：C

65. 有关一级信息的特点描述，错误的是

A: 含有研究的具体细节

B: 结论正确

C: 对读者专业水平要求高

D: 内容比二、三级信息更新

答案：B

66. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状就诊，医生处方 1%盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

A: 滴鼻后，要静卧 3~5 分钟

B: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净

C: 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数

D: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

答案：C

67. (2016 年真题) 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A: 适量

B: 左眼

C: 右眼

D: 立即

答案：B

68. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

A: 链激酶

B: 华法林

C: 肝素

D: 噻氯匹定

答案：D

69. 患者，女，63 岁，患有支气管哮喘 3 年。近日出现咳嗽、多痰、发热（体温 38.7℃）等症状，家人来药店购药。针对患者的情况，药师给予的建议是

A: 建议头孢克洛干混悬剂 250mg tid、愈创木酚甘油醚片 0.2g tid、布洛芬 0.2g qid 在家治疗

B: 建议家属送患者去医疗机构就诊

C: 建议头孢氨苄胶囊 250mg qid、氨溴索 10ml qd、右美沙芬 15mg tid 在家治疗

D: 建议左氧氟沙星胶囊 400mg qd、氨溴索 10ml tid、对乙酰氨基酚 300mg qid 在家治疗

答案：B

70. 患者，男，62 岁，临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾，产生的药物相互作用属于（）

A: 增加靶器官药物浓度，药品不良反应减少

- B: 拮抗作用,药品不良反应增加
- C: 降低抗药性,疗效增加
- D: 敏感化作用,药品不良反应增加

答案: C

71. 易引起心动过缓的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 氟尿嘧啶
- C: 阿霉素
- D: 紫杉醇

答案: D

72. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物,制成同一剂型,由于处方组成不同而表现不同
- B: 同一药物,剂型不同,其副作用、毒性不同
- C: 同一药物,制成同一剂型,由于制备工艺不同而表现不同
- D: 同一药物,剂型不同,其起效的快慢、作用强度和持续时间不同

答案: D

73. 有关"书写处方药品剂量与数量"的叙述中,最正确的是

- A: 按照药品说明书
- B: 不能超过药品说明书中的用量
- C: 以阿拉伯数字书写
- D: 以罗马数字书写药品用量

答案: C

74. 米索前列醇所致的主要不良反应是

- A: 神经毒性

- B: 皮炎
- C: 腹痛
- D: 性功能减退

答案：C

75. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 替米沙坦
- B: 二甲双胍
- C: 别嘌醇
- D: 奥利司他

答案：B

76. 运动员禁用药物中，蛋白同化激素产生的危害是

- A: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- B: 易造成人体严重脱水、肾衰竭
- C: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
- D: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

答案：D

77. 治疗水疱型脚癣宜选用()

- A: 氢化可的松软膏
- B: 复方苯甲酸酊
- C: 阿昔洛韦软膏
- D: 维 A 酸乳膏

答案：B

78. 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是()

- A: 采用两种方式核对患者身份
- B: 双人核对
- C: 使用药片通用名
- D: 采用电子处方系统

答案：B

79. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 美洛昔康
- B: 尼美舒利
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 双氯芬酸钠

答案：C

80. 属于浓度依赖性抗生素的是

- A: 林可霉素
- B: 青霉素
- C: 多黏菌素
- D: 美沙拉秦肠溶片

答案：C

81. 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释 OS. 是指

- A: 左眼
- B: 右眼
- C: 立即
- D: 适量

答案：A

82. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 1 型糖尿病
- B: 肥胖症
- C: 甲状腺功能亢进症
- D: 2 型糖尿病

答案：D

83. 下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是

- A: 硫酸锌
- B: 酞丁安
- C: 磺胺醋酰钠
- D: 红霉素

答案：B

84. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 预混胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 普通胰岛素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/247022163046010024>