

短暂性脑缺血ppt课 件护理查房



目录

- 短暂性脑缺血概述
- 短暂性脑缺血的护理措施
- 短暂性脑缺血患者的心理护理
- 短暂性脑缺血的预防与保健
- 案例分享与讨论

01

短暂性脑缺血概述





定义与分类




定义



短暂性脑缺血（Transient Ischemic Attack, TIA）是指由于脑或视网膜局部缺血引起的短暂性神经功能缺损，症状通常在几分钟至几小时内完全恢复，不遗留任何神经功能缺损。

分类

根据缺血部位，短暂性脑缺血可分为颈内动脉系统TIA和椎基底动脉系统TIA。



病因与病理机制



病因

主要病因包括动脉粥样硬化、动脉炎、动脉夹层、血液动力学改变等。



病理机制

短暂性脑缺血的病理机制主要是由于动脉粥样硬化斑块脱落或血栓形成，导致脑血管栓塞或痉挛，引起短暂的脑组织缺血。



临床表现与诊断标准



临床表现

常见的临床表现包括突然出现的单侧肢体麻木、无力、视力模糊、言语不清等，症状持续时间短，通常在几分钟至几小时内完全恢复。

诊断标准

根据患者症状、体征及辅助检查结果（如脑CT或MRI排除脑出血，EEG排除癫痫等），可做出短暂性脑缺血的诊断。同时需排除其他可能导致类似症状的疾病。



A decorative orange banner with a ribbon-like shape, featuring the number 02 in white. The banner is positioned within a large white cloud shape that has a dashed blue outline. The background is a light blue sky with stylized clouds, stars, and a string of colorful triangular flags.

02

短暂性脑缺血的护理措施





基础护理




保持病房安静、整洁，
为患者提供一个舒适
的环境。




协助患者完成日常生
活护理，如洗漱、进
食、排便等。

定期为患者翻身、拍
背，预防压疮和肺部
感染。





病情观察与评估




密切观察患者的生命体征，如体温、呼吸、血压、心率等。



评估患者的意识状态、语言能力及肢体活动情况。



及时发现并记录患者的不适症状，如头痛、恶心、呕吐等。






并发症预防与处理

预防肺部感染

保持室内空气流通，鼓励患者咳嗽、深呼吸。



预防压疮

定期为患者翻身，保持皮肤清洁干燥。



预防下肢深静脉血栓

鼓励患者进行下肢活动，定期按摩。



处理并发症

一旦出现并发症，如肺部感染、压疮、下肢深静脉血栓等，应及时采取相应措施进行治疗。

03

短暂性脑缺血患者的心理 护理



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/247035010160006050>