

## 2024 年四川省德昌县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库大全【综合题】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是()

- A: 硫酸镁
- B: 双歧杆菌
- C: 干酵母
- D: 比沙可啶

**答案：D**

2. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 维生素 B6
- C: 奥美拉唑
- D: 昂丹司琼

**答案：D**

3. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A: 昂丹司琼
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 维生素 B6

**答案：A**

4. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 华法林
- C: 肝素
- D: 链激酶

**答案：A**

5. 下列组合中，属于联合化疗的是（）

- A: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂（贝伐珠单抗+奥希替尼）
- B: CHOP 方案（环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松）
- C: CTX+美司钠（环磷酰胺+美司钠）
- D: MTX 方案（甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注）

**答案：B**

6. 严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

- A: 帕博利珠单抗
- B: 曲妥珠单抗
- C: 贝伐珠单抗
- D: 利妥昔单抗

**答案：C**

7. 可治疗男性性功能障碍的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 维生素 E
- C: 沙美特罗
- D: 西地那非

**答案：D**

8. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 山莨菪碱联用哌替啶

B: 阿托品联用吗啡

C: 铁剂联用维生素

D: 阿托品联用普萘洛尔

**答案：A**

9. 在骨骼疾病的诊断酶学中最重要的是

A: CK

B: ACP

C: LDH

D: ALP

**答案：D**

10. 患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约250g左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84次/分、R20次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3~5次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有1.5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程2周

B: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid；疗程2周

C: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid。疗程2周

D: 克拉霉素 500mg bid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程2周

**答案：C**

11. 2~3度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用（）。

A: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

B: ACEI

C: 利尿剂（噻嗪类）

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 利尿剂（袪利尿药）

**答案：A**

12. 发热血常规检查白细胞计数低于正常值，可能有

A: 细菌感染

B: 病毒感染

C: 麻疹

D: 感冒

**答案：B**

13. 下列说法错误的

- A: 抗蠕虫药对妊娠及哺乳期妇女不宜应用
- B: 空腹服用抗蠕虫药可增强疗效
- C: 急性化脓性或弥漫性皮炎禁用抗蠕虫药
- D: 噻嘧啶与枸橼酸哌嗪合用可增强疗效

**答案：D**

14. 中等强度镇痛选用

- A: 佐匹克隆
- B: 多奈哌齐
- C: 布桂嗪
- D: 丙戊酸钠

**答案：C**

15. 导致妊娠期妇女口服药物吸收减慢，达峰时间滞后，生物利用度下降的主要原因是

- A: 妊娠时胃酸分泌增多，胃肠活动增强
- B: 妊娠时体液总量和细胞外液都有所增加
- C: 妊娠时胃酸分泌减少，胃肠活动减弱
- D: 妊娠时雌激素分泌减少，孕激素分泌增多

**答案：C**

16. 高血压合并心肌梗死首选（）

- A: 氢氯噻嗪
- B: 卡托普利
- C: 特拉唑嗪
- D: 硫酸镁

**答案：B**

17. 为血液中的主要吞噬细胞，在白细胞中所占比例最高，且在急性感染中起重要作用的细胞为

- A: 中性粒细胞
- B: 嗜碱性粒细胞
- C: 淋巴细胞
- D: 嗜酸性粒细胞

**答案：A**

18. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 普通胰岛素
- B: 门冬胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

**答案：B**

19. 经口急性铅中毒出现的典型症状是（）

- A: 恶心、呕吐、视物模糊
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 腐蚀性口腔炎
- D: 恶心、呕吐、口内有金属味

**答案：D**

20. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；此 ADR 因果关系可评价为

- A: 可能无关
- B: 待评价
- C: 很可能

D: 可能

**答案: D**

21. (2019 年真题) 患者, 男, 68 岁, 既往体健, 因受凉后咳嗽、咳黄脓痰, 伴发热 2 天入院。查体: 体温 39.1℃, 血压 138/80mmHg, 心率 102 次/分, 呼吸 32 次/分, 左肺可闻及湿性啰音。化验结果: 白细胞计数  $11.2 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断: 社区获得性肺炎。

A: 支原体

B: 衣原体

C: 肺炎链球菌

D: 铜绿假单胞菌

**答案: D**

22. 患者, 女, 50 岁, 50kg, 157cm, 患复发转移性乳腺癌, 术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育, 错误的是

A: 用药前应进行 RAS 基因筛查

B: 从第 2 周起, 每次给药 100mg, 静脉滴注 30min

C: 每周给药 1 次, 第 1 周给药剂量 200mg, 静脉滴注 90min

D: 用药期间应每 3 个月监测心脏功能

**答案: A**

23. 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

A: III 期临床试验

B: II 期临床试验

C: IV 期临床试验

D: I 期临床试验

**答案：D**

24. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 Hb < 90g / L。

- A: 白消安
- B: 叶酸
- C: 维生素 B12
- D: 富马酸亚铁

**答案：D**

25. 乙型肝炎病毒表面抗体为

- A: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物
- B: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标
- C: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标
- D: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

**答案：D**

26. 恶性肿瘤

- A: 红细胞沉降率减慢
- B: 血小板增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 白细胞增多

**答案：D**

27. 关于口腔溃疡药物治疗的说法，错误的是（）

- A: 氯己定如含漱液，每次 15-20ml，一日 2~3 次含漱

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷，一日 3 次，稍加按摩。

C: 西地碘含片，一次 6mg 一日 4 次含服

D: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合

**答案：C**

28. 口服氯化铵用于解救

A: 硝西泮中毒

B: 氯丙嗪中毒

C: 苯丙胺中毒

D: 瘦肉精中毒

**答案：C**

29. 敌百虫中毒

A: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

B: 禁止使用肟类复能剂

C: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

D: 静脉滴注烟酰胺

**答案：A**

30. 每四小时用药一次的外文规范缩写是

A: qod

B: tid

C: q4h

D: qn

**答案：C**

31. 服用时不宜立刻饮水，以免冲淡药物而降低药效的是

A: 非洛地平缓释片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- B: 聚乙二醇粉剂
- C: 吲哚美辛胶囊
- D: 磷酸可待因糖浆

**答案：D**

32. 分娩前应用氯霉素可引起新生儿

- A: 腹泻
- B: 肺炎
- C: 灰婴综合征
- D: 核黄疸

**答案：C**

33. 普萘洛尔联用硝苯地平抗高血压的机制是

- A: 敏感化作用
- B: 协同作用
- C: 拮抗作用
- D: 减少不良反应

**答案：D**

34. (2021 年真题) 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L, 需要次氯酸钠溶液 (有效氯浓度为 6. 0%) 和纯化水的量分别是 ( )

- A: 120mL 和 9880mL
- B: 83mL 和 9917mL
- C: 830mL 和 9170mL
- D: 150mL 和 9850mL

**答案：B**

35. 应用华法林抗凝治疗时，患者应该控制的国际标准化比值为

A: 2.0~3.0

B: >3.0

C: <2.0

D: 2.0~2.5

**答案：A**

36. 可在尿中结晶，送服药物时要喝约 250ml 水，服药后也要多喝水，保持高尿流量的药物是

A: 卡马西平

B: 左氧氟沙星

C: 头孢哌酮

D: 特拉唑嗪

**答案：B**

37. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC $12.4 \times 10$

A: 65ml/min

B: 55ml/min

C: 70ml/min

D: 47ml/min

**答案：D**

38. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

A: 依那普利

- B: 哌唑嗪
- C: 美托洛尔
- D: 氢氯噻嗪

**答案: C**

39. “每日 3 次”的外文缩写是

- A: hs
- B: po
- C: tid
- D: NS

**答案: C**

40. 老年人用氨基糖苷类药物时应谨慎，主要是因为老年人()。

- A: 肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加
- B: 对药物处于高敏状态，影响中枢神经系统的功能
- C: 消化腺分泌减少，药物吸收增加
- D: 血浆蛋白含量降低，使游离性药物增加

**答案: A**

41. 贫血患者常出现

- A: 血红蛋白减少
- B: 血小板计数增高
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

**答案: A**

42. 10 岁以上的儿童 2 型糖尿病患者适宜选择的降糖药是

- A: 格列美脲

- B: 胰岛素
- C: 瑞格列奈
- D: 二甲双胍

**答案：D**

43. 患者,女,25岁,临床诊断为癫痫,给予丙戊酸钠 200mg tid 治疗。关于患者用药教育的说法错误的是 ( )

- A: 不要随意增减剂量
- B: 必要时监测血药浓度
- C: 应于每日三餐前服用药物
- D: 发作次数增多时应及时复诊

**答案：C**

44. (2019年真题) 长期应用糖皮质激素后的实验室检查结果常会出现

- A: 中性粒细胞减少
- B: 淋巴细胞增多
- C: 淋巴细胞减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：C**

45. 当创伤应激严重时,由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

- A: NPC5: 5
- B: NPC7: 3
- C: 150kcal: 1gN
- D: 100kcal: 1gN

**答案：A**

46. 夜间咳嗽宜选用的药品是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

**答案：C**

47. 其含量用生育酚当量表示的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 A
- C: 维生素 E
- D: 维生素 B

**答案：C**

48. 属于肠道促分泌剂，增加肠液分泌而保持血清电解质水平，促进肠道运动，可显著增加 IBS 患者自主排便频率并改善腹痛症状，美国 FDA 批准用于 18 岁以上女性便秘型 IBS 患者的药物是

- A: 鲁比前列酮
- B: 西托溴铵
- C: 洛哌丁胺
- D: 曲美布汀

**答案：A**

49. 属于 P-糖蛋白抑制剂的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 卡马西平
- C: 圣约翰草提取物
- D: 利福平

**答案：A**

50. 在治疗口腔溃疡的药品中，可能致使儿童和青年偶发口腔无痛性浅表脱屑损害的是

- A: 西地碘含片
- B: 左旋咪唑
- C: 甲硝唑粘贴片
- D: 氯己定含漱剂

**答案：D**

51. 下列药品中，属于药品类易制毒化学品的兴奋剂是

- A: 可待因
- B: 麻黄碱
- C: 螺内酯
- D: 芬太尼

**答案：B**

52. (用药导致的血常规异常)抗真菌药

- A: 嗜酸性粒细胞减少
- B: 血红蛋白量增多
- C: 中性粒细胞减少
- D: 血小板减少

**答案：C**

53. 能诱导肝药酶 CYP2C19 的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 地塞米松
- C: 苯妥英钠
- D: 卡马西平

**答案：B**

54. 患过敏性疾病的驾驶员可选用的药物是

- A: 赛庚啶
- B: 氯雷他定
- C: 异丙嗪
- D: 苯海拉明

**答案：B**

55. 患者，女，57岁，患骨质疏松症伴 Paget 病，该患者避免使用的治疗药是

- A: 特立帕肽
- B: 鲑鱼降钙素
- C: 雷洛昔芬
- D: 阿仑膦酸钠

**答案：A**

56. 说明书中没有儿童用药剂量时，可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法错误的是()

- A: 儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m<sup>2</sup>)/1.73(m<sup>2</sup>)
- B: Fried 公式, 婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150
- C: 儿童剂量=成人剂量×小儿体重(kg)/70
- D: 小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/小儿体表面积(m<sup>2</sup>)

**答案：D**

57. 恢复期

- A: 1~6 个月
- B: 1~3 个月

C: 2 周

D: 1 个月内

**答案: A**

58. 马兜铃酸可导致药源性肾病的机制是

A: 阻塞肾小管、肾小球

B: 前列腺素合成障碍

C: 不可逆性肾小管坏死

D: 肾间质纤维化

**答案: D**

59. 患者,男,64 岁,因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿,触痛明显。化验结果:血尿酸 581 $\mu$ mol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病,目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 别嘌醇片

B: 阿司匹林片 (300mg)

C: 双氯芬酸钠片

D: 贝诺酯片

**答案: C**

60. 伴痛风者禁用 ( )。

A: ACEI

B: 利尿剂 (袪利尿药)

C: 利尿剂 (噻嗪类)

D: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

**答案: C**

61. 严重的先兆子痫首选

- A: 硝苯地平?
- B: 赖诺普利?
- C: 呋塞米?
- D: 硫酸镁?

**答案: D**

62. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 饮食及运动治疗
- B: 口服二甲双胍
- C: 口服  $\alpha$ -糖苷酶抑制剂
- D: 口服磺酰脲类降糖药

**答案: A**

63. 长期应用氨基糖苷类抗生素，应定期检查器官功能，以防出现

- A: 味觉障碍
- B: 智力障碍
- C: 视力障碍
- D: 听力障碍

**答案: D**

64. 发热持续 3 周以上，体温多次超过 38.3℃，经过至少 1 周深入细致的检查仍不能确诊的

- A: 不明原因发热
- B: 长期低热
- C: 超高热

D: 中低等度热

**答案：A**

65. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

A: 抑制 CYP1A2

B: 抑制 CYP3A4

C: 抑制 CYP2C9

D: 诱导 CYP3A4

**答案：B**

66. 三环类抗抑郁药中毒解救和治疗时，不宜使用的是

A: 普鲁卡因胺

B: 毒扁豆碱

C: 高锰酸钾溶液

D: 吐根糖浆

**答案：B**

67. 患者,男,34岁,既往有胃溃疡病史现因反复关节疼痛、肿大就诊,诊断为骨关节炎,应选用的药物是()

A: 塞来昔布

B: 吲哚美辛

C: 萘普生

D: 布洛芬

**答案：A**

68. 巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

A: 可见心律失常、心搏骤停

B: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 可引起狂躁发作

D: 昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥

**答案: C**

69. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细菌性感染, 处方如下:

A: 服药期间及停药一周内, 避免饮用含酒精饮品

B: 服药期间, 可能会发生便秘

C: 服药时避免与钙片同服, 以免影响药物的作用

D: 用牛奶服药, 减少对胃肠道的刺激

**答案: D**

70. 新生儿服用氯霉素, 因其在体内蓄积导致灰婴综合征, 引起药源性疾病的因素主要为

A: 性别因素

B: 年龄因素

C: 基础疾病因素

D: 遗传因素

**答案: B**

71. 患者女, 53 岁, 上腹痛、腹泻、消瘦 1 年。大便常规有大量脂肪球, X 线腹平片显示上腹中部多发钙化点。对其宜选用的药品是

A: 酵母

B: 胰酶

C: 乳酶生

D: 硫糖铝

**答案: B**

72. 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加，减少尿酸沉积

- A: 丙磺舒
- B: 阿司匹林
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

**答案：A**

73. 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

- A: 异烟肼与牛奶同服
- B: 左甲状腺素与钙剂同服
- C: 硫酸亚铁与维生素 C 同服
- D: 华法林与人参同服

**答案：C**

74. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

- A: 他汀类
- B: 烟酸类
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

**答案：C**

75. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 压迫、发闷
- B: 胸痛
- C: 针刺或刀扎样锐性痛
- D: 多持续 3~5 分钟

**答案：C**

76. 进食高蛋白食物可减轻药品不良反应的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 西咪替丁
- C: 泼尼松
- D: 格列本脲

**答案：C**

77. 融合抑制剂（）

- A: NNRTIs
- B: FIs
- C: PIs
- D: NRTIs

**答案：B**

78. 除胰岛功能低下外，主要引起血糖超过正常参考区间高限的疾患是

- A: 肝癌、重症肝炎
- B: 肾功能衰竭
- C: 激素分泌功能减退
- D: 激素分泌功能亢进

**答案：D**

79. 属于非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，抑制外周传入神经，也可部分抑制咳嗽中枢的药物的是

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: 羧甲司坦

D: 可待因

**答案: A**

80. 胶囊剂的注意事项是

A: 用后应漱口

B: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

C: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

D: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

**答案: C**

81. 引起视网膜变性而致失明，服药半年左右应查眼底 DMARDs 是

A: 利妥昔单抗

B: 氯喹

C: 环孢素

D: 硫唑嘌呤

**答案: B**

82. (2015 年真题) 药师在指导合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法。下列交代的内容，错误的是 ( )。

A: 栓剂是外用制剂，不可口服

B: 肠溶片要整片吞服，不宜嚼碎服用

C: 泡腾片可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

D: 活菌制剂不能用超过 40℃ 的水送服

**答案: C**

83. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: 发作时可舌下含服作用较快的硝酸酯类制剂

B: 阿司匹林是常用药物，主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏

C: 严重主动脉瓣狭窄或肥厚型梗阻性心肌病的心绞痛患者优先使用硝酸酯类药物

D: 稳定型心绞痛患者合并高血压、糖尿病、心力衰竭可选用卡托普利、依那普利等药物

**答案：C**

84. 举重运动员使用后，可短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是()

A: 普茶洛尔

B: 缬沙坦

C: 硝苯地平

D: 呋塞米

**答案：D**

85. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

A:  $\beta$  受体拮抗剂

B: 短效  $\beta$

C: 非甾体抗炎药

D: 吸入型糖皮质激素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/248051042124007022>