

云南省临沧市《卫生综合知识》医学【含答案】

（说明：本题库收集历年及近期考试真题，全方面的整理归纳备考公考之用。）

一、单选题

1. 心源性水肿的特点是（ ）。
- A、从身体下垂部位开始
 - B、从身体疏松部位开始，如眼睑
 - C、久站者易有骶尾部、会阴部水肿
 - D、易伴腹水
 - E、易伴胸水

【参考答案】 A

2. 某孕妇妊娠 43 周，已确诊为过期妊娠，医生决定为其终止妊娠，但家属和孕妇担心使用药物会对胎儿不利未同意。此患者的检查结果应当是（ ）。
- A、胎头双顶径 8cm
 - B、OCT 试验出现早期减速
 - C、NST 试验反应型
 - D、胎动 9 次 / 12 小时
 - E、胎心 144 次 / 分

【参考答案】

3. 下列致癌因素中，最重要的是（ ）。
4. 破伤风强直性肌肉收缩最先发生在（ ）。

- A、面肌
- B、颈项肌
- C、咀嚼肌
- D、肋间肌
- E、四肢肌

【参考答案】C

5. 急性白血病病人缓解期出现中枢神经系统白血病的主要原因是（ ）。

- A、免疫功能低下
- B、多数化疗药不能通过血脑屏障
- C、疗程不够
- D、化疗药剂量的不足
- E、对化疗药产生耐药性

【参考答案】B

6. 下列哪项是抢救高血钾病人时，采取的首要措施（ ）。

- A、腹膜透析
- B、静滴林格液
- C、10%葡萄糖酸钙静注
- D、静滴 5%碳酸氢钠
- E、10%葡萄糖加胰岛素静滴

【参考答案】C

7. 病人自发动作完全消失，对任何刺激均无反应，各种反射均消

失，巴宾斯基征持续阳性，则此时病人意识障碍的程度是（ ）。

8. 秋季腹泻患儿暂停乳类喂养，有利于（ ）。

- A、减轻腹胀
- B、降低热度
- C、缩短病程
- D、减少呕吐
- E、促进肠蠕动

【参考答案】C

9. 急性肾衰竭最常见的病因（ ）。

- A、肾性
- B、肾前性
- C、肾后性
- D、前列腺肥大
- E、尿路结石

【参考答案】B

10. 门静脉高压症分流术后护理，下列措施中错误的是（ ）。

- A、术后取平卧位，活动要少
- B、注意观察意识变化
- C、给予高热量、高蛋白饮食
- D、保持大便通畅
- E、观察有无腹痛、腹胀、血便

【参考答案】C

11. 按舒张压水平分级，重度高血压是指舒张压（ ）。

A、 $\geq 105\text{mmHg}$

B、 $\geq 110\text{mmHg}$

C、 $\geq 115\text{mmHg}$

D、 $\geq 120\text{mmHg}$

E、 $\geq 125\text{mmHg}$

【参考答案】 B

12. 宫颈与阴道黏膜可见散在红色斑点，应考虑的诊断是（ ）。

A、盆腔炎

B、滴虫性阴道炎

C、细菌性阴道炎

D、血小板减少性紫癜

E、假丝酵母菌性病

【参考答案】 B

13. 二重感染是指（ ）。

14. 骨肿瘤的治疗主要依据（ ）。

A、放疗治疗

B、化学药物治疗

C、免疫治疗

D、理疗、按摩等物理疗法

E、主要采用手术治疗辅以化学和放射疗法。

【参考答案】

15. 关于肾与输尿管结石引起的疼痛，错误的是（ ）。

- A、较小，易活动的结石表现为肾绞痛
- B、较大结石表现为钝痛
- C、一般疼痛与活动无关
- D、当结石嵌顿时可引起剧烈肾绞痛
- E、以上全是

【参考答案】C

16. 极低出生体重儿指（ ）。

- A、出生体重不足 1000g
- B、出生体重不足 1500g
- C、出生体重不足 2000g
- D、出生体重不足 2500g
- E、出生体重不足 4000g

【参考答案】B

17. 在肾和输尿管结石常见的临床表现中，应除外（ ）。

- A、一般为镜下血尿
- B、恶心呕吐
- C、肾绞痛
- D、高热
- E、以上全是

【参考答案】D

18. 因脑右侧内囊出血，病人表现出典型的“三偏征”中不包括

()。

19. 为进一步明确诊断，下列哪项检查最准确快速。() A、超声多普勒仪检查

B、宫颈黏液检查

C、B 超检查

D、黄体酮试验

E、胃镜检查

【参考答案】 C

20. 紫癜与充血性皮疹最主要的区别是 ()。

A、指压是否褪色

B、是否高出皮肤

C、直径大小

D、血小板是否减少

E、凝血时间是否正常

【参考答案】 A

21. 假丝酵母菌病病人的护理不当是 ()。

A、注意保持外阴洁净

B、加强健康教育

C、指导病人家属正确用药

D、因外阴瘙痒严重，可以搔抓，以减轻痒痛

E、用药时注意洗净双手，以减少感染的机会

【参考答案】 D

22. 患儿女，2 岁，呕吐、腹泻 4 天，伴精神萎靡，眼窝明显凹陷，皮肤干燥，尿量明显减少，呼吸深快，口唇樱红，血钠 135mmol/L。该患儿在脱水的同时伴有（ ）。

- A、休克
- B、代谢性酸中毒
- C、中毒性脑病
- D、低钾血症
- E、低钙血症

【参考答案】 B

23. 关于宫颈活组织检查，下列描述正确的是（ ）。

24. 下列为稳定病人情绪，减轻焦虑的措施中，不当的是（ ）。

- A、鼓励病人讲出自己的感受
- B、介绍其与治疗成功的病人交谈
- C、不与危重病人同住一室
- D、回避病人对自己病情的询问
- E、酌情给予镇静剂

【参考答案】 D

25. 初产妇，35 岁，宫内孕 38 周，于昨日晚上感觉腹部一阵阵发紧，约 30 分钟至 1 小时一次，每次持续时间较短且不恒定，今日早上孕妇感觉腹部疼痛，每 5~6 分钟一次，每次持续 40 秒左右。今早上孕妇的情况属于（ ）。

- A、已临产

- B、尚未临产
- C、属于临产先兆
- D、进入第二产程
- E、进入第三产程

【参考答案】A

26. 高渗性脱水的特点是（ ）。

- A、失水多于失钠
- B、失水等于失钠
- C、失水少于失钠
- D、失钾多于失水
- E、失氯多于失水

【参考答案】A

27. 氨中毒患者脑内能量产生减少的主要机理是（ ）。

- A、糖酵解过程障碍
- B、三羧酸循环障碍
- C、磷酸肌酸分解障碍
- D、脂肪氧化障碍
- E、酮体利用障碍

【参考答案】B

29. 初产妇李女士，妊娠 39 周住院待产，检查：宫缩规律，枕左前位，胎心 146 次 / 分，宫口开大 3cm，在护理过程中错误的是（ ）。

- A、指导合理进食
- B、左侧卧位休息
- C、间歇时正确运用腹压
- D、每隔 1~2 小时听一次胎心
- E、鼓励 2~4 小时排尿一次

【参考答案】C

30. 女性，47 岁，突发左上腹部刀割样剧痛 5 小时，伴恶心、呕吐来院急诊。体检：体温 36.1℃，血压 85 / 55mmHg，脉搏 116 次 / 分钟。病人呈急性面容，表情痛苦、卷曲位、不愿移动。腹式呼吸减弱，全腹有明显的压痛和反跳痛，以上腹部最为明显，腹肌紧张呈“木板样”强直，肝浊音界缩小，肠鸣音消失。既往有胃溃疡病史。首先考虑的疾病是（ ）。

- A、急性胆囊炎穿孔
- B、胃溃疡急性穿孔
- C、坏疽性阑尾炎
- D、绞窄性肠梗阻
- E、急性胰腺炎

【参考答案】B

31. 乳癌病人乳房出现酒窝征的原因是（ ）。

- A、表皮破溃
- B、周围组织或皮肤被肿块累积
- C、乳头深部癌肿侵及乳管致乳头凹陷

D、癌肿侵入 cooper 韧带使皮肤凹陷

E、癌肿侵及局部的哪个部位

【参考答案】D

32. 属于等渗碱性溶液的是（ ）。

A、5%葡萄糖溶液

B、0.9%氯化钠溶液

C、1.4%碳酸氢钠溶液

D、5%碳酸氢钠溶液

E、11.2%乳酸钠溶液

【参考答案】C

33. 为预防早产儿出血，出生后应给予（ ）。

34. 羊水过多，胎儿正常，处理方法正确的是（ ）。

A、缩宫素引产

B、顺其自然，无需处理

C、剖宫产

D、根据羊水量增多的程度，孕妇的症状，胎龄，综合考虑处理方法

E、产钳助产

【参考答案】D

35. 脑震荡病人会有下列哪种症状（ ）。

A、偏瘫

B、逆行性遗忘

C、颅内压增高

- D、失语
- E、大小便失禁

【参考答案】B

36. 类风湿性关节炎活动期的标志是（ ）。

- A、自发痛
- B、梭状指
- C、晨僵
- D、压痛
- E、畸形

【参考答案】C

37. 某产妇 26 岁，在产程中，宫口开大 2cm，未破膜，出现协调性子宫收缩乏力，最恰当的处理措施是（ ）。

38. 供给生理需要的液体时宜选择（ ）。

- A、1/5 张 1：4 液
- B、1/2 张 1：1 液
- C、1/2 张 2：3：1 液
- D、2/3 张 4：3：2 液
- E、等张 2：1 含钠液

【参考答案】A

39. 代谢性碱中毒常常伴发（ ）。

- A、低钠血症
- B、高钠血症

- C、低钾血症
- D、高钾血症
- E、高镁血症

【参考答案】 C

40. 最常见的肩关节脱位类型（ ）。

- A、前脱位
- B、后脱位
- C、孟上脱位
- D、孟下脱位
- E、半脱位

【参考答案】 A

41. 直肠癌多见于（ ）。

- A、直肠与乙状结肠交界处
- B、直肠壶腹部
- C、腹膜反折平面以上的直肠内
- D、齿线附近
- E、直肠上 1 / 3 部分

【参考答案】 B

42. 临床上最常见的肺癌是（ ）。

43. 下列关于静脉采血的叙述，错误的是（ ）。

- A、应根据采血的目的选择不同的时间采血
- B、止血带压迫时间过长会影响测定结果

- C、建议使用真空采血器
- D、需空腹采血时，应尽可能延长空腹的时间
- E、不能从输液的血管采血

【参考答案】D

44. 男性，42岁，酒宴后上腹部疼痛伴恶心、呕吐，病后6小时
宋诊。体检：全腹肌紧张，压痛及反跳痛。血压75/50mmHg，腹
腔穿刺抽出淡粉色液，白细胞 $18.4 \times 10^9 / L$ 血清淀粉酶600U /
L。下列哪项为其发病诱因（ ）。

- A、暴饮暴食
- B、精神因素
- C、并发败血症
- D、甲状旁腺功能亢进
- E、胆道梗阻及胆汁逆流

【参考答案】A

45. 初产妇，孕40周，临产10小时，产妇烦躁不安，呼痛不
已，查子宫收缩强，间歇时不放松，胎心140次/分，宫口开
大1cm，S—2，应首选哪项处理。（ ）

- A、肥皂水灌肠
- B、人工破膜
- C、静脉滴注小剂量缩宫素
- D、肌肉注射哌替啶
- E、立即行剖宫产

【参考答案】

46. 患者女性，60 岁，患老年性阴道炎，该患者询问护士发病原因，护士告知直接影响阴道自净作用的激素下降，这个激素是（ ）。

- A、孕激素
- B、雌激素
- C、促性腺素
- D、促卵泡素
- E、促腺激素释放激素

【参考答案】B

47. 患者，女，26 岁，初产妇，妊娠 20 周，第一次前来产前检查，自诉日常活动后感乏力、心悸、气急。经检查确定认为妊娠合并心脏病，心功能 II 级。根据该患者的情况，为防止心力衰竭，妊娠期检测的时间应重点放在（ ）。

48. 患者，女，产后 8 个月，体健，决定为小孩断奶，现需退奶，可给予（ ）。

- A、雌激素
- B、孕激素
- C、雄激素
- D、促卵泡素
- E、黄体生成素

【参考答案】A

49. 关于低渗性缺水，下列哪项是正确的（ ）。

- A、口渴、尿量少、比重高
- B、口渴、尿量少、比重低
- C、无口渴、尿量少、比重高
- D、无口渴、尿量少、比重低
- E、无口渴、尿量正常、比重无改变

【参考答案】D

50. 护士帮助病人进行体位引流时措施不正确的是（ ）。

- A、引流前向病人讲解配合方法
- B、根据病变的部位选择合适的体位
- C、每次引流的时间可从 5~10 分钟开始，根据病人情况进行调整
- D、痰液较多病人应让其快速大量咳出
- E、若病人出现咯血、头晕等立即终止引流

【参考答案】D

二、多选题

51. 胸部损伤的护理诊断有（ ）。

- A、气体交换受损
- B、心输出量减少
- C、体液不足
- D、潜在并发症
- E、焦虑与恐惧

【参考答案】ABCDE

52. 以下各项中正确的是（ ）。

- A、外周静脉营养可给予浓度 50%的葡萄糖
- B、外周静脉营养主要适用于营养支持在 2 周以内
- C、配置肠内营养液时应严格无菌操作
- D、配置肠内营养液时应按一定顺序将各种液体混合
- E、可将抗生素等药物加入三升袋中

【参考答案】BCD

53. 门静脉高压症手术治疗的目的是（ ）。

- A、改善肝功能
- B、消除脾功能亢进
- C、降低门静脉压力
- D、减少腹水
- E、根治肝硬化

【参考答案】BCD

54. 可以引发咯血的呼吸系统常见疾病有（ ）。

55. 骨折早期并发症有（ ）。

- A、脂肪栓塞
- B、神经损伤
- C、内脏损伤
- D、骨筋膜室综合症
- E、缺血性骨坏死

【参考答案】ABCD

56. 关于骨牵引的护理（ ）。

- A、抬高床头或床位 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B、每日消毒牵引针孔处
- C、保持牵引力与反牵引力的对抗
- D、观察患肢感觉、运动和血运
- E、指导患者功能锻炼

【参考答案】 ABCDE

57. 乳房囊性增生病的临床表现中，哪些错误（ ）。

- A、周期性乳房胀痛
- B、肿块大小不等、质韧，边界不清
- C、肿块与皮肤和基底相连
- D、常有乳头溢液，为黄绿色、棕色液体
- E、腋窝淋巴结肿大

【参考答案】 CDE

58. 下列关于脾切除术治疗特发性血小板减少性紫癜的说法，正确的是（ ）。

- A、有效率达 70%
- B、一般作为首选治疗手段
- C、糖皮质激素治疗 6 个月以上无效者可考虑脾切除
- D、糖皮质激素维持量大于 $30\text{mg} / \text{d}$ 者可考虑脾切除
- E、作用机制是减少血小板破坏和抗体产生

【参考答案】 ACDE

59. 继发性腹膜炎的病因有（ ）。

- A、急性阑尾炎穿孔
- B、脾破裂
- C、胃十二指肠穿孔
- D、绞窄性肠梗阻
- E、急性坏死性胰腺炎

【参考答案】 ABCDE

60. 肾结核的主要传播途径，错误的是（ ）。

- A、呼吸道
- B、血行
- C、淋巴道
- D、直接蔓延
- E、消化道

【参考答案】 BD

61. 预防肺结核传染的措施包括（ ）。

- A、隔离痰菌阳性的病人
- B、提倡不随地吐痰
- C、早期发现、彻底治疗肺结核病人
- D、注射核酪
- E、接种卡介苗

【参考答案】 ABCDE

62. 确诊肺癌的辅助检查项目有（ ）。

- A、X 线检查：BCT

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248064074053007002>