
护理学（高级）-水、电解质、酸碱代谢失调还债的 护理

1、该患者的病情可判定为

- A. 粘连性肠梗阻、单纯性
- B. 血运性肠梗阻、单纯性
- C. 低钾血症、麻痹性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻并脱水、低钾血症
- E. 输入段肠袢梗阻

2、以下措施处理正确的是

- A. 禁饮食
- B. 胃肠减压
- C. 应用抗生素
- D. 纠正水、电解质失衡
- E. 手术治疗

3、该患者的水、电解质失衡诊断为

- A. 轻度高渗性脱水
- B. 中度高渗性脱水
- C. 重度高渗性脱水
- D. 等渗性脱水

E. 低渗性脱水

4、该患者当天补充液量约为（不包括当天生理需要量）

- A. 500ml
- B. 1000ml
- C. 3000ml
- D. 4000ml
- E. 4500ml

5、关于高渗性脱水患者的护理措施，下列正确的是

- A. 尿量不足 30ml/h 时，应立即报告医师，尽快处理
- B. 补液过程中，如患者出现呼吸困难、心搏过速、颈静脉怒张、中心静脉压升高，应适当加快补液速度
- C. 应注意有无低钾血症的发生，并及时给予钾盐治疗
- D. 保持皮肤清洁，少用肥皂擦洗以免过于干燥
- E. 监测患者的意识状态和病情变化

6、以下关于静脉补钾的原则中正确的是

- A. 见尿补钾，尿量至少大于 400ml/d
- B. 剂量不宜过多，依血钾浓度，每天需补充氯化钾 3~6g
- C. 浓度不宜过高，一般不超过 3%
- D. 速度不宜过快，成人静脉滴速不超过 80 滴 / 分

E. 以上都正确

7、以下体液失衡的处理原则中正确的是

- A. 轻度代谢性酸中毒常可自行纠正，不必应用碱性药物
- B. 代谢性碱中毒常需遵医嘱见尿补钾
- C. 面罩吸二氧化碳可治疗呼吸性酸中毒
- D. 重度低渗性脱水补液治疗时，应先输胶体液后输晶体液
- E. 静脉注射碳酸氢钠可治疗高钾血症

8、低钾血症的病因是

- A. 长期进食不足
- B. 反复呕吐
- C. 持续胃肠减压
- D. 输入库存血
- E. 严重外伤

9、代谢性酸中毒的治疗包括

- A. 积极的病因治疗
- B. 轻度酸中毒常不必使用碱性药物
- C. 经计算的补碱量应一次性快速输入
- D. 纠正酸中毒后应适当补钾
- E. 碱性药物的使用应根据有关的检测结果进行调节

10、外科最常见的水、电解质和酸碱失衡是

- A. 等渗性脱水
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 代谢性酸中毒
- E. 低钾血症

11、该患者的脱水类型是

- A. 高渗性脱水
- B. 继发性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 原发性脱水
- E. 等渗性脱水

12、为该患者进行液体疗法，静脉滴注应选用的液体是

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 复方氯化钠
- C. 5%葡萄糖盐水
- D. 右旋糖酐
- E. 0.3%氯化钾

13、对于此患者纠正脱水的过程中，尤其应注意发生

- A. 低钠血症
- B. 低钾血症
- C. 低钙血症
- D. 低氯血症
- E. 低镁血症

14、该患者的护理评估为

- A. 等渗性脱水+代谢性碱中毒+低钾血症
- B. 代谢性酸中毒+低渗性脱水+低钾血症
- C. 低钾血症+高渗性脱水+代谢性酸中毒
- D. 低渗性脱水+低钾血症+呼吸性酸中毒
- E. 等渗性脱水+代谢性酸中毒

15、该患者的护理措施应是

- A. 应补给生理盐水
- B. 应补给 10%葡萄糖液
- C. 应先纠正脱水并给予碱性液体及钾盐
- D. 给予 10%葡萄糖液、碱性液和氯化钾
- E. 应给予生理盐水、碱性液和氯化钾

16、维持细胞内液渗透压的重要离子是

A. K

B. H

C. Mg

D. Na

E. Ca

17、以下酸碱失衡中，以呼吸深而快为特征的是

A. 代谢性酸中毒

B. 混合性碱中毒

C. 呼吸性酸中毒

D. 呼吸性碱中毒

E. 代谢性碱中毒

18、反映体液量是否补足的最简单指征是

A. 皮肤弹性

B. 心肺体征

C. 血压、脉搏

D. 患者精神状态

E. 尿量及其比重

19、等渗性脱水时应

A. 先给生理盐水，再给葡萄糖液

- B. 补给等量的等渗盐水和葡萄糖液
- C. 在缺水症状基本纠正后，给适量的电解质液
- D. 先给适量高渗盐水，以初步缓解其电解质失调
- E. 先给葡萄糖液，再给生理盐水

20、若将体内每日的代谢产物经肾脏排出，每天至少需要的尿量为

- A. 1000~1500ml
- B. 800~1000ml
- C. 500~600ml
- D. 300~400ml
- E. 100~200ml

21、临床上等渗性脱水的最常见原因为

- A. 水分摄入不足
- B. 消化液长期慢性丢失
- C. 补充等渗溶液过多
- D. 水分丢失过多
- E. 消化液的急性丧失

22、施行液体疗法的问题首先是

- A. 液体的选择
- B. 选择补液途径

- C. 确定体液平衡失调的性质
- D. 补液的量
- E. 安排补液的先后顺序

23、机体调节酸碱平衡最迅速的途径是

- A. 肺调节
- B. 血液缓冲系统
- C. 肾调节
- D. 神经-内分泌调节
- E. 细胞外离子交换

24、低渗性脱水时，下列机体体液的容量改变正确的是

- A. 细胞外液轻度减少，细胞内液显著减少
- B. 细胞外液减少，细胞内液正常
- C. 细胞外液显著减少，细胞内液轻度减少
- D. 细胞外液正常，细胞内液减少
- E. 细胞外液、内液按比例减少

25、等渗性脱水患者输入大量等渗盐水时，可出现

- A. 血钠过高
- B. 氯化钠过剩
- C. 低氯性酸中毒

D. 高氯性酸中毒

E. 水中毒

26、将 10%氯化钾 30ml 稀释于 5%葡萄糖溶液中，至少需要的溶液量是

A. 1000ml

B. 600ml

C. 400ml

D. 300ml

E. 200ml

27、某男性患者，46 岁，因胆石症胆管炎住院，血化验 pH7.30, BE7mmol/L, COCP15mmol/L, 提示有

A. 代谢性酸中毒

B. 呼吸性碱中毒

C. 呼吸性酸中毒

D. 代谢性碱中毒

E. 水中毒

28、治疗重度低渗性脱水患者，首先应输入的液体是

A. 5%葡萄糖溶液

B. 复方氯化钠溶液

- C. 平衡盐溶液
- D. 3%氯化钠溶液
- E. 5%葡萄糖盐水

29、高渗性脱水时，应首先补充

- A. 0.9%氯化钠
- B. 5%葡萄糖
- C. 11.2%乳酸钠
- D. 右旋糖酐
- E. 平衡盐液

30、某男性患者，37 岁，体重 60kg，诊断为中度等渗性脱水，第一个 24 小时应补给液体量（包括日需要量）共

- A. 3000ml
- B. 3500ml
- C. 4000ml
- D. 4500ml
- E. 5000ml

31、某男性患者，31 岁，急性肠梗阻，出现口渴，尿少，眼球下陷，脉速，血压 12/8.0Kpa (90/60mmHg)，估计其脱水性质和程度为

- A. 中度等渗性脱水

- B. 重度高渗性脱水
- C. 中度低渗性脱水
- D. 中度高渗性脱水
- E. 重度低渗性脱水

32、脱水患者补液的第 1 天，对已丧失液量的补充应是

- A. 先补充 1/2
- B. 先补充 1/3
- C. 先补充 2/3
- D. 一次补足
- E. 先补充 1/4

33、某女性患者，35 岁，因急性腹泻出现口渴，尿少，血压偏低，应首先输入的液体是

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 5%碳酸氢钠溶液
- C. 5%葡萄糖盐水
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 10%葡萄糖溶液

34、正常成人每日无形失水约为

- A. 850ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248065030002007041>