

## 急救理论知识练习题库+参考答案

一、单选题（共 **100** 题，每题 **1** 分，共 **100** 分）

1、预激综合征最主要的特征是

- A、以上都不是
- B、QRS 波群开始部粗钝
- C、P-R 间期  $< 0.12$  秒, P 波部正常
- D、继发 ST-T 改变
- E、QRS 波群宽度  $> 0.11$  秒

正确答案：**B**

2、急性前壁心肌梗死最常见的心律失常是

- A、病窦综合征
- B、室性早搏及室性心动过速
- C、房室传导阻滞
- D、左前分传导阻滞
- E、心房颤动

正确答案：**B**

3、判断腹内空腔脏器损伤最有价值的发现是

- A**、有气腹
- B、脉率增快
- C、腹膜刺激征
- D、腹胀
- E、呕血

正确答案：**A**

4、患者男性，68 岁，摔倒后出现右髓部疼痛，不能站起行走。体检：右髓部压痛、肿胀、有髓关节活动障碍、右大粗隆上移、右下肢呈外旋位。应立即首先采取下列哪项检查

- A**、骨扫描
- B、X 线片
- C、MRI
- D、B 超
- E、CT

正确答案：**B**

5、某休克患者经补液后血压仍低，中心静脉压不高，在 5min 内经静脉输

入等参盐水 250ml, 发现血压升高, 而中心静脉压不变, 提示:

- A、血容量不足
- B、容量血管收缩过度
- C、心功能不全
- D、血管张力过高
- E、肺水肿

正确答案: **A**

6、各种类型休克基本病理变化是

- A、脉压减小
- B、尿量减少
- C、血压下降
- D、有效循环血量锐减
- E、中心静脉压下降

正确答案: **D**

7、一患 MODS 病人, 在呼吸机机械通气期间, 口腔培养为绿脓杆菌感染, 细菌来源可能性小的是

- A、口腔菌群感染
- B、医护人员的手
- C、暖瓶塞
- D、水龙头
- E、床上用品

正确答案: **A**

8、严重二尖瓣狭窄时, 不易发生下列哪种并发症

- A、肺水肿
- B、右心衰竭
- C、亚急性细菌性心内膜炎
- D、肺部感染
- E、房颤

正确答案: **C**

9、腹部的实质性器官不包括

- A、胃
- B、肾
- C、胰

D、脾

E、肝

正确答案：A

10、患者男性，68岁，摔倒后出现右髌部疼痛，不能站起行走。体检：右髌部压痛、肿胀、有髌关节活动障碍、右大粗隆上移、右下肢呈外旋位。术后第一天患者应进行的功能锻炼是

A、行走锻炼

B、髌关节旋转活动

C、股四头肌等长舒缩练习

D、髌关节内收、外展活动

E、扶拐训练

正确答案：C

11、心搏骤停后，临床上以哪两个系统的症状最明显

A、呼吸系统神经系统

B、消化系统神经系统

C、循环系统呼吸系统

D、神经系统循环系统

正确答案：D

12、肾移植病人的监护中哪一项是观察移植肾功能的显见指标

A、体重

B、尿重

C、<sub>N</sub>血压

D、营养

E、血Cr、BUN

正确答案：B

13、诊断低镁血症的标准是血清镁浓度低于

A、3.5mmol / l

B、1.3mmol / l

C、0.65mmol / l

D、1.1mmol / l

E、1.21mmol / l

正确答案：C

14、口对口人工呼吸的方法，下列哪项是错误的

- A、吹气时捏紧病人鼻孔
- B、吹气时不要按压胸廓
- C、胸外心脏按压与人工呼吸的比例为 30:2
- D、首先必须畅通气道
- E、按压频率成人 8~10 次 / min

正确答案：E

15、气管插管可以引起除下列那种之外的各种反射

- A、膝腱反射
- B、呕吐反射
- C、咳嗽反射
- D、压眶发射
- E、吞咽反射

正确答案：A

16、脊柱骨折的正确搬运法：

- A、背负
- B、抱扶
- C、平卧式
- D、单人搀扶
- E、双人搀扶

正确答案：C

17、下列哪一个是左心衰竭的早期改变

- A、咳嗽、咳痰、咯血
- B、消化道症状
- C、劳力性呼吸困难
- D、端坐呼吸
- E、夜间阵发性呼吸困难

正确答案：C

18、患儿男，2岁，玩耍时突然剧咳、面色发青，遂来院就诊。查体：听诊可闻及似金属声的“拍击音”，急拍胸片未见异物。为明确诊断，应考虑的检查方法是

- A、间接喉镜
- B、支气管镜

- C、胸部 CT
- D、直接喉镜
- E、食管镜

正确答案：**B**

19、急性肺水肿时吸入乙醇湿化氧的目的是

- A、降低肺泡内泡沫的表面张力
- B、兴奋呼吸中枢
- C、促使毛细血管扩张而减轻心脏负荷
- D、解除支气管平滑肌痉挛

正确答案：**A**

20、急性阑尾炎，当腹痛尚未转移到右下腹前，在诊断上具有重要意义的是

- A、已出现发热
- B、已有白细胞显著升高
- C、脐区及右下腹均有压痛或反跳痛
- D、压痛已固定在右下腹
- E、脐周压痛及反跳痛

正确答案：**D**

21、低血容量性休克代偿期的微循环变化主要是

- A、衰竭期
- B、收缩期
- C、动静脉短路关闭
- D、直接通道关闭
- E、微循环扩张期

正确答案：**A**

22、李先生，56岁，因“右心衰”来院急诊，在休息状态下也心悸、呼吸困难，请问李先生现在的心功能分级为

- A、I级
- B、In级
- C、IV级
- D、II级
- E、V级

正确答案：**C**

23、气道内分泌物的吸引不正确的是

- A、每次抽吸时间不超过 15 秒
- B、两次抽吸时间间隔在 3 分钟以上
- C、抽吸频率根据分泌量而定
- D、进行上下抽吸

正确答案：**D**

24、发病时主要表现为身体某一固定部位的抽搐或感觉障碍属于

- A、癫痫性经痉挛
- B、癫痫小发作
- C、重症肌无力
- D、癫痫大发作

正确答案：**B**

25、病人颈椎损伤时应立即采取措施是

- A、立即送手术室复位
- B、牵引时床尾抬高 25~30cm, 以保持颈部中立位
- C、迅速作颅骨牵引
- D、定时翻身, 翻身时头颈不动, 躯体翻动
- E、给氧. 输液. 使用呼吸机

正确答案：**C**

26、抗过敏首选药物是

- A、盐酸异丙嗪
- B、盐酸肾上腺素
- C、异丙肾上腺素
- D、去甲肾上腺素

正确答案：**A**

27、下列哪些情况不会影响脉搏血氧饱和度(SpO<sub>2</sub>)监测数值的准确性

- A、亚硝酸盐中毒
- B、上呼吸道感染
- C、CO 中毒
- D、低血压

正确答案：**B**

28、以下哪种情况不适合于应用电击复律治疗

- A、急性心肌梗死合并室性心动过速
- B、心脏手术过程中出现室性心动过速
- C、扩张型心肌病合并室性心动过速
- D、洋地黄中毒出现室性心动过速
- E、室性心动过速伴有严重血流动力学障碍

正确答案：**D**

29、气囊三腔管使用过程中发生窒息的原因是

- A、血流反流气管
- B、食管气囊气过多
- C、喉头水肿
- D、牵引过紧
- E、胃气囊阻塞咽喉

正确答案：E

30、30岁女性患者，患急性化脓性扁桃体炎，在某医院注射室注射青霉素后突发呼吸困难，喉头喘鸣，嘴唇发绀。医务人员立即给予肾上腺素皮下注射的同时，缓解呼吸困难的措施宜首选

- A、气管切开
- B、面罩吸氧
- C、环甲膜穿刺
- D、气管内插管
- E、放置口咽管

正确答案：C

31、溺水患者经抢救心跳呼吸复苏成功，下列生化监测结果，与病情不符合的是

- A、高血镁
- B、高血钾
- C、高血钙
- D、局血氯
- E、高血钠

正确答案：B

32、遇到下列情况，首先应抢救

- A、开放性骨折
- B、休克

- C、昏迷
- D、脾破裂
- E、开放性气胸

正确答案：E

33、对低血糖晕倒病人的处理错误的是？

- A、让伤者平躺取头高脚低位
- B、给病人喝糖水
- C、给病人按揉太阳穴缓解头晕
- D、让伤者平躺取头低脚高位

正确答案：**D**

34、防止烧伤患者休克的主要措施是

- A、保暖
- B、创面处理
- C、镇痛、镇静
- D、补液治疗

正确答案：**D**

35、脑血栓形成的溶栓治疗时间窗是指

- A、发病后的 6~8 小时
- B、发病后的 24 小时
- C、以上均不是
- D、发病后的 12 小时
- E、发病后的 3~6 小时

正确答案：**E**

36、过度通气主要应用于\_

- A、所有脑外伤
- B、脑疝
- C、弥散性轴索损伤
- D、蛛网膜下出血

正确答案：**B**

37、败血症的含义是

- A、化脓菌栓子进入血液并随血流播散而不断产生症状者
- B、仅化验发现血液已有细菌而无症状者
- C、血内既有细菌也有细菌毒素并产生症状者



- D、以上均不是
- E、由细菌毒素进入血液而引起症状者

正确答案：**C**

38、哪一项不是脑挫裂伤紧急救治的选项

- A、预防应激性溃疡
- B、应用鼠神经生长因子
- C、保持呼吸道通畅
- D、维持水电解质平衡
- E、预防肺部感染

正确答案：**B**

39、对氧治疗的描述，下列哪项是错误的

- A、当肺泡血液灌流完全停止，氧治疗效果很差
- B、轻度肺部感染对氧治疗较敏感，疗效较好
- C、重度通气障碍对氧治疗较敏感，疗效较好
- D、以纠正低氧血症和提高氧供为目的
- E、当肺泡完全萎陷时，氧治疗效果很差

正确答案：**E**

40、患者意识不清，伴有躁动不安、错觉、幻觉或胡言乱语等精神症状，属于

- A、昏睡
- B、晕厥
- C、昏迷
- D、谵妄
- E、妄想

正确答案：**D**

41、慢性肺心病急性加重期使用利尿剂，可能引起

- A**、代谢性酸中毒
- B、稀释性低钠血症
- C、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- D、低钾低氯性碱中毒
- E、呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒

正确答案：**D**

42、男性，20岁，枕部外伤2小时来院就诊。X线平片示枕骨骨折，行CT

检查时突然呼吸停止，昏迷，双瞳等大。此时病人最可能出现的情况是

- A、小脑幕切迹疝
- B、枕骨大孔疝
- C、休克
- D、脑挫伤
- E、原发性脑干损伤

正确答案：B

43、不是下腔静脉的属支为

- A、髂总静脉
- B、腰静脉
- C、门静脉
- D、肝静脉
- E、肾静脉

正确答案：C

44、开放气道的方法错误的是

- A、仰头举颌法
- B、仰头抬颈法
- C、仰头举枕法
- D、托下颌法

正确答案：C

45、关节扭伤应采取先—的方法，肌肉抽筋应采取—的方法。

- A、热敷热敷
- B、冷敷冷敷
- C、热敷冷敷
- D、冷敷热敷

正确答案：D

46、患者，女性，20岁，I型糖尿病3年。近日恶心、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸，呼气可闻烂苹果。患者出现的可能情况是

- A、呼吸衰竭
- B、脑血管意外
- C、糖尿病酮症酸中毒
- D、颅内压升高
- E、低血糖

正确答案：**C**

47、有关急性心肌梗死下列哪项不正确

- A、个别病人可因冠状动脉痉挛引起管腔闭塞，而冠状动脉无严重狭窄
- B、严重心律失常致心排血量骤降，冠状动脉灌流量锐减是病因之一
- C、造成冠状动脉血供中断的病因大多为冠状动脉内血栓形成
- D、主要使左心室受累，但常合并右室及心房梗死
- E、往往在饱餐后，安静或睡眠时及用力太便后

正确答案：**D**

48、苯丙胺类合成毒品中毒的抢救措施哪项是正确的()

- A、对心动过速的患者可以应用美托洛尔
- B、采用物理方法降低患者体温
- C、以上都正确
- D、酸化尿液有利于毒品的排出
- E、对兴奋和狂躁患者可以应用苯二氮卓类药物如安定口服或注射

正确答案：**C**

49、颈部创伤危及生命的原因不包括：

- A、颈椎损伤引起的上肢瘫痪
- B、动力性呼吸衰竭
- C、颈部大血管破裂所致的大出血
- D、上呼吸道梗阻引起的窒息

正确答案：**A**

50、支气管扩张引起大咯血的原因为

- A、支气管发生囊性扩张
- B、支气管粘膜溃疡
- C、支气管动脉先天性解剖畸形
- D、支气管动脉与肺动脉终末支扩张血管瘤破裂
- E、合并重度支气管炎

正确答案：**D**

51、哪个症状是颅内压增高最早的表现，有时是唯一的症状

- A、头痛**
- B、意识障碍
- C、恶心、呕吐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248104071127006035>