

全国护师类考试重点试题精编

注意事项：

1. 全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。
3. 部分必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。
4. 请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

- 1、某病人有进食后上腹痛史，每年冬季加剧，近一周出现柏油样便提示
 - A. 慢性消化不良
 - B. 服用铁剂药物
 - C. 吃绿色蔬菜过多
 - D. 上消化道出血
 - E. 胰腺炎症
- 2、侵蚀性葡萄胎发生转移时的主要途径为
 - A. 淋巴转移
 - B. 盆腔种植
 - C. 经血行转移
 - D. 直接浸润
 - E. 骨骼转移
- 3、检查尿糖定量，其标本的留取方法为
 - A. 留清晨第 1 次尿 50~100ml
 - B. 随时留尿 50~100ml
 - C. 饭前留尿 50~100ml
 - D. 留取 24 小时尿
 - E. 用中段尿法留尿 5~10ml
- 4、诊断骨折最可靠的方法是
 - A. 局部疼痛
 - B. 弹性固定
 - C. 畸形
 - D. X 线检查
 - E. 异常活动

编号：

姓名：

地区：

省市：

密封线

密封线

5、患者，女，33岁。停经40天，下腹痛及阴道出血1天，量多，有血块。查体：子宫稍大，宫口有胚胎组织填塞。最有效的治疗措施是

- A. 压迫腹部，排出胚胎组织
- B. 刮宫术
- C. 输血
- D. 注射维生素K
- E. 纱布填塞阴道，压迫止血

6、胃肠减压期间的护理，下列哪项是错误的

- A. 患者应禁食及停口服药物
- B. 随时观察吸引是否有效
- C. 注意口腔护理
- D. 及时更换收集瓶
- E. 若发现胃管有鲜红血液吸出，继续持续吸引

7、颅内压增高“三主征”中，头痛的部位常位于

- A. 头顶部、颞部
- B. 枕后、头顶部
- C. 前额、两颞
- D. 眶部、头顶部
- E. 前额、枕后

8、疝的术前护理措施错误的是

- A. 皮肤准备
- B. 术前灌肠
- C. 积极治疗便秘
- D. 纠正水、电解质失衡
- E. 排尿困难可暂不处理

9、患者，女，30岁，诊断为甲状腺功能亢进。清晨测得脉率96次/分，血压17.3/9.3kPa(130/70mmHg)。计算其基础代谢率属于

- A. 正常
- B. 正常范围偏高
- C. 重度甲状腺功能亢进
- D. 中度甲状腺功能亢进
- E. 轻度甲状腺功能亢进

10、根据安格乐理论，丧亲者不会出现的心理反应（ ）。

- A. 冲击与怀疑
- B. 逐渐承认
- C. 克服失落
- D. 释怀
- E. 狂躁

11、治疗的胆囊结石，方法正确且效果确切的是下列哪种方法

- A. 药物溶石疗法
- B. 体外震波碎石
- C. 经皮胆囊去石术
- D. 胆囊切除术
- E. 胆囊切除、胆总管探查术

12、急性子宫内膜炎患者最有效的对因治疗措施为

- A. 鼓励产妇多饮水
- B. 加强口腔，皮肤清洁
- C. 取健侧卧位
- D. 输入足量液体
- E. 用敏感、足量、高效抗生素

13、门脉高压发生消化道出血的主要原因是

- A. 食管下端和胃底静脉曲张
- B. 腹壁和脐周静脉曲张
- C. 胃黏膜糜烂、出血
- D. 痔静脉曲张
- E. 脾功能亢进

14、为减轻支气管哮喘带来的痛苦应采取（ ）。

- A. 被动体位
- B. 自动体位
- C. 强迫坐位
- D. 强迫卧位
- E. 强迫俯卧位

15、糖尿病最基本的治疗措施是

- A. 饮食治疗
- B. 口服降糖药物治疗
- C. 胰岛素治疗
- D. 合适的体育锻炼
- E. 胰岛细胞移植

16、男性，45岁，在建筑施工中因突然塌方，双下肢压伤长达2h，经抢救解除压迫，双下肢有肿胀、疼痛，3h后突然尿少，尿比重低，尿中未见血细胞。该病人诊断为

- A. 急性肾衰竭
- B. 休克
- C. 脱水
- D. 膀胱损伤
- E. 尿道损伤

17、碱性物中毒患者洗胃时选用

- A. 植物油

- B. 5%醋酸
- C. 2%~4%碳酸氢钠
- D. 镁乳(氢氧化镁合剂)
- E. 1: 20000 高锰酸钾

18、产前检查发现巨大儿，最需考虑的情况是

- A. 经产妇
- B. 营养过剩
- C. 孕妇并发糖尿病
- D. 父母身材高大
- E. 过期妊娠

19、4个月小儿，生后牛乳喂养。因惊厥经检查确诊为维生素D缺乏性手足抽搐症。入院后出现全身性抽搐，其紧急处理措施哪项不妥

- A. 立即让患儿平卧，尽量避免刺激
- B. 注意保持呼吸道畅通
- C. 10%葡萄糖酸钙 5~10ml 稀释后缓慢静脉注射
- D. 苯巴比妥钠肌肉注射或水合氯醛保留灌肠
- E. 立即用维生素 D240 万 U 肌肉注射

20、陈先生接管一家濒临倒闭的企业三个月，出现头痛、失眠、心跳加快、肌肉酸痛等症状，按塞利的压力理论，他所处的压力生理反应期别是

- A. 衰竭期
- B. 适应期
- C. 警告期
- D. 抵抗期
- E. 反应期

21、下列对于急性白血病患者治疗描述，错误的是

- A. 骨髓移植患者安置在单间病房即可
- B. 多喝水，给予别嘌醇抑制尿酸合成，预防尿酸肾病
- C. 化疗过程分为诱导缓解及巩固强化治疗两个阶段
- D. 化疗药物治疗患者必须定期查血常规、骨髓象
- E. 化疗完全缓解的目标是白血病的症状、体征消失，血常规和骨髓象基本正常

22、治疗再障宜首选

- A. 硫酸亚铁
- B. 糖皮质激素
- C. 雄激素
- D. 白消安(马利兰)
- E. 苯丁酸氮芥

23、在我国，第一所护士学校成立于

- A. 1780年，北京

- B. 1788 年，上海
- C. 1880 年，北京
- D. 1888 年，福州
- E. 1898 年，南京

24、以下有关新生儿败血症的临床表现，错误的是

- A. 产后感染最多见，发生在生后 3 天内
- B. 表现无特异性
- C. 可合并坏死性小肠炎、骨髓炎
- D. 可出现全身中毒症状
- E. 未成熟儿可表现为体温不升

25、高分化癌是指

- A. 分化细胞接近正常，恶性度低
- B. 分化细胞核分裂较多，恶性程度高，预后差
- C. 分化细胞接近正常，恶性度高
- D. 分化细胞核分裂较多，恶性度低
- E. 分化细胞核分裂较少，恶性度高

26、要素饮食的配制与保存中，下列不正确的是（ ）。

- A. 配制时需无菌操作
- B. 配制好的溶液在 4℃ 以下冰箱内冷藏
- C. 鼻饲及经造瘘口注入时的温度宜为 37℃
- D. 配制好的要素饮食应保证 24 小时内用完
- E. 配制液由临床医师、责任护士和营养师共同制订

27、患者，男，诊断“脑出血”，患者口腔有异味，护士应选择的含漱液是（ ）。

- A. 硼酸溶液
- B. 朵贝尔液
- C. 生理盐水
- D. 醋酸
- E. 碳酸氢钠

28、患者，男性，28 岁。全身重度水肿，尿蛋白 6.2g/24h，血浆白蛋白 20g/L，血压 80/50mmHg，肾功能 BUN9.0mmol/L，Cr100 μmol/L，应选择的主要治疗措施是

- A. 输新鲜血浆
- B. 输白蛋白
- C. 应用呋塞米（速尿）
- D. 使用环磷酰胺
- E. 糖皮质激素

29、患者，男性，64 岁，慢性肺气肿病史 24 年，发热，咳大量黏液脓痰 2 周，伴心悸、气喘。护理检查：呼吸急促，发绀明显，颈静脉怒张，下肢浮肿。该患者应避免使用的药物是

- A. 抗生素

- B. 强心剂
- C. 利尿剂
- D. 镇静剂
- E. 钙通道阻滞剂

30、患者，女，30岁。心脏瓣膜病二尖瓣狭窄4年，头晕、心悸、心前区不适1小时。查体：脉搏90次/分，心率110次/分，第一心音强弱不等，心率极不规则。心电图示P波消失，代之以大小形态不等及规律不一的f波，QRS波群形态正常。该患者可能发生了（ ）。

- A. 心房纤颤
- B. 心室颤动
- C. 房性期前收缩
- D. 室性期前收缩
- E. 窦性心律不齐

31、“三查”“七对”的内容不包括

- A. 操作前中后查对
- B. 用药后反应
- C. 药名、浓度
- D. 剂量、用法、时间
- E. 床号、姓名

32、甲状腺腺瘤患者的肿块特点是

- A. 质地较硬
- B. 表面不平
- C. 边界清楚
- D. 有压痛
- E. 不随吞咽上下移动

33、对化疗患者实行保护性隔离，主要预防

- A. 上感
- B. 腹泻
- C. 肝损害
- D. 肛周脓肿
- E. 感染

34、慢性肺源性心脏病患者发生右心衰水肿时，运用利尿药物正确的是（ ）。

- A. 宜用速效排钾利尿药
- B. 全程全量使用
- C. 短疗程、小剂量使用
- D. 绝对禁忌使用排钾利尿药
- E. 不能使用

35、下列哪种心律失常应视为危急情况

- A. 心房颤动
- B. 窦性心动过速
- C. 室性期前收缩，“R”落在“T”上
- D. 室性期前收缩，2~4次/分
- E. 窦性心律不齐

36、患者，男性，50岁。餐后腹部烧灼痛2个月，黑便2日入院。对其诊断最有价值的辅助检查是

- A. 胃镜检查
- B. 血常规检查
- C. 选择性动脉造影
- D. X线检查
- E. 胃液分析

37、患者女，38岁。血红蛋白40g/L，诊断为缺铁性贫血，已给予口服铁剂治疗，饮食护理不正确的是

- A. 补充铁剂的同时补充蛋白
- B. 补充铁剂的同时补充维生素
- C. 每天饮食中必须有含铁丰富的食物
- D. 餐后饮浓茶可以利于铁的吸收
- E. 消化不良者要少量多餐

38、患者，男性，32岁。因双下肢皮肤干燥变薄、苍白，汗毛脱落、肌肉萎缩就诊。检查足背动脉搏动消失，以“血栓闭塞性脉管炎”收入院。入院后行血栓闭塞性脉管炎术，术后护士观察肢体远端血运情况，观察的体征应除外

- A. 双侧足背动脉搏动
- B. 皮肤温度
- C. 皮肤颜色
- D. 皮肤感觉
- E. 皮肤厚度

39、浸石膏绷带适宜的水温是

- A. 10~15℃
- B. 25~35℃
- C. 35~40℃
- D. 45~50℃
- E. 55~60℃

40、麻疹最具有早期诊断价值的表现是（）。

- A. 接触麻疹患儿10~14天后发热
- B. 结膜充血、畏光流泪及眼睑浮肿
- C. 耳后、发际出现淡红色充血性斑丘疹
- D. 全身淋巴结肿大
- E. 白色麻疹黏膜斑（柯氏斑）

41、代谢性碱中毒患者呼吸的特点是

- A. 变快
- B. 变深
- C. 变深变快
- D. 变浅
- E. 变浅变慢

42、共用题干

女性，70岁。患类风湿关节炎25年。双手腕、掌指、指间关节肿胀，时轻时重，有晨僵。护理体检：患者双手呈天鹅颈样畸形，饮食起居困难。

- A. 关节疼痛
- B. 关节肿胀
- C. 晨僵
- D. 关节畸形
- E. 关节功能障碍

43、属于生化评估的内容是

- A. 腰大肌试验
- B. 营养状况
- C. 粪便的检查
- D. 心脏听诊
- E. 个人生活习惯

44、患者，女，32岁。甲亢患者。近2周来，眼球突出，眼裂增宽，瞬目减少，突眼度18mm，辐辏反射减弱，双眼聚合不良。出现上述表现的原因最可能是（ ）。

- A. 眶内继发肿瘤
- B. 球后组织水肿
- C. 球后淋巴细胞浸润
- D. 免疫复合物沉积
- E. 眼外肌和上睑肌张力增高

45、大量输血后，患者出现手足抽搐时，应用的药物是

- A. 10%氯化钠
- B. 5%碳酸氢钠
- C. 0.9%氯化钠
- D. 10%葡萄糖酸钙
- E. 11.2%乳酸钠

46、非洋地黄中毒引起的阵发性室上性心动过速，用药物治疗无效时应采用的方法是

- A. 苯妥英钠
- B. 射频消融术
- C. 安装人工心脏起搏器
- D. 非同步直流电复律

E. 同步直流电复律

47、对于先兆子痫孕妇的饮食指导，下列说法正确的是（ ）。

- A. 尽量多吃动物脂肪
- B. 避免高盐饮食
- C. 尽量一次性多喝水
- D. 减少水果的摄入
- E. 尽量减少饭量

48、易风化潮解的药物应放在（ ）。

- A. 冰箱冷藏
- B. 阴凉干燥处
- C. 密封瓶中
- D. 避光纸盒内
- E. 有色瓶中

49、除哪项外，均是手术护士的具体职责

- A. 手术前一天了解病情
- B. 提前 20~30 分钟洗手
- C. 手术中密切配合
- D. 手术结束后，做手术室内清洁和消毒工作
- E. 手术结束后，整理手术台和清洗器械

50、一新生儿体温超过 38℃，应采取的有效措施是（ ）。

- A. 冷盐水灌肠
- B. 给退热药
- C. 加被发汗
- D. 打开包被
- E. 酒精擦浴

二、多选题

51、患者，女性，62岁，肥胖，有高血脂及高血压病史4年。近日心前区发生疼痛。如考虑为心绞痛。

- A. 1分钟以内
- B. 5~10分钟
- C. 超过30分钟
- D. 3~5分钟
- E. 15~20分钟

52、患者服用地高辛前应评估

- A. 呼吸
- B. 1分钟心率
- C. 水肿程度
- D. 心功能分级

E. 膝腱反射

53、易引起第Ⅷ对脑神经损害的抗结核药物是

- A. 乙胺丁醇
- B. 异烟肼
- C. 链霉素
- D. 吡嗪酰胺
- E. 利福平

54、对痰液过多且无力咳嗽者，为防止窒息，在翻身前护士首先应（ ）。

- A. 给患者吸氧
- B. 给患者排痰
- C. 指导患者有效咳嗽
- D. 给患者漱口
- E. 慢慢移动患者

55、某患者患有2型糖尿病，体态肥胖，“三多一少”症状不太明显，血糖偏高，长期采用饮食控制、休息、口服降血糖药，但血糖仍高，对此下列哪项处理最恰当

- A. 改用胰岛素治疗
- B. 增加运动疗法
- C. 加大降糖药剂量
- D. 用抗生素控制感染
- E. 住院进一步待查

56、有腹腔内脏损伤，而体检时腹膜刺激征不明显，此情况主要见于

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 胰破裂
- D. 肠穿孔
- E. 胃穿孔

57、溃疡性结肠炎病变常见的累及部位是

- A. 直肠和结肠
- B. 回盲部
- C. 盲肠
- D. 结肠
- E. 升结肠

58、惊厥持续状态是指

- A. 发作持续超过30分钟
- B. 发作持续超过60分钟
- C. 2次发作间歇期意识不能恢复
- D. 2次发作间歇期意识不能完全恢复
- E. 发作持续超过30分钟或2次发作间歇期意识不能恢复

59、确诊为2级高血压，伴有1~2个危险因素，其危险度分层为

- A. 急进型高血压
- B. 低危
- C. 中危
- D. 高危
- E. 很高危

60、患者男，68岁。行胰头十二指肠切除术(Whipple术)后4小时，患者变换卧位后30分钟内，腹腔引流管突然引流出200ml鲜红色血性液体。正确的措施是

- A. 恢复原卧位
- B. 加大吸引负压，促进引流
- C. 严密观察生命体征，报告医生
- D. 加快输液输血速度
- E. 关闭引流管，暂停引流

61、肝性脑病合并碱中毒时应选用

- A. 谷氨酸
- B. 精氨酸
- C. 鸟氨酸
- D. 色氨酸
- E. 半胱氨酸

62、患者，男性，23岁。咳嗽、右侧胸痛1天。体检：右侧肺部呼吸音减弱，语颤增强，叩诊浊音，闻及支气管呼吸音及湿啰音。最大的可能为

- A. 右侧肺炎
- B. 肺结核
- C. 右侧肺气肿
- D. 右侧气胸
- E. 胸膜炎

63、阴道后壁修补术后，下列哪项护理措施是错误的

- A. 头低足高
- B. 保持大便通畅
- C. 外阴清洁
- D. 避免使用腹压
- E. 治疗慢性咳嗽

64、患者，女，32岁。妊娠33周，突感有较多液体自阴道流出，胎心率70~80次/分，阴道检查有条索状物脱出宫颈2cm。其胎心异常的最可能原因为()。

- A. 胎头受压
- B. 脐带打结
- C. 脐带脱垂
- D. 脐带先露

E. 脐带绕颈

65、系统性红斑狼疮最常受损的部位是（ ）。

- A. 大脑
- B. 心脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

66、出生时存在，且永不消失的神经反射是（ ）。

- A. 吸吮反射
- B. 觅食反射
- C. 拥抱反射
- D. 握持反射
- E. 吞咽反射

67、会阴侧切术切口的长度一般为

- A. 1~3cm
- B. 2~4cm
- C. 3~5cm
- D. 4~6cm
- E. 5~7cm

68、下列哪项不是肾移植患者的并发症

- A. 出血
- B. 感染
- C. 急性排斥反应
- D. 血尿素氮和肌酐增高
- E. 胆道梗阻、肝功能异常

69、下腹手术各皮范围哪项不正确

- A. 上自乳头水平
- B. 下至大腿上 1/3 前内侧的皮肤
- C. 两侧至腋后线
- D. 剔除阴毛
- E. 以切口为中心周围 10~15cm

70、诊断肾损伤的重要依据是

- A. 了解有无外伤后即有血尿的病史
- B. 摄尿路平片
- C. 大剂量排泄性尿路造影
- D. CT 检查
- E. 放射性核素检查

71、心尖区舒张期杂音见于

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 急性心肌炎
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 心绞痛

72、肝硬化大量腹水患者的护理，下列哪项是错误的

- A. 给予半卧位
- B. 应用利尿剂者均应补钾
- C. 低盐饮食
- D. 定期测量腹围和体重
- E. 皮肤护理

73、初产妇，27岁，妊娠高血压。剖宫产术后硫酸镁静脉滴注，最先出现的毒性反应是

- A. 血压过低
- B. 尿量过少
- C. 心率减慢
- D. 膝腱反射减弱或消失
- E. 呼吸减慢

74、低钾血症时静脉输液补钾的浓度一般不超过

- A. 0.1%
- B. 0.2%
- C. 0.3%
- D. 0.4%
- E. 0.5%

75、类风湿关节炎最常出现的部位是

- A. 足趾
- B. 膝关节
- C. 踝关节
- D. 肘关节
- E. 腕、掌关节近端指关节

76、皮肤护理的目的不包括

- A. 促进皮肤血液循环
- B. 减轻皮肤的天然屏障作用
- C. 增强皮肤的排泄功能
- D. 预防压疮等并发症
- E. 使患者身体舒适、清洁

77、碱性物中毒患者洗胃时选用

A. 植物油

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/248123001141006116>