

2024 年甘肃省临夏市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题真题题库【满分必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列不属于艾滋病的基本特征的是

- A: 体重减轻或非正常的生长减慢
- B: 自然杀伤细胞（NK 细胞）活性下降
- C: B 淋巴细胞功能失调
- D: T 淋巴细胞功能下降

答案：A

2. （2017 年真题）下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法，错误的是（）

- A: 随餐服用，并大量饮水，可增加吸收、减少胃肠道刺激
- B: 食管炎为典型不良反应
- C: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位
- D: 应避免同时使用两种双膦酸盐

答案：A

3. 通过直接阻断 α

- A: 硝苯地平
- B: 哌唑嗪
- C: 甲基多巴
- D: 利血平

答案：B

4. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

A: 期刊论文

B: 三级信息源资料

C: 二级信息源资料

D: 网站信息

答案：C

5. 痛经症状严重者可选用的处方药为

A: 可待因

B: 对乙酰氨基酚

C: 布洛芬

D: 贝诺酯

答案：A

6. 防心绞痛药物

A: 硝酸甘油

B: 胃黏膜保护剂

C: 甘草合剂

D: 去氨加压素

答案：A

7. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

A: 高糖

B: 食醋

C: 饮茶

D: 食盐

答案：D

8. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>90cm，女性>80cm
- B: 男性>85cm，女性>80cm
- C: 男性>95cm，女性>85cm
- D: 男性>90cm，女性>85cm

答案：D

9. 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是

- A: 消渴丸联用格列本脲片
- B: 鼻炎康片联用马来酸氯苯那敏片
- C: 曲克芦丁片联用维生素 C 片
- D: 新癬片联用吡哆美辛胶囊

答案：C

10. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。体检：身高 160cm，体重 78kg。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，白细胞 $8.0 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10.0 \times 10^9/L$ ），红细胞 $4.0 \times 10^{12}/L$ （参考值 $3.55 \sim 5.0 \times 10^{12}/L$ ），总胆固醇 6.0mmol/L（参考值 $<5.2 \text{mmol/L}$ ）。经饮食控制，规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 格列齐特
- D: 胰岛素

答案：B

11. 题]可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

- A: 阿米卡星

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 米诺环素
- C: 诺氟沙星
- D: 头孢唑林

答案：C

12. 在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

- A: 国家基本药物处方集
- B: 新编药理学
- C: 中国国家处方集
- D: 中国药学文摘

答案：C

13. 饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的是

- A: 维生素 B1、维生素 B2
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 利血平

答案：C

14. (在乳汁中排泄的药物)青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

- A: 脂溶性高
- B: 呈弱碱性
- C: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- D: 呈弱酸性

答案：D

15. 重度哮喘的处理不包括

- A: 吸氧
- B: 给予糖皮质激素
- C: 补液
- D: 注射毛花苷 C (西地兰)

答案：D

16. 按照药品不良反应程度分级标准评判,轻微的反应或疾病,症状不发展,一般无需治疗,应评判为

- A: 中度
- B: 弱轻度
- C: 重度
- D: 轻度

答案：D

17. 女性,32岁,3年来月经量增多,乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L,呈小细胞低色素性贫血,白细胞 $7 \times 10^9 / L$,血小板 $120 \times 10^9 / L$,血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- B: 尽量空腹服用亚铁盐,以促进吸收
- C: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物中摄取铁 2~2.5mg
- D: 钙剂可促进铁剂吸收

答案：A

18. 利尿药呋达帕胺引起的主要不良反应是

- A: 低钾血症
- B: 水肿
- C: 高钾血症
- D: 多毛症

答案：A

19. 制定新药新知识培训制度，归属

- A: 管理规范到位
- B: 科学发展
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 知识培训

答案：D

20. 肌酸磷酸激酶检查超过正常值

- A: 诊断心肌梗死
- B: 诊断痛风
- C: 诊断急性胰腺炎
- D: 诊断消化性溃疡

答案：A

21. (2019 年真题) 患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应用他汀类药物之间的因果关系应评价为

- A: 肯定
- B: 很可能
- C: 可能
- D: 可能无关

答案：A

22. 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

- A: 异烟肼与牛奶同服
- B: 华法林与人参同服
- C: 硫酸亚铁与维生素 C 同服
- D: 左甲状腺素与钙剂同服

答案: C

23. 可用于习惯性流产的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 司坦唑醇
- C: 甲羟孕酮
- D: 依普黄酮

答案: C

24. (2018 年真题) 干眼症可选用 ()

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 玻璃酸钠滴眼液
- C: 色甘酸钠滴眼液
- D: 氧氟沙星滴眼液

答案: B

25. 氟乙酰胺杀鼠药中毒呈现

- A: 恶心、呕吐、口内有金属味
- B: 出血、凝血时间延长
- C: 抽搐、进行性加重
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案: C

26. 及时发现重大药害事件，即可防止药害事件蔓延和扩大

- A: 促进临床合理用药
- B: 促进新药的研制开发
- C: 减少 ADR 的危害
- D: 为临床药物评价提供依据

答案：C

27. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：D

28. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力

- A: 为临床药物评价提供依据
- B: 促进临床合理用药
- C: 促进新药的研制开发
- D: 减少 ADR 的危害

答案：B

29. 适宜餐前给药的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 法莫替丁
- C: 复方铝酸铋
- D: 缬沙坦

答案：C

30. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处 1 片，一日不得超过 3 片的药物是 ()。

- A: 甲硝唑口腔粘贴片
- B: 冰硼咽喉散
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 西地碘含片

答案：C

31. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱
- B: 鞣酸蛋白
- C: 药用炭
- D: 洛哌丁胺

答案：D

32. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

- A: 碘解磷定
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 K
- D: 毒扁豆碱

答案：B

33. 引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

- A: 肾小管阻塞
- B: 肾间质纤维化
- C: 直接肾毒性
- D: 前列腺素合成障碍

答案：A

34. (2017 年真题) 下列药物中适宜在睡前服用的是 ()

- A: 多潘立酮
- B: 辛伐他汀
- C: 美洛昔康
- D: 泼尼松

答案：B

35. 以"保证贮存和发出的药品质量合格"为职责的技能是

- A: 自主学习能力
- B: 沟通技能
- C: 调剂技能
- D: 药品管理技能

答案：D

36. 流行性出血性结膜炎宜选用

- A: 益康唑
- B: 羟苄唑
- C: 酞丁安
- D: 双氯芬酸

答案：B

37. 可引起血清总蛋白降低的是

- A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
- B: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等
- C: 各种原因脱水所致的血液浓缩
- D: 摄入不足、消化不良时

答案：D

38. 具有耳毒性、肾毒性的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 链霉素

答案：D

39. 用 10%的氯化钠注射液和注射用水配制 3%的氯化钠注射液 100ml, 所需的 10%氯化钠注射液的毫升数是()

- A: 30
- B: 33.3
- C: 25
- D: 10

答案：A

40. 可与眼球表面和坏死组织及分泌物中的蛋白质形成极薄的蛋白膜起保护作用，高浓度时则有杀菌和凝固作用的是

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液

C: 磺胺醋酰钠滴眼液

D: 可的松滴眼液

答案: B

41. 血管内容血时，尿中可见()。

A: 乳糜尿

B: 白细胞管型

C: 血红蛋白尿

D: 红细胞管型

答案: C

42. 可引起排尿困难，尿潴留患者禁用的药物是

A: 加兰他敏

B: 法莫替丁

C: 阿米替林

D: 奥美拉唑

答案: C

43. 属于雄激素受体阻断剂的是 ()

A: 度他雄胺

B: 雌三醇

C: 普适泰

D: 氟他胺

答案: D

44. 起效快，抗焦虑作用强，对急性期焦虑患者可考虑短期使用的治疗药是

A: 丁螺环酮

- B: 苯海索
- C: 地西洋
- D: 加兰他敏

答案: C

45. 对于窦性心动过速，最宜选用

- A: 利多卡因
- B: 硝酸酯类
- C: 地高辛
- D: 普萘洛尔

答案: D

46. 患者，女，29 岁，孕 25+6 周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为 Hb71g / L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1 小时后继续静脉注射余下剂量
- B: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- C: 口服，每次 5ml，一日 3 次
- D: 快速静脉注射

答案: A

47. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000~3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 尿沉渣磷酸盐
- B: 尿沉渣管型

C: 尿沉渣白细胞

D: 尿沉渣结晶

答案: B

48. (2018 年真题) 患儿, 男, 50 天, 体重 5kg, 时值夏季, 体温 37.9℃, 出现烦躁, 哭闹不安, 无其他症状。其家人到药店询购买退热药, 药师应推荐 ()

A: 减少衣被, 可物理降温或必要时就诊

B: 对乙酰基酚片 (500mg) 1/10 片, 溶于少量温开水服用

C: 阿苯片, 半片, 研碎后溶于少量温开水服务

D: 阿司匹林泡腾片 (500mg) 1/10 片, 溶于少量温开水服用

答案: A

49. 关于患者用药注意事项的说法错误的是 ()

A: 在患者症状好转后, 应立即停用比索洛尔

B: 应注意观察是否有黑便

C: 应定期监测地高辛血药浓度

D: 应定期监测血压、心率

答案: A

50. 格列齐特片的适宜服药时间是

A: 清晨

B: 餐中

C: 餐后

D: 餐前

答案: D

51. 由环境（灰尘、风沙、倒睫、屈光不正）刺激所致的非细菌性结膜炎可选用

- A: 碘苷滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 杆菌肽眼膏
- D: 1%泼尼松龙滴眼液

答案：B

52. 药师应对"患者投诉"，下列说法不正确的是

- A: 接待者应举止大方，行为端庄
- B: 保存有形证据
- C: 当事人需要亲自接待
- D: 尽快将投诉人带离现场

答案：C

53. 老年性骨质疏松的"三联药物"治疗

- A: 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐
- B: 单独用双膦酸盐
- C: 长期口服维生素 D
- D: 用甲状旁腺激素

答案：A

54. 不宜与蛋白质食物合用的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 硫酸亚铁
- C: 磺胺类药物
- D: 左旋多巴

答案：D

55. 若需要 70%的乙醇 1000ml，现有 95%的乙醇应如何配制

- A: 取 736.8ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- B: 取 263.2ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- C: 取 263.2ml95%的乙醇，加 1000ml 水
- D: 取 736.8ml95%的乙醇，加 1000ml 水

答案：A

56. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，从而进行药物经济学评价，这一评价方法属于

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效果分析

答案：B

57. (2016 年真题) 对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是 ()。

- A: 雷美尔通
- B: 佐匹克隆
- C: 地西洋
- D: 米氮平

答案：D

58. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的是()

- A: 叶酸
- B: 苯丝肼
- C: 奥美拉唑

D: 克拉维酸钾

答案: C

59. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

A: 二巯丙醇

B: 二巯丁二钠

C: 青霉胺

D: 依地酸钙钠

答案: D

60. 患者，男，68 岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间 8 点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

A: 即刻加用吗啡缓释片一次

B: 即刻加用芬太尼透皮贴剂

C: 即刻加用吗啡片一次

D: 即刻加用可待因片一次

答案: C

61. 对该患者进行初始经验性抗感染治疗,宜选用的药物是 ()

A: 多西环素

B: 左氧氧沙星+阿奇霉素

C: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素

D: 阿奇霉素

答案: C

62. 晚期肝硬化时，哌替啶和普萘洛尔生物利用度增加 2 倍，是指

A: 药物吸收

B: 药物代谢

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 药物排泄

D: 药物分布

答案：A

63. (2017 年真题) 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是 ()

A: 氯己定含漱液

B: 替硝唑含漱液

C: 西地碘含片

D: 地塞米松粘贴片

答案：D

64. 特异体质的患者及其家族成员可能发生过同样反应 (如过敏) 提示必须

A: 排除药物以外的因素; 必要的实验室检查

B: 追溯用药史; 询问用药过敏史和家族史

C: 流行病学的调查

D: 确定致病药物

答案：B

65. (2015 年真题) 处方中“餐前给药”的外文缩写是 ()。

A: qn

B: Ac

C: po

D: pc

答案：B

66. 下列哪种药物是 WHO 规定的第一阶梯镇痛药物

A: 可待因

- B: 吗啡
- C: 阿司匹林
- D: 芬太尼

答案：C

67. 治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

- A: 半衰期小于 30 分钟
- B: 半衰期 8~24 小时
- C: 半衰期大于 24 小时
- D: 半衰期大于 30 小时

答案：A

68. 预混胰岛素 30R 的组成为()

- A: 70%中效胰岛素，30%短效胰岛素
- B: 30%中效胰岛素，70%短效胰岛素
- C: 30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素
- D: 70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素

答案：A

69. 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

- A: RBC
- B: Hb
- C: BUN
- D: ALT

答案：D

70. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差（）

- A: 琥珀酸亚铁（2 价铁）
- B: 右旋糖酐铁（2 价铁）
- C: 乳酸亚铁（2 价铁）
- D: 枸橼酸铁（3 价铁）

答案：D

71. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 晚间服用
- B: 早晚分别服用
- C: 早晨服用
- D: 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类

答案：D

72. 与患者进行沟通时沟通技巧不包括

- A: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度
- B: 认真聆听，使用通俗易懂的语言
- C: 尽量使用专业性术语
- D: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

答案：C

73. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- B: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- C: 两者合用作用相反，互相降低药效
- D: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

答案：A

74. 会引起头晕、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘

- A: 精神刺激剂
- B: β -受体阻断剂
- C: 蛋白同化激素
- D: 利尿剂

答案：B

75. 对患者进行用药指导时，应强调不同剂型药物的正确服用方式，否则可导致药效降低或引起不良反应。下列用药指导错误的是

- A: 咽炎患者服用含片，待含片全部融化后，短时间内不宜饮水
- B: 高血压患者服用硝苯地平控释片，待血压控制稳定后，可适当减少给药剂量，将药品均匀掰开分次服用
- C: 透皮贴剂不宜贴敷在破损、溃烂、渗出部位，定期更换部位贴用
- D: 胃溃疡患者服用硫糖铝片，最好充分咀嚼后，用少量温水送服

答案：B

76. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

- A: II 期临床试验
- B: 临床预试验
- C: I 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：C

77. 无治疗指征补钙

- A: 盲目联合用药
- B: 超适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 非适应证用药

答案：C

78. 可用于了解肾小球滤过功能的是

- A: 胆固醇
- B: 肌酐
- C: 淀粉酶
- D: 尿素氮

答案：D

79. γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

- A: $\leq 30\text{U/L}$
- B: $< 40\text{U/L}$
- C: 男性 11~50U/L
- D: $\leq 50\text{U/L}$

答案：C

80. 低盐饮食、避免情绪大波动，最适合于

- A: 糖尿病
- B: 骨质疏松
- C: 高血压
- D: 焦虑障碍

答案：C

81. 有机氟中毒的特效解毒剂是

- A: 氯磷定
- B: 烯丙吗啡
- C: 维生素 K1
- D: 乙酰胺

答案：D

82. 钙通道阻滞剂

- A: 依那普利
- B: 氨氯地平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 缬沙坦

答案：B

83. 关于尿路感染的用药注意事项，说法不正确的是

- A: 尽量避免尿路器械的使用
- B: 服用磺胺类药物时应少喝水
- C: 经验性用药有头孢氨苄、阿莫西林等
- D: 无症状菌尿仅推荐筛查和治疗孕妇以及接受可能导致尿道黏膜出血的侵入性操作的患者

答案：B

84. 患者，男，57岁，查体：心率54次/分，既往患有痛风。近期体检发现高血压，未服药时血压维持在150/95mmHg左右，建议服药控压，适宜该患者的降压药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 氯沙坦
- D: 美托洛尔

答案：C

85. 以下属于急性肾盂肾炎表现的是（）

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/255030001121012033>