

2024 河南省西华县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库大全附答案【培优】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列属于非选择性 β 受体阻断剂的是

- A: 阿替洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 美托洛尔
- D: 比索洛尔

答案：B

2. 通过抑制 Ca

- A: 普萘洛尔
- B: 胍乙啶
- C: 硝酸甘油
- D: 硝苯地平

答案：D

3. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

- A: 便秘
- B: 胆绞痛
- C: 躁狂
- D: 低血压

答案：D

4. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 整合素受体阻断剂
- D: 环氧酶抑制剂

答案：D

5. 糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

- A: 格列喹酮
- B: 二甲双胍
- C: 正规胰岛素
- D: 珠蛋白锌胰岛素

答案：C

6. (2017 年真题) 用药时需关注肺毒性的药物是 ()

- A: 长春新碱
- B: 博来霉素
- C: 柔红霉素
- D: 紫杉醇

答案：B

7. (2018 年真题) 普通感冒患者, 有打喷嚏、流鼻涕的症状, 宜选用的药物是 ()

- A: 右美沙芬片
- B: 茶碱缓释片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂
- D: 氯苯那敏片

答案：D

8. (2016 年真题) 组胺 H₂ 受体阻断的抑酸作用强度比较，正确的是

- A: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁
- B: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- C: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁
- D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案: B

9. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

- A: 中枢神经系统毒性
- B: 肝脏损害
- C: 白细胞减少
- D: 眼部水肿

答案: A

10. 属于硝基呋喃类的是

- A: 磺胺甲
- B: 夫西地酸
- C: 甲硝唑
- D: 呋喃妥因

答案: D

11. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 尼莫地平
- D: 氨氯地平

答案：C

12. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

- A: 氯化钠
- B: 氯化铵
- C: 乳酸钠
- D: 碳酸氢钠

答案：D

13. 唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

- A: 小剂量阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 小剂量氟伐他汀
- D: 大剂量阿托伐他汀

答案：B

14. 属于 I b 类抗心律失常药的是

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 胺碘酮
- D: 普罗帕酮

答案：A

15. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

- A: 丙酸睾酮
- B: 伐地那非
- C: 呋塞米
- D: 坎利酮

答案：C

16. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 依替米星
- D: 阿奇霉素

答案：B

17. 治疗各种类型的癫痫选用

- A: 佐匹克隆
- B: 布桂嗪
- C: 丙戊酸钠
- D: 多奈哌齐

答案：C

18. 可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

- A: 呋塞米
- B: 维生素
- C: 美司钠
- D: 糖皮质激素

答案：C

19. 与链激酶、尿激酶联用溶栓治疗，可增加疗效，且不显著增加严重出血发生率的是

- A: 阿司匹林

B: 低分子肝素

C: 华法林

D: 肝素

答案：A

20. 抑制核苷酸还原酶

A: 阿糖胞苷

B: 甲氨蝶呤

C: 氟尿嘧啶

D: 羟基脲

答案：D

21. (2015 年真题) 辅助治疗不孕症的维生素是 ()。

A: 维生素 B5

B: 烟酸

C: 维生素 E

D: 维生素 B2

答案：C

22. 治疗伤寒、副伤寒的首选药物是

A: 青霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 氯霉素

D: 红霉素

答案：C

23. 使用痤疮治疗药物不会出现

A: 红斑

- B: 皮肤色素沉着
- C: 眼周局部刺激
- D: 中枢神经毒性

答案：D

24. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 竞争性对抗
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 与其竞争结合血浆蛋白
- D: 产生协同作用

答案：B

25. 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)应避免与其联合应用的是()

- A: β 受体阻断药
- B: 人促红素
- C: 噻嗪类利尿药
- D: 留钾利尿药

答案：D

26. 主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

- A: 洛伐他汀
- B: 氯贝丁酯
- C: 苯扎贝特
- D: 普萘洛尔

答案：A

27. 脓疱型痤疮可选用()

- A: 维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 林旦霜

D: 酮康唑

答案：B

28. (2015 年真题) 属于延长动作电位时程药 (第Ⅲ类) 的抗心律失常药的是 ()。

A: 美西律

B: 拉贝洛尔

C: 胺碘酮

D: 维拉帕米

答案：C

29. H₁ 受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

A: 主要用于治疗变态反应性疾病

B: 主要代表药有法莫替丁

C: 可用于治疗变态反应性失眠

D: 可用于治疗妊娠呕吐

答案：B

30. 阿片类药物治疗期间最常出现的不良反应

A: 尿频、尿急、尿潴留

B: 认知障碍

C: 身体和精神依耐性

D: 便秘、恶心、镇静功能受损

答案：D

31. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 螺内酯
- B: 贝那普利
- C: 呋塞米
- D: 比索洛尔

答案：B

32. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

- A: 螺内酯
- B: 甘露醇
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：A

33. (2015 年真题) 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是 ()。

- A: 格列美脲
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 普萘洛尔

答案：C

34. 关于 NSAIDs 类药物所致不良反应的说法，正确的是 ()

- A: NSAIDs 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见
- B: 非选择性 NSAIDs 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- C: 非选择性 NSAIDs 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂

D: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物

答案：B

35. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

A: 阿司匹林

B: 华法林

C: 二甲双胍

D: 头孢哌酮

答案：D

36. 巨幼红细胞性贫血应首选

A: 叶酸+维生素 B

B: 亚叶酸钙

C: 维生素 B

D: 维生素 B

答案：A

37. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

A: 25 倍

B: 40 倍

C: 15 倍

D: 100 倍

答案：A

38. (2018 年真题) 具有抗炎作用, 可用于各型肝炎治疗的药物是 ()

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 双环醇

C: 异甘草酸镁

D: 门冬氨酸钾镁

答案: C

39. 其缓释片剂应与食物同服的是

A: 氨曲南

B: 克拉霉素

C: 阿奇霉素

D: 红霉素

答案: B

40. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

A: 阿那曲唑

B: 他莫昔芬

C: 氟他胺

D: 曲妥珠单抗

答案: D

41. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

A: 修复消化道黏膜

B: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能

C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素

D: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

答案: D

42. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是（）。

- A: 洛哌丁胺片
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 双歧三联活菌胶囊
- D: 地衣芽孢杆菌胶囊

答案：A

43. 不属于浓度依赖性抗菌药物的是

- A: 达托霉素
- B: 氨基糖苷类
- C: 阿奇霉素
- D: 氟喹诺酮类

答案：C

44. 抑制骨髓造血功能的是

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 左氧氟沙星
- D: 氯霉素

答案：D

45. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 开塞露
- C: 乳果糖
- D: 酚酞

答案：C

46. 患者，男，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。

- A: 增加解痉作用
- B: 防止成瘾
- C: 增加镇痛作用
- D: 镇痛和解痉作用

答案：D

47. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A: 伊立替康
- B: 多西他赛
- C: 多柔比星
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

48. (2017 年真题) 导致视神经炎的抗结核药的是 ()

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福喷丁
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

49. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

- A: 异丙托溴铵
- B: 孟鲁司特
- C: 沙丁胺醇

D: 茶碱

答案: B

50. (2018 年真题) 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是 ()

A: 头孢唑林

B: 头孢呋辛

C: 头孢米诺

D: 头孢他啶

答案: D

51. 主要抑制凝血 IIa 和 Xa 因子的抗凝血药是 ()。

A: 水蛭素

B: 阿哌沙班

C: 依诺肝素

D: 磺达肝葵钠

答案: A

52. 头孢噻吩

A: 肾毒性较大

B: 用于非典型病原体感染

C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案: A

53. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用 ()

A: 2%酚甘油滴耳液

B: 3%酚甘油滴耳液

C: 2%过氧化氢溶液

D: 3%过氧化氢溶液

答案：D

54. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物()

A: 阿达帕林

B: 异维 A 酸

C: 壬二酸

D: 维 A 酸

答案：C

55. 糖皮质激素的抗炎作用是

A: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

B: 提高中枢神经系统的兴奋性

C: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

D: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

答案：A

56. 甲亢术前准备的正确给药方法是()

A: 只给碘化物

B: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类

C: 只给硫脲类

D: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物

答案：D

57. (2019 年真题) 竞争性抑制胃肠道的 α -葡萄糖苷酶活性减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收，可降低餐后血糖的药物是()

A: 二甲双胍

- B: 格列吡嗪
- C: 伏格列波糖
- D: 吡格列酮

答案：C

58. 碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯巴比妥
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

答案：A

59. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 妥布霉素
- B: 异烟肼
- C: 新霉素
- D: 庆大霉素

答案：D

60. 容易引起视神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：D

61. 可直接中和胃酸，发挥快速、持久的抗酸作用，且有平衡肠动力作用，不易导致便秘和腹泻不良反应的是

- A: 三硅酸镁
- B: 碳酸钙
- C: 铝碳酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：C

62. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 利卡多因
- B: 普萘洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 奎尼丁

答案：A

63. 关于 PDE5 抑制剂的代谢动力学，错误的是

- A: 伐地那非对 PDE5 的选择性是西地那非和他达拉非的 10 倍
- B: 伐地那非对 PDE1 和 PDE6 的选择性是西地那非的 4 倍
- C: 他达拉非代谢物少部分从粪便，绝大部分经肾排泄
- D: 他达拉非的吸收不受油脂性食物的影响

答案：C

64. 抑制骨髓造血功能的是

- A: 四环素
- B: 庆大霉素
- C: 氯霉素
- D: 红霉素

答案：C

65. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品

- A: 干扰素
- B: 泛昔洛韦
- C: 拉米夫定
- D: 恩替卡韦

答案：B

66. 下列属于窄谱抗菌药物的是

- A: 阿莫西林
- B: 氨曲南
- C: 环丙沙星
- D: 头孢唑啉

答案：B

67. 下列关于过氧化氢的用法及注意事项，叙述错误的是

- A: 遇光稳定，不易变质
- B: 遇氧化物或还原物即迅速分解并产生泡沫
- C: 妊娠及哺乳期妇女慎用
- D: 避免皮肤及黏膜接触高浓度溶液

答案：A

68. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 更昔洛韦
- B: 氯霉素
- C: 四环素可的松
- D: 利巴韦林

答案：C

69. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 阿托品
- B: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药
- C: 胆碱酯酶复活药
- D: 阿托品+新斯的明

答案：B

70. 维生素 B1 缺乏时引起()

- A: 坏血病
- B: 脚气病
- C: 成人佝偻病
- D: 角膜软化症

答案：B

71. 肝素可增强抗凝血酶III活性，灭活下列哪组凝血因子

- A: IIa、VIa、VIIa、VIIIa、IXa
- B: IIa、VIIa、VIIIa、IXa、Xa
- C: IIa、IXa、Xa、XIa、XIIa
- D: IIa、IIIa、IVa、Va、VIIa

答案：C

72. 属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

- A: 左炔诺孕酮
- B: 米非司酮
- C: 甲地孕酮
- D: 黄体酮

答案：B

73. 以下激素的关系错误的是

- A: 糖皮质激素抑制促皮质素的分泌
- B: 促皮质素释放激素促进促皮质素的分泌
- C: 糖皮质激素促进促皮质素释放激素的分泌
- D: 促皮质素促进糖皮质激素的分泌

答案：C

74. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

75. 具有较强的 M 受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

- A: 睾酮
- B: 西地那非
- C: 奥昔布宁
- D: A 型肉毒毒素

答案：C

76. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- B: 慢性收缩性心力衰竭
- C: 室性心动过速、心室颤动
- D: 梗阻性肥厚型心脏病

答案：B

77. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 支气管痉挛
- B: 心律失常
- C: 惊厥
- D: 血压下降

答案：B

78. （2016 年真题）属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 托烷司琼
- C: 维生素 B6
- D: 阿瑞吡坦

答案：D

79. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

- A: 对溃疡面有保护作用
- B: 中和胃酸作用强而迅速
- C: 口服易吸收
- D: 不影响排便

答案：B

80. （2019 年真题）可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物（）

- A: 四环素类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 大环内酯类
- D: 氨基糖苷类

答案：B

81. 临床治疗铜绿假单胞菌感染可选用的抗生素是()

- A: 哌拉西林
- B: 阿莫西林
- C: 苯唑西林
- D: 氨苄西林

答案: A

82. 按作用时间分类, 属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 预混胰岛素
- C: 地特胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案: C

83. 阿司匹林的主要适应证不包括()

- A: 胃溃疡
- B: 急性心肌梗死
- C: 预防血栓形成
- D: 不稳定型心绞痛

答案: A

84. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是()

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 托拉塞米

答案：B

85. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 碳酸锂
- B: 甲巯咪唑
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 普萘洛尔

答案：B

86. 作用于造血祖细胞，促进其增殖和分化，促进成熟细胞向外周血释放的药品是

- A: 人血白蛋白
- B: rhGM-CSF
- C: 维生素 B12
- D: 硫酸亚铁

答案：B

87. （2015 年真题）利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是（）。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 螺内酯

答案：C

88. 患者，女，55 岁诊断为“甲癣”宜使用的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 特比萘芬

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/255231201114012033>