

2022~2023 内科护理(中级)考试题库及答案

1. 急性胃炎大出血病人，应嘱其

- A.进无渣饮食
- B.进流质饮食
- C.进温热半流质
- D.进清淡食物
- E.禁食

正确答案:

E

2. 一患者高血压病5年，近日出现尿蛋白(+)，应诊断为()。

- A.高血压病I期
- B.高血压病II期
- C.高血压病III期
- D.肾小球肾炎

正确答案:

B

3. 对肝硬化病人健康教育不正确的是

- A.限制饮酒、茶、咖啡
- B.避免暴饮暴食
- C.剧烈疼痛时服用止痛剂
- D.告知患者肝硬化的诱因
- E.高热量、高蛋白、高维生素、易消化的食物

正确答案:

C

4. 对肝性脑病昏迷期减少能量消耗，保护脑细胞功能的最佳方法是

- A.使用肾上腺皮质激素
- B.建立人工气道
- C.头部持续冰敷
- D.硫酸镁导泻
- E.静滴甘露醇

正确答案:

C

5. 下列何种物质中毒后会导致口唇樱桃红色

- A.来苏水
- B.硝酸

- C. 盐酸
- D. 硫酸
- E. 一氧化碳

正确答案:

E

6. 一般肺炎球菌性肺炎的抗生素治疗应用至

- A. 发热消退
- B. 退热后 3 天
- C. 退热后 1 周
- D. 肺部炎症完全吸收
- E. 血中白细胞计数正常

正确答案:

B

7. 某患者在 1 小时前误服“浓盐酸”少许，现上腹部疼痛。查体：神清，唇及口腔有灼伤，心肺(-)，上腹部压痛明显，无肌紧张及反跳痛。应采取

- A. 立即催吐
- B. 插胃管洗胃
- C. 硫酸镁导泻
- D. 口服碳酸氢钠溶液
- E. 口服氢氧化铝凝胶

正确答案:

E

8. 胃肠道中主要分泌盐酸的细胞是

- A. 食管
- B. 贲门腺体
- C. 壁细胞
- D. 主细胞
- E. 粘液细胞

正确答案:

C

9. 确定深昏迷最有价值的体征是

- A. 体温上升
- B. 血压下降
- C. 各种反射均消失
- D. 对疼痛无反应
- E. 呼之不应

正确答案:

C

10. 下列哪项是正式组织的特点

- A.自发形成
- B.较强的约束力
- C.讲究效率
- D.方式灵活
- E.沟通方便内容广泛

正确答案:

B

11. WHO建议: 每人每天食盐摄入量不超

- A.3g
- B. 4g
- C.5g
- D.6g
- E.8g

正确答案:

D

12. 患者, 男性, 70岁。有高血压病史20年。突然出现剧烈头痛、呕吐, 继而出现昏迷。可以鉴别患者是脑出血, 还是蛛网膜下腔出血的是

- A.起病诱因
- B.有无颈项强直
- C.有无肢体偏瘫
- D.脑脊液的性状
- E.CT检查

正确答案:

E

13. 患者男, 65岁。因冠心病、心力衰竭收入院。经用地高辛等药物治疗后, 气急、水肿明显改善。近2日出现恶心、呕吐、食欲不振、视力模糊。查体: 神志清, 心率52次/分, 心律不齐, 有时呈二联律。心电图示: 频发室性期前收缩, 二联律。该病人目前主要的临床诊断是

- A.心源性休克
- B.左心衰竭
- C.洋地黄中毒
- D.急性胃炎
- E.右心衰竭

正确答案:

C

14. 原发性肝癌终末期最常见的并发症是

- A. 癌结节破裂出血
- B. 上消化道出血
- C. 肝肾综合征
- D. 肝性脑病
- E. 继发感染

正确答案:

D

15. 硝酸甘油的用药护理中不正确的是

- A. 发作时给予 5~10mg 舌下含服
- B. 服药后 5~10min 不缓解, 可再服 1 次
- C. 可出现面部潮红、头胀痛
- D. 含服硝酸甘油效果差时, 可改为静滴
- E. 青光眼忌用

正确答案:

B

16. 患者男性, 30 岁。诉心悸及颈部明显搏动感。查血压 142/45mmHg, X 线示左心室扩大、主动脉弓突出并有明显搏动。最可能的诊断为

- A. 高血压性心脏病
- B. 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄
- C. 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全
- D. 心肌炎
- E. 冠状动脉粥样硬化性心脏病

正确答案:

C

17. 某医院 200 张床位, 同期住院病人中有 6 人发生医院感染, 医院感染发生率是

- A. 3%
- B. 4%
- C. 5%
- D. 8%
- E. 9%

正确答案:

A

18. 有机磷农药中毒引起的毒蕈碱样症状是

- A.呼吸肌麻痹
- B.肌束颤动
- C.血压升高
- D.轻度意识障碍
- E.瞳孔缩小

正确答案:

E

19. 有关肾盂肾炎健康教育内容, 错误的是

- A.避免劳累及便秘
- B.平时多饮水, 勤排尿
- C.药物治疗须按医嘱完成疗程
- D.急性期愈后 1 年内避免妊娠
- E.慢性期坚持药物预防

正确答案:

E

20. 病人女性, 32 岁。活动后突然头痛剧烈, 伴恶心呕吐。查体: 右侧肢体瘫痪, 左侧瞳孔 4mm, 右侧瞳孔 3mm, 对光反应迟钝。处理措施中不正确的是

- A.保持呼吸道通畅
- B.减少不必要的搬动
- C.头部 CT 检查
- D.20%甘露醇静脉滴注
- E.腰椎穿刺

正确答案:

E

21. 患者男, 67 岁。反复咳嗽、咳痰 20 余年, 伴进行性呼吸困难 5 年, 因上呼吸道感染症状加重并出现躁动 2 天收入院。查体: 神志恍惚, 躁动不安, 口唇发绀, 桶状胸, 双肺可闻及干湿性啰音。 血气分析示 PaO₂49mmHg, PaCO₂76mmHg。诊断 II 型呼吸衰竭的血气分析标准为

- A.PaO₂≤5.3kPa
- B.PaO₂≤6.7kPa
- C.PaO₂≤8.0kPa
- D.PaO₂≤8.0kPa
- E.PaO₂≤8.0kPa

正确答案:

B

22. 引起内源性感染的病原体来自

- A.医院环境中存在的致病菌

- B.病人体内或体表的正常菌群或条件致病菌
- C.医院工作人员携带的病菌
- D.由探视人员带到院内的病菌
- E.感染部位分离出的致病菌

正确答案:

B

23. 对急性肺水肿患者，正确的给氧方式是

- A.持续低流量给氧
- B.低流量间断给氧
- C.高流量持续给氧
- D.高流量持续酒精湿化给氧
- E.低流量持续酒精湿化给氧

正确答案:

D

24. 患者女，45岁。患乙肝后肝硬化5年，近1月来出现乏力，纳差，腹胀入院。体检：肝脾未扪及，腹部移动性浊音(+)，巩膜黄染。病人如需给予放腹水治疗，应避免大量放腹水而继发

- A.晕厥
- B.上消化道出血
- C.休克
- D.呼衰
- E.肝昏迷

正确答案:

A

25. 为减轻肾小球的高灌注、高压、高滤过状态，其饮食疗法应选择

- A.普通蛋白饮食
- B.低蛋白低磷饮食
- C.低蛋白饮食
- D.无蛋白低钠饮食
- E.高蛋白低磷饮食

正确答案:

B

26. 健康教育的措施必须因人而异、因势利导。体现了健康教育的

- A.随意性
- B.独立性
- C.目的性
- D.可塑性

E. 差异性
正确答案：
E

27. 多尿可见于()。

A. 糖尿病
B. 甲状腺功能亢进
C. 急性肾功能衰竭早期
D. 柯兴氏综合症
E. 慢性肾脏病进入肾功能减退期
正确答案：
AE

28. 有机磷农药急性中毒，一般经皮肤吸收，症状常在接触多少时间出现

A. 10~30 分钟内
B. 2~6 小时内
C. 6 小时后
D. 12 小时后
E. 24 小时后
正确答案：
B

29. 下列情况中，属清洁手术，但仍需预防性使用抗生素的是

A. 人工心脏瓣膜置换手术
B. 甲状腺手术
C. 疝修补术
D. 输卵管结扎术
E. 膝软骨摘除术
正确答案：
A

30. 抗心律失常药物静注时宜慢，除外

A. 胺碘酮
B. 利多卡因
C. 腺苷
D. 维拉帕米
E. 普鲁卡因胺
正确答案：
C

31. 病人男性，65岁，医院诊断为肾病综合征，护士对病人给予饮食指导不妥的是

- A. 蛋白质摄入量为正常入量，每日每千克体重 1.0g
- B. 尽量摄入动物蛋白
- C. 热量摄入为每日每千克体重不少于 126~147kJ
- D. 高脂饮食
- E. 水肿时盐摄入

正确答案：

D

32. 医院感染中最常见的病原体是

- A. 病毒
- B. 衣原体
- C. 细菌
- D. 真菌
- E. 肺孢子虫

正确答案：

C

33. 急性呼吸窘迫综合征，除及时去除病因外，下列哪一项属于非药物治疗

- A. 正压通气
- B. 控制感染
- C. 消除肺水肿
- D. 肾上腺糖皮质激素
- E. 以上均不是

正确答案：

A

34. 科学管理理论的核心是

- A. 提高劳动生产率
- B. 实行科学化管理
- C. 调动人的积极性
- D. 公平的分配制度
- E. 健全的管理系统

正确答案：

A

35. 下列哪项属于抗生素的不合理使用

- A. 疑似细菌感染，决定在使用抗生素前，应留取标本进行病原学检查
- B. 清洁无菌手术术前可不使用预防性抗生素
- C. 原则上一般使用生理盐水作为抗生素静脉点滴的溶液

- D.万古霉素不作预防性抗生素使用
E.为节省时间，一般可把两种抗生素置于同一溶液中输注
正确答案：

E

36. 室性阵发性心动过速的特点是

- A.多不影响功能
B.按压颈动脉窦能终止发作
C.多无器质性心脏病
D.心电图无室性融合波
E.心尖区第一心音强弱不等

正确答案：

E

37. 患者男性，66岁。8年前曾患急性肝炎。近半年来常感乏力、食欲减退，右上腹不适。近2周因劳累症状更明显，有腹胀、失眠。3天前无明显诱因出现腹泻、水样便，每天7~8次。昨晚呕出咖啡样液体约800ml，急诊入院。体检：体温38.3℃，血压90/50mmHg，神志清，巩膜黄染，腹部膨隆，移动性浊音阳性。肝肋下未及，脾肋下3.5cm。若患者突然出现烦躁不安，言语不清，两上肢扑翼样震颤，提示可能发生

- A.抑郁症
B.脑膜炎
C.肝性脑病
D.肺性脑病
E.肝肾综合征

正确答案：

C

38. 病人女性，32岁，日晒后面部红斑、瘙痒2月，发热1周，四肢关节对称性、游走性疼痛，考虑系统性红斑狼疮。治疗面部皮疹的药物是

- A.阿司匹林
B.泼尼松
C.氯喹
D.环磷酰胺
E.静注丙种球蛋白

正确答案：

C

39. 腹膜透析的护理不妥的是

- A.严格无菌操作
B.应用 或 形管，可使腹膜透析感染率明显下降

定时测生命体征， 1~3 次/天

D.透析液在注入腹腔前可在水浴中加温至 37℃

E.准确填写透析记录，出入量 24 小时总结一次

正确答案：

D

40. 患者男，16 岁，不规则发热半月，伴骨痛及牙龈出血。体格检查：胸骨压痛 (+)，脾肋下 2cm，血红蛋白 70g/L，白细胞 $16.6 \times 10^9/L$ ，原始细胞 0.60，血红蛋白 80g/L，血小板 $34 \times 10^9/L$ 。本病发热合并感染，最常见的病原菌是

A.革兰阳性球菌

B.革兰阴性球菌

C.革兰阳性杆菌

D.革兰阴性杆菌

E.真菌

正确答案：

D

41. () 中毒时发病最快。

A.乐果

B.敌敌畏

C.敌百虫

D.对硫磷(1605)

正确答案：

B

42. 某公司员工体检时测量血压为 130/85mmHg 为进一步确诊是否有高血压，应做的检查是

A.同一日上下午测定血压，每次测定 2 个测量值

B.同一日上下午测定血压，每次测定 3 个测量值

C.非同一日测定血压 2 次，每次测定 2 个测量值

D.非同一日测定血压 2 次，每次测定 3 个测量值

E.非同一日测定血压 3 次，每次测定 3 个测量值

正确答案：

D

43. 一位胸痛病人描述了他的疼痛性质，您认为可以排除心绞痛的是

A.压迫性

B.烧灼感

C.闷痛

D.紧缩感

E.针刺样

E

44. 二度 II 型房室传导阻滞伴阿-斯综合症病人首选的治疗方法是

- A. 安装永久性心脏起搏器
- B. 静脉滴注异丙肾上腺素
- C. 静脉注射阿托品
- D. 同步电复律
- E. 非同步电复律

正确答案:

A

45. 患者女, 30岁。无明显诱因出现双眼睑下垂、视物成双3个月。眼睑下垂下午比早晨明显。查体: 双上睑下垂, 双侧不对称, 左眼球外展受限, 瞳孔大小无改变, 光反射正常, 四肢肌力正常。目前首要的护理问题是

- A. 营养失调
- B. 生活自理缺陷
- C. 清理呼吸道无效
- D. 语言沟通障碍
- E. 潜在并发症

正确答案:

B

46. 风湿热的主要临床表现是

- A. 低热或不规则中度热
- B. 乏力、纳差
- C. 心肌炎、关节炎、皮肤损害、舞蹈症
- D. 红细胞沉降率增快
- E. 关节痛

正确答案:

C

47. 呼气性呼吸困难的发生机制是

- A. 上呼吸道异物刺激
- B. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄
- C. 广泛性肺部病变使有效呼吸面积减少
- D. 大气道阻塞
- E. 肺纹理增粗

正确答案:

B

强调护理管理者要建立良好的人际关系的是

- A. 卢因
- B. 泰勒
- C. 法约尔
- D. 麦格雷戈
- E. 梅奥

正确答案：

E

49. 急性心肌梗死合并休克，描述正确的是

- A. 休克仅在起病后数小时内
- B. 右心室心肌梗死者易发生休克
- C. 收缩压低于 80mmHg，可诊断
- D. 收缩压低于 80mmHg且表现为面色苍白、皮肤湿冷、脉细而快、大汗淋漓、尿量减少
- E. 多为心律失常导致

正确答案：

D

50. 急性心衰治疗用药的注意事项中正确的是

- A. 用吗啡时应注意有无心动过速
- B. 硝普钠应提前配制
- C. 硝普钠输注时应避光滴注
- D. 洋地黄静脉使用不需稀释
- E. 洋地黄静脉推注速度要快

正确答案：

C

51. 在呼吸道感染流行时为防止交叉感染，接触病毒感染者应

- A. 卧床休息
- B. 定时开窗通风
- C. 呼吸道隔离
- D. 室内食醋熏蒸
- E. 中医中药治疗

正确答案：

C

52. 病人男性，77岁。高血压病史33年，2周前因脑梗死住院。经治疗后病情稳定，出院前对该病人的健康指导正确的是

- A. 多休息，减少活动
- B. 低盐、低脂、低蛋白饮食

晨起时要静坐 10 分钟后再缓慢站起
D.早期禁止锻炼
E.短时间将血压降至正常水平

正确答案:

C

53. 中暑高热病人行物理降温, 当肛温降到何值时, 应暂停降温?

A.32℃

B.35℃

C.36℃

D.37℃

E.38℃

正确答案:

E

54. 不属于皮质醇增多症所致肾上腺雄酮分泌增多症状的是

A.向心性肥胖

B.女性男性化

C.痤疮多毛

D.月经紊乱

E.不育

正确答案:

A

55. 急性心肌梗死病人最需要紧急处理心律失常是

A.窦性心动过缓

B.二度 I 型房室传导阻滞

C.频发房性过早搏动

D.心房颤动

E.多源性频发室性早搏

正确答案:

E

56. 患者男性, 31 岁。劳累后气促半年, 阵发性夜间呼吸困难 1 个月入院。查体脉压增大, 心尖搏动弥散, 心界向左下移位, 周围血管征阳性。应诊断为

A.高血压性心脏病

B.风湿性心脏病主动脉瓣狭窄

C.风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全

D.冠状动脉粥样硬化性心脏病

E.风湿性心脏病二尖瓣关闭不全

正确答案:

57. 萎缩性胃炎可表现为

- A. 节律性上腹灼痛
- B. 转移性疼痛
- C. 上腹饱胀
- D. 上腹剑突下可扪及结节性肿块
- E. 消瘦

正确答案:

C

58. 正常成人安静时 VA/Q 约为

- A. 0.2
- B. 0.4
- C. 0.8
- D. 1.25
- E. 1.5

正确答案:

C

59. 健康教育的最终目的是

- A. 传播健康信息
- B. 干预不健康的行为
- C. 帮助个体树立健康观念
- D. 帮助群体采纳健康生活方式
- E. 提高生活质量

正确答案:

E

60. 被公认为“管理过程之父”的是

- A. 卢因
- B. 泰勒
- C. 法约尔
- D. 麦格雷戈
- E. 梅奥

正确答案:

C

61. 患者男，63岁。因肝硬化食管胃底静脉曲张破裂大出血急诊入院，医嘱给予三腔(四腔)气囊管压迫止血在对该病人的病情观察中，我们要警惕病人大出血后发生

- 感染
B. 肝肾综合症
C. 肝性脑病
D. 癌变
E. 再次出血

正确答案:

C

62. 室上性急性发作期的治疗首选药物是

- A. 维拉帕米
B. 地尔硫卓
C. 毛花甙丙
D. 普罗帕酮
E. 腺苷

正确答案:

E

63. 对于烟碱样症状的描述正确的是

- A. 呕吐、腹痛、腹泻
B. 流涎
C. 支气管痉挛及分泌物增加
D. 肌纤维颤动
E. 昏迷

正确答案:

D

64. 一个组织沟通通道发生障碍的原因与下列哪项无关

- A. 口头传达效果不佳
B. 几种媒介互相冲突造成矛盾
C. 信息传递程序或路径模糊
D. 沟通对象选择错误
E. 组织结构不合理

正确答案:

D

65. ABC 时间管理法中, 最重要且必须完成的目标属于

- A. A 级
B. B 级
C. C 级
D. D 级
E. E 级

正确答案：

A

66. 一位急性心肌梗死患者心电监护时发现一提前出现的宽大畸形 QRS波群，T波与 QRS波主波方向相反，你认为此提前出现的 QRS波群最可能是

- A. 窦性心律不齐
- B. 房性期前收缩
- C. 交界区期前收缩
- D. 室性期前收缩
- E. 正常现象

正确答案：

D

67. 患者，男性，35岁。因“重症肌无力”收治入院。治疗期间，因出现肺部感染给予相应抗感染治疗，2天后突然发生重症肌无力危象。此时首要的处理措施是

- A. 应用抗胆碱酯酶药物
- B. 停用抗感染药物
- C. 改善呼吸功能，保持呼吸道通畅
- D. 鉴别危象类型，给予相应治疗
- E. 继续积极治疗肺部感染

正确答案：

C

68. 不属于短暂性脑缺血发作临床特征的是

- A. 一般持续 10~15 分钟
- B. 突然发病
- C. 最长不超过 24 小时
- D. 多有反复发作的历史
- E. 遗留神经功能缺损体征

正确答案：

E

69. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者，休息时感心悸、气促、双肺闻及湿啰音。应判断为

- A. 心功能 0 级
- B. 心功能 I 级
- C. 心功能 II 级
- D. 心功能 III 级
- E. 心功能 IV 级

正确答案：

E

70. 消化性溃疡常见的并发症有()。

- A.大量出血
- B.急性穿孔
- C.幽门梗阻
- D.癌变
- E.感染

正确答案:

ABCD

71. 关于抗生素的配伍禁忌和合理给药, 下列描述不正确的是

- A. β -内酰胺类抗生素静脉滴注时, 可采用连续给药方案
- B. 大环内酯类抗生素可采用连续给药方案, 避免毒性反应
- C. 氨基苷类抗生素采用间歇式给药方案, 不宜静脉推注
- D. 静脉点滴抗生素的溶液, 原则选用生理盐水, 除必要时才选用 5%葡萄糖盐水或 5%葡萄糖溶液
- E. 原则上两种抗生素不宜于同一溶液中静注或静滴

正确答案:

A

72. “爱探究、易激惹、喜欢自我表现”属于下列哪一行为发展阶段的主要表现

- A.被动发展阶段
- B.主动发展阶段
- C.自主发展阶段
- D.巩固发展阶段
- E.调控发展阶段

正确答案:

B

73. 病人男性, 19岁, 高热2周抗炎治疗效果不佳。体检血压 105/70mmHg, 查体示胸骨压痛明显, 皮肤多出片状瘀斑, 肝脾未触及。白细胞 $3.5 \times 10^9/L$, 血红蛋白 63g/L, 血小板 $11 \times 10^9/L$ 。骨髓检查有核细胞增生极度活跃, 胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占 80%。诊断为急性早幼粒细胞白血病。病人目前主要的医护合作性问题是

- A.预防或减少出血
- B.继发感染
- C.缺氧
- D.肾功能不全
- E.右心衰竭

正确答案:

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255240013340011322>