

2024 江西省湘东区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题通关秘籍题库【必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 抑制 5- α 还原酶而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 前列康
- B: 特拉唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 黄酮哌酯

答案：C

2. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 雷尼替丁
- C: 昂丹司琼
- D: 维生素 B6

答案：C

3. 设有对照组但未用随机方法分组的研究属于

- A: 四级证据
- B: 二级证据
- C: 一级证据
- D: 三级证据

答案：D

4. 长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

- A: 谷维素
- B: 罗通定
- C: 地西泮
- D: 阿司匹林

答案：C

5. 哌甲酯可引起

- A: 癫痫发作
- B: 锥体外系反应
- C: 听神经障碍
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

6. 关于药物作用相加或增加疗效的举例，磺胺甲噁唑(SMZ)抑制二氢叶酸合成酶，甲氧苄啶(TMP)抑制二氢叶酸还原酶，二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，抗菌作用增强，是属于

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 促进机体的吸收利用
- C: 作用于不同的靶位
- D: 保护药品免受破坏

答案：C

7. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1°C)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查， $T38.8^{\circ}\text{C}$ ，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查： $\text{WBC}18.5\times10^9/\text{L}$ (参考值 $4.0\times10^9\sim10.0\times10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白
- B: 洛哌丁胺
- C: 药用炭
- D: 小檗碱

答案：B

8. 热应激时液体丢失所致的以有效循环血容量不足为特征的临床综合征是

- A: 热痉挛
- B: 热衰竭
- C: 休克
- D: 热射病

答案：B

9. 合剂的规范书写是

- A: Mist
- B: Dos
- C: Liq
- D: Dil

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

10.（2019 年真题）患者，男，9 岁，入院诊断为急性淋巴细胞白血病，临床计划鞘内注射药物预防中枢白血病，宜选用的药物是

A: 维生素 B

B: 亚叶酸

C: 长春新碱

D: 甲氨蝶呤

答案: D

11. 用于香豆素类杀鼠药中毒的解毒剂是

A: 乙酰胺

B: 青霉素

C: 维生素 K1

D: 硫酸阿托品

答案: C

12. 常用缓泻药的作用机制不包括

A: 刺激性

B: 膨胀性

C: 容积性

D: 润湿性

答案: D

13. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

A: po

B: Ac

C: pc

D: qn

答案: C

14. (治疗骨质疏松药的应用注意事项)，妊娠期使用过量可导致胎儿畸形、甲状旁腺功能抑制而使新生儿长期低血钙抽搐，应慎用的是

A: 钙制剂

B: 维生素

C: 甲状旁腺激素

D: 氟制剂

答案：B

15. 伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

A: 含伪麻黄碱的抗感冒药

B: 含右美沙芬的抗感冒药

C: 含氯苯那敏的抗感冒药

D: 含咖啡因的抗感冒药

答案：A

16. 晚发型或伴有智能减退的患者，帕金森病治疗首选药物为（）

A: 金刚烷胺

B: 司来吉兰

C: 苯海索

D: 左旋多巴

答案：D

17. （2018 年真题）患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A: 氨苄西林

B: 头孢吡肟

C: 莫西沙星

D: 阿莫西林

答案：C

18. 阿糖腺苷属于

- A: 抗过敏药
- B: 抗病毒药
- C: 抗真菌药
- D: 抗肿瘤药

答案：B

19. 适用于早期、轻度症状者的是

- A: 司来吉兰
- B: 左旋多巴
- C: 恩托卡朋
- D: 苯海索

答案：A

20. 由用药顺序确定最可疑致病药物一有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物一根据停药后症状的变化、确诊，即可

- A: 排除药物以外的因素；必要的实验室检查
- B: 追溯用药史；询问用药过敏史和家族史
- C: 确定致病药物
- D: 流行病学的调查

答案：C

21. 成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 3.1~5.7mmol / L
- B: 1.03~2.07mmol / L
- C: 0.56~1.70mmol / L
- D: 2.1~3.1mmol / L

答案：D

22.（2018 年真题）用于胆石症的非手术治疗，属于钙通道阻滞剂，不可掰开嚼碎，避免卧位服用的药物是（）

- A: 山莨菪碱片
- B: 匹维溴铵片
- C: 鹅去氧胆酸片
- D: 熊去氧胆酸片

答案：B

23. 患者，男，50 岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者的用药指导，错误的是

- A: 氟西汀应于睡前服用
- B: 不得随意自行调整氟西汀剂量
- C: 服用氟西汀期间不能饮酒
- D: 不能突然停止服用氟西汀

答案：A

24. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

- A: 急性肾盂肾炎
- B: 急性膀胱炎
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 慢性肾盂肾炎

答案：A

25. 可待因属于

- A: 利尿剂

B: 麻醉药品

C: β 受体阻断剂

D: 精神刺激剂

答案：B

26. 治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

A: 半衰期 8~24 小时

B: 半衰期大于 24 小时

C: 半衰期小于 30 分钟

D: 半衰期大于 30 小时

答案：C

27. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

A: IIa 期临床试验

B: III期临床试验

C: IV期临床试验

D: I 期临床试验

答案：C

28. 维生素 B2 的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是

A: 餐前

B: 餐后

C: 清晨

D: 餐中

答案：B

29. 公众用药咨询的内容是

- A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：B

30. 混合型高脂血症，首选用的药物是

- A: ω -3 脂肪酸
- B: 烟酸
- C: 他汀类
- D: 贝特类

答案：C

31. 下列药物信息源中，归属于一级文献资料的是

- A: 中国药学年鉴
- B: 中国药学杂志
- C: 中国药学文摘
- D: 新编药理学

答案：B

32. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

- A: $30 \sim 100 \mu\text{g/d}$
- B: $50 \sim 100 \mu\text{g/d}$
- C: $30 \sim 120 \mu\text{g/d}$
- D: $50 \sim 120 \mu\text{g/d}$

答案：D

33. 缺铁性贫血、肾性贫血可呈现

- A: 淋巴细胞增多
- B: 血小板减少
- C: 红细胞计数减少
- D: 白细胞增多

答案：C

34. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0.5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

- A: 1 片 tid
- B: 4 片 qd
- C: 6 片 qd
- D: 2 片 tid

答案：A

35. 口服普萘洛尔用于解救的是 ()

- A: 氯丙嗪中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 硝西泮中毒

答案：C

36. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

- A: 利巴韦林
- B: 依非韦伦
- C: 利托那韦
- D: 齐多夫定

答案：B

37. 荨麻疹患者常出现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 血小板增多

答案：B

38. 以下毒物中毒，清醒者适宜口服吐根糖浆催吐的是

- A: 磷化锌
- B: 苯巴比妥
- C: 氯硝西泮
- D: 阿米替林

答案：D

39. 甲巯咪唑的初治剂量是一日

- A: 30～60mg
- B: 5～15mg
- C: 25～80mg
- D: 15～60mg

答案：A

40. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列想患者交代的用药注意事项，错误的是：

- A: 宜空腹服用
- B: 不宜与铝剂同时服用
- C: 宜同时补充维生素 C
- D: 不宜同时进食牛奶和蛋类

答案：A

41. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 每 3-5 天调整 1 次

B: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

D: 每次调整 1-4 单位

答案：C

42. 有机磷农药中毒者体内血胆碱酯酶活力下降，中度中毒者可降至

A: 20%以下

B: 30%~50%

C: 30%以下

D: 50%~70%

答案：B

43. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时候，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是：

A: 可能

B: 可能无关

C: 很可能

D: 肯定

答案：C

44. 能提高运动员的呼吸功能，增加供氧能力，并能振奋精神的兴奋剂

- A: 蛋白同化激素
- B: 精神刺激剂
- C: 利尿剂
- D: β -受体阻断剂

答案：D

45. 对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

- A: 临床预试验
- B: I 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：B

46. 能保护药品免受破坏的联合是

- A: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- B: 维生素 C 与铁剂同服
- C: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- D: 磷霉素联用其他抗菌药物

答案：A

47. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径,半衰期 12h 的药物通常选择()

- A: 每日给药 1 次
- B: 静脉滴注给药
- C: 每个半衰期给药 1 次
- D: 2~3 个半衰期给药 1 次

答案：C

48. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂？
- B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁？
- C: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮？
- D: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂？

答案：A

49. 减轻不良反应（白天毒性弱）的是

- A: 氨基糖苷类
- B: 利尿药
- C: 抗忧郁药
- D: 阿苯达唑

答案：A

50. 过敏性鼻炎首选的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 阿托品
- C: 麻黄碱
- D: 氯雷他定

答案：D

51. 贫血的临床表现与下列哪项有关

- A: 铁元素缺乏
- B: 血红蛋白下降的速度
- C: 红细胞减少
- D: 缺乏叶酸

答案：B

52. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案: C

53. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 A 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 沙利度胺
- C: 阿莫西林
- D: 万古霉素

答案: A

54. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 90~120g / L
- B: 60~90g / L
- C: 30~60g / L
- D: 120~160g / L

答案: A

55. 美金刚的作用机制为

- A: 抑制胆碱酯酶
- B: 脑循环改善剂
- C: 钙离子拮抗剂
- D: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体

答案：B

56.（2019 年真题）患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A：在病原学送检后，可立即实施经验性抗菌治疗
- B：当体温正常 48～72h，且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物
- C：抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收
- D：病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

答案：C

57. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A：阿司匹林
- B：菠萝蛋白酶
- C：颠茄浸膏片
- D：伪麻黄碱

答案：D

58. 长期服用避孕药

- A：可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B：可使驾驶员出现定向力障碍
- C：可导致驾驶员多尿或多汗
- D：可使驾驶员出现眩晕和幻觉

答案：B

59. 在导致药源性胃肠道疾病的药品中，引起局部缺血性结肠炎、重者可致死亡等风险的药品是

- A: 阿洛司琼
- B: 利血平
- C: 呋塞米
- D: 阿米替林

答案：A

60. 葡萄柚汁+非洛地平

- A: 产生有利的药物相互作用
- B: 抑制乙醛脱氢酶
- C: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- D: 抑制氧化代谢反应

答案：D

61. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times 10^9/L$ 。

- A: 利福霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 链霉素
- D: 红霉素

答案：B

62. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 培高利特
- B: 钆贝葡胺

C: 替加色罗

D: 塞来昔布

答案: B

63. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者的药品是

A: 氨茶碱

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 异丙托溴铵

答案: C

64. 患者因阴道瘙痒和阴道分泌物增多 3 天，自行到药店咨询和购买治疗药物。药师询问患者病史，了解患者阴道分泌物多且呈豆腐渣样，既往未出现过类似分泌物，无其他不适。经验治疗方案首选

A: 克霉唑制剂，1 粒（500mg），单次用药

B: 甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日

C: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日

D: 2% 克林霉素软膏 5g，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日

答案: A

65. （2019 年真题）正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

A: A 级

B: C 级

C: X 级

D: B 级

答案: A

66. 易引起心动过缓的药物

- A: 环磷酰胺
- B: 氟尿嘧啶
- C: 阿霉素
- D: 紫杉醇

答案：D

67. 用于对组织无刺激性药物

- A: 肌肉注射
- B: 腔内注射
- C: 动脉注药
- D: 静脉注射

答案：A

68. 患者，女，45 岁，1 年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgqd，甲硝唑片 0.4gtid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 220mg tid。该患者在治疗期间饮酒，可能会导致

- A: 舌苔
- B: 双硫仑样反应
- C: 维生素 B12 缺乏
- D: 维生素 B2 缺乏

答案：B

69. 中国药学会医院药学专业委员会推荐的国内药历格式不包括

- A: 正文
- B: 病历摘要

C: 用药记录

D: 基本情况

答案: A

70. (2018 年真题) 举重运动员使用后, 可短时间内急速降低体重, 因此需按兴奋剂管理的药物是 ()

A: 呋塞米

B: 普萘洛尔

C: 硝苯地平

D: 缬沙坦

答案: A

71. 首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 异丙嗪片

B: 西替利嗪片

C: 氯苯那敏胶囊

D: 醋酸氟轻松软膏

答案: B

72. (2019 年真题) 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

A: 含漱剂

B: 滴眼剂

C: 直肠栓剂

D: 软膏剂

答案: C

73. (2016 年真题) 患者, 男, 58 岁, 患有高胆固醇血症, 长期服用辛伐他汀 40mgqd, 患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

A: BUN

B: RBC

C: Hb

D: ALT

答案：D

74. 评价三级信息的标准是

A: 作者是否为该领域的专家

B: 研究方法是否科学合理

C: 研究目的是否明确

D: 索引的完备程度，收载杂志的数量

答案：A

75. (2017 年真题) 高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于 ()

A: 痛风患者

B: 双侧肾动脉狭窄患者

C: 心力衰竭患者

D: 胃溃疡患者

答案：A

76. 无水乙醇 5ml 加入 10%葡萄糖注射液 100ml 中静滴，用于解救

A: 氟乙酰胺中毒

B: 氰化氢中毒

C: 瘦肉精中毒

D: 有机磷杀虫药中毒

答案：A

77. 原料血浆包装、贮存、运输的温度应控制在

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: -15°C 以下
- B: -4°C 以下
- C: -20°C 以下
- D: -10°C 以下。

答案：C

78. 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC 药物的是

- A: 《中国国家处方集》
- B: 《美国药典药物信息》
- C: 《药物事实与比较》
- D: 《马丁代尔药物大典》

答案：C

79. 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加，减少尿酸沉积

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 阿司匹林
- D: 秋水仙碱

答案：A

80. 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 双磷酸盐
- C: 辛伐他汀
- D: 硫酸亚铁

答案：C

81. 麻醉药品处方印刷用纸为

- A: 淡红色
- B: 淡绿色
- C: 淡黄色
- D: 白色

答案：A

82. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

- A: 肝脏疾病
- B: 血液疾病
- C: 肾脏疾病
- D: 心脏疾病

答案：C

83. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 异烟肼
- B: 庆大霉素
- C: 新霉素
- D: 妥布霉素

答案：A

84. （2019 年真题）下列药物中，使用前无需皮试的是

- A: 苄星青霉素注射剂
- B: 紫杉醇注射剂
- C: 抑肽酶注射剂
- D: 抗狂犬病血清注射剂

答案：B

85. 通过抑菌圈直径判断细菌对不同药物的敏感性，而不以最小抑菌浓度（MIC）判断药物抗菌作用的药敏试验方法是

- A: 肉汤稀释法
- B: E-test 法
- C: 琼脂稀释法
- D: 纸片扩散法

答案：D

86. 具有多种作用，可用于角膜软化、夜盲症的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 D
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 A

答案：D

87. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- B: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- C: 雌二醇-屈螺酮片
- D: 17 β -雌二醇

答案：A

88. 治疗寻常痤疮给予锌

- A: 日服 180mg
- B: 日服 30~40mg

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 日服 80mg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/255324340114012033>