

现场生命急救知识与技能答案



课程简介：本课程选取日常生活中突发率高、伤害严重且现场急救处理至关重要的常见意外，分专题进展系统通识的讲解。除引用大量真实案例，还有针对性地设置了各种模拟情景，由师生配合进展相关技能操作演示，具有很强的示范性与实用性，满足公众对掌握必要自救互救知识的迫切要求。

现场急救的概念及意义

1【多项选择题】急救医疗效劳体系由哪几局部构成？（ ）

- A、院前急救
- B、院内急诊
- C、急危重症监护
- D、康复治疗

我的答案：ABC

2【判断题】要尽量防止在现场对伤者进展急救,而应及时去医院救治。

我的答案：×

3【判断题】现场急救的实施人员可以是第一目击者，可以是医护人员，也可以是受害者本人。

我的答案：√

现场急救的原那么与步骤

1【单项选择题】哪种颜色标志的伤者应该第一优先救治？（ ）

A、黑色

B、黄色

C、红色

D、绿色

我的答案：C

2【单项选择题】现场急救的首要原那么是什么？（ ）

A、现场平安

B、评估伤情

C、就地抢救

D、及时转运

我的答案：A

3【多项选择题】现场急救的目的有哪些？（ ）

A、维持生命

B、防止病情恶化

C、促进康复

D、降低伤残率

我的答案：ABCD

4【判断题】现场救护人员应根据检伤分类标记，按照“先救命、后救伤”的优先顺序，采取相应的现场急救措施。

我的答案：√

各种急救体位摆放

1【单项选择题】需要给予心肺复苏的伤者应该采取哪种体位？（ ）

A、去枕仰卧位

B、头高仰卧位

C、中凹卧位

D、半卧位

我的答案：A

2【单项选择题】对于有正常脉搏和呼吸、意识丧失、无脊柱损伤的伤员应采取哪种体位？（ ）

A、头高仰卧位

B、头低侧卧位

C、中凹卧位

D、去枕仰卧位

我的答案：B

3【判断题】意识清醒，腹部外伤的患者，应采取半卧位。

我的答案：√

心肺复苏术概述

1【单项选择题】院外现场救护，成人生存链中的第一个环节是（ ）

A、早期心肺复苏

B、早期识别和呼救

C、早期心脏电除颤

D、早期高级生命支持

我的答案：B

2【单项选择题】当在路旁发现有人躺在地上时，首先应（ ）

A、拨打 120 急救

B、马上施行胸外按压

C、评估其意识状况

D、开放气道，人工呼吸

我的答案：C

3【判断题】事故现场平安，对于呼吸心跳骤停的患者，应领先给予心肺复苏术，然后再搬运。

我的答案：√

徒手心肺复苏术具体步骤

1【单项选择题】对成人进展胸外按压时，按压的正确位置是（ ）

A、胸骨下半段

B、胸骨左侧

C、胸骨上半段

D、心尖区

我的答案：A

2【单项选择题】哪种患者需要高质量 CPR？（ ）

A、无反响、脉搏有力、呼吸充分的患者

B、无反响、无正常呼吸、无脉搏的患者

C、有反响、有脉搏、呼吸困难的患者

D、有反响、脉搏有力、呼吸充分的患者

我的答案：B

3【判断题】胸外按压时，频率要尽量快，不必等到胸壁放松到原来的状态，即可进展下一次按压。

我的答案：×

成人、儿童、婴儿徒手心肺复苏流程

1【单项选择题】胸外按压中断的时间应在多少秒之内？（ ）

A、10秒

B、15秒

C、25秒

D、30秒

我的答案：A

2【多项选择题】高质量的CPR包括哪些内容？（ ）

A、确保伤者恢复意识

B、防止过度通气

C、以足够的速率和深度进展胸外按压

D、尽量减少按压中断

E、确保每次按压后胸部完全回弹

我的答案：BCDE

3【判断题】单个施救者给予成人、儿童或婴儿心肺复苏，按压-通气比例均为30:2

我的答案：√

AED 的使用意义

1【单项选择题】西方兴旺国家在人群集中处一般配置何种普通人应用的急救设备？（ ）

- A、简易呼吸器
- B、心脏起搏器
- C、听诊器
- D、自动体外除颤器（AED）

我的答案：D

2【单项选择题】心脏骤停患者，除颤为何重要？（ ）

- A、它阻止心脏骤停复发
- B、它对心脏骤停并不重要
- C、重新获得正常心律的成功率为 100%
- D、它能恢复正常心律

我的答案：D

3【判断题】CPR 与 AED 的早期有效配合，可以显著提高心跳呼吸骤停病人的生存率。

我的答案：√

AED 的操作步骤

1【单项选择题】一旦拿到 AED，以下哪项是使用 AED 的第一步（ ）

- A、使用 AED 之前给予两次人工呼吸
- B、翻开 AED 的电源开关
- C、将电极片插头插入 AED 主机插孔
- D、将 AED 电极片安放在患者胸部

我的答案： B

2【单项选择题】 AED 在分析心律的时候，施救人员应该采取什么措施？（ ）

A、不要触碰患者

B、人工呼吸

C、检查脉搏

D、胸外按压

我的答案： A

3【判断题】 AED 的两个电极片应很好的分隔开，而不能在胸壁上相互接触。

我的答案： √

高级生命支持模拟训练工程展示

1【单项选择题】 关于 AED 说法错误的选项是（ ）

A、电极片应贴紧皮肤

B、电极片的位置应放置正确

C、AED 提示无需电击，应立即以胸外按压开场心肺复苏

D、按下放电按钮时，有人接触患者也无妨

我的答案： D

2【多项选择题】 当为一个成人进展高质量 CPR 时，你应确保完成什么操作？（ ）

A、按压深度 5-6cm

B、保持 100-120次/分钟的按压速率

C、按压部位在胸部中央，胸骨中下三分之一交界处

D、每次按压后胸廓完全回弹

E、尽量减少胸外按压中断

我的答案：ABCDE

3【判断题】AED 使用时无需完全暴露患者的前胸部，电极片可直接贴在患者胸部的衣服上。

我的答案：×

出血与止血概述

1【单项选择题】以下哪种出血最具危险性，如不及时处理将造成生命危险？（ ）

A、毛细血管出血

B、静脉出血

C、动脉出血

D、皮下出血

我的答案：C

2【单项选择题】某人因事故导致血管破裂，鲜红的血从血管里喷射出来，那么出血部位可能是（ ）

A、神经

B、静脉

C、动脉

D、毛细淋巴管

我的答案：C

3【判断题】高处坠落、踩踏事件、交通事故、运动伤害等都可能导致内出血。

内出血发生时，血液从血管中流出，但没有流出体外，因此容易被无视，危险更大。

我的答案：√

现场止血方法——指压止血法、加压包扎止血法

1【单项选择题】2010年4月14日在我国青海玉树地震中，某同学上臂受伤出血，血色鲜红，血流速度快。你认为伤到的血管及正确的止血方法是（ ）

- A、静脉、在伤口的远心端压迫止血
- B、动脉、在伤口的近心端压迫止血
- C、静脉、在伤口的近心端压迫止血
- D、动脉、在伤口的远心端压迫止血

我的答案：B

2【多项选择题】常用的止血方法有哪些？（ ）

- A、压迫止血法
- B、包扎止血法
- C、填塞止血法
- D、止血带止血法

我的答案：ABCD

3【判断题】手指或脚趾出血，可用安康手的拇指和食指压迫受伤手指或脚趾根部两侧的动脉止血。

我的答案：√

现场止血方法——止血带止血法、绞紧止血法

1【单项选择题】以下物品中不能用作止血带的是（ ）

- A、三角巾
- B、手帕
- C、铁丝

D、领带

我的答案：C

2【多项选择题】关于止血带止血法，以下说法正确的选项是（ ）

A、止血带与皮肤之间应加衬垫，以免损伤皮肤。

B、捆扎止血带松紧度要适宜，以出血刚好停顿为准。

C、上止血带的伤病员要尽快送医院，不要停留或耽误时间。

D、上止血带后，不可再松开，以防大出血。

我的答案：ABC

3【判断题】在紧急情况下为伤员止血时，须先用压迫法止血后再根据出血情况改用其他止血法。

我的答案：√

骨折概述

1【单项选择题】关于骨折的描述，以下说法错误的选项是（ ）

A、骨的完整性破坏或连续性中断称为骨折

B、骨折时可以没有骨擦音或骨擦感

C、只要发现骨折的特有体征中的一项，即可初步判断其发生了骨折

D、检查可疑骨折病人时，应反复搬动受伤的肢体以诱发骨擦音或骨擦感的出现

我的答案：D

2【多项选择题】当遇到骨折伤者时，从哪些方面进展判断是骨折？（ ）

A、受伤部位疼痛和压痛

B、受伤部位肿胀

C、受伤部位畸形

D、功能障碍

我的答案：ABCD

3【判断题】当骨折端刺破大血管时，伤员往往发生大出血，出现休克。

我的答案：√

创伤骨折的急救

1【单项选择题】骨折现场固定时，夹板、树枝或木棒的长度应（ ）

A、超过骨折处 2cm

B、超过骨折处的上关节

C、超过骨折处的下关节

D、超过骨折处的上、下关节

我的答案：D

2【单项选择题】严重创伤骨折现场急救的首要原则是（ ）

A、快速止痛

B、抢救生命

C、现场固定

D、包扎伤口

我的答案：B

3【判断题】骨折伤者的现场急救，及时正确地固定断肢，可减少伤员的疼痛及周围组织继续损伤，同时也便于伤员的搬运和转送。

我的答案：√

骨折伤者的搬运

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256010203051010241>