


精神分裂症患者 的护理

社区




精神分裂症



定义

- ❖ 是一组**病因未明**的重性精神疾病
- ❖ 具有**感知觉、思维、情感、行为**等多方面的障碍
- ❖ 以**精神活动和周围环境不协调**为主要特征
- ❖ 反复发作，多次发作后病情加重





遗传学研究

- ❖ 若父母一方是精神分裂症患者，其子女患病的概率大约为**12%**
- ❖ 若父母双方均是精神分裂症患者，其子女患病的概率上升至**46%**
- ❖ 对于同卵双生的双胞胎，两人共同患病的可能性是**40%~50%**
- ❖ 其母为精神分裂症的寄养子，成年后患病率仍**较高**



临床表现

v前驱阶段



v发展阶段



v后期阶段



前驱阶段

性格改变

稳定的人格特征变化

类神经症症状

焦虑、注意力不集中、失眠、疲劳

语言和行为变化

不可理解的行为和语言



发展阶段

感知觉障碍

幻觉（幻听、幻视、幻嗅、幻触）

思维障碍

思维联想障碍、逻辑障碍、内容障碍

情感障碍

情感淡漠、情感倒错

意志与行为障碍

意志减退、紧张综合征



感知觉障碍

❖ 最突出：**幻听**，评论性、命令性、争论性（自言自语自笑、侧耳倾听、对空怒骂等）

命令性幻听应该引起工作人员注意！！！！

❖ 少见：幻嗅、幻视、幻触



思维障碍

- ❖ **思维联想障碍：**思维散漫、思维破裂、思维贫乏
- ❖ **思维逻辑障碍：**逻辑倒错、病理性象征性思维、语词新作
- ❖ **思维内容障碍：**妄想（关系妄想、被害妄想、夸大妄想、钟情妄想）、被动体验（被洞悉感）





情感障碍

- ❖ **情感淡漠：** 缺乏细致和高级情感，对事物缺乏应有的情感反应
- ❖ **情感倒错：** 谈不幸时满面笑容，流着泪唱欢乐的歌曲



意志与行为障碍

- ❖ 意志减退：孤僻、被动、退缩、不料理个人卫生、不梳洗
- ❖ 紧张综合征：紧张性木僵、紧张性兴奋

后期阶段

临床痊愈

不存在精神症状

缺损

残留类似神经症的症状


迁延恶化

症状残留

以衰退为转归



临床分型 (1)





各型比较

类型	起病	发病年龄	症状特点	药物治疗效果	预后
偏执型	缓	中年	妄想、幻听	较其他类型好	好
青春型	急	青年	思维破裂、情绪变化无常、行为幼稚	尚好，易复发	较好
单纯型	缓	青少年	情感淡漠、思维贫乏、行为退缩	差	差
紧张型	急	青年	紧张性木僵、紧张性兴奋	较好	好

临床分型(2)



I 型精神分裂症（阳性症状为主）

II 型精神分裂症（阴性症状为主）

精神分裂症



临床分型(2)

- ❖ 阳性症状：精神活动异常或亢进，幻觉、妄想、行为冲动紊乱、情感不稳定且与周围环境不协调
- ❖ 阴性症状：精神功能减弱或缺乏，思维贫乏、情感淡漠、意志活动减退、社会隔离、反应迟钝



临床分型 (2)

❖ I型和II型精神分裂症的主要区别

内容	I型 阳性症状	II 阴性症状
临床主要特征	幻觉、妄想、行为紊乱	情感淡漠、言语贫乏、意志活动减退
对抗精神病药物反应	良好	差
预后	较好	差
生物学基础	多巴胺功能亢进	脑发育缺乏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256054143122010212>