

2024 年福建省浦城县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整题库附答案【突破训练】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 质问方式
- B: 指令方式
- C: 被动方式
- D: 主动方式

答案：D

2. 用于房颤时控制心室率的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 卡托普利
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案：D

3. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 指令方式
- B: 协商方式
- C: 教育方式
- D: 主动方式

答案：D

4. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

5. 二氢吡啶类钙通道阻滞药硝苯地平引起的主要不良反应是

- A: 高钾血症
- B: 低钾血症
- C: 水肿
- D: 多毛症

答案：C

6. 患者，女，45 岁，1 年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgqd，甲硝唑片 0.4gtid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 220mg tid。患者溃疡治愈后，因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险，首选的预防药物是

- A: 替普瑞酮
- B: 奥美拉唑
- C: 多潘立酮
- D: 枸橼酸铋钾

答案：B

7. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 右眼

- A: O

B: DOL

C: LD

D: NS

答案：A

8. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

A: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

B: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

C: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

D: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

答案：B

9. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

A: 洛伐他汀

B: 普萘洛尔

C: 氢氯噻嗪

D: 卡托普利

答案：C

10. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

A: 浓茶

B: 烟

C: 酒

D: 食醋

答案：A

11. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 IU 的抗生素是

- A: 四环素
- B: 红霉素
- C: 土霉素
- D: 链霉素

答案：A

12. (2015 年真题) 患者，男，50 岁，高血压病史 3 年。期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和引用多种饮料，出现血压波动情况。

- A: 控释片比普通片剂含量高，不宜嚼碎服用，不然会导致低血压
- B: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同
- C: 控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用
- D: 控释片比普通片剂含量相同，与普通片给药次数相同

答案：A

13. 患者，男，80 岁，临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是()

- A: 睡前服用，起床站立时应缓慢，预防体位性低血压
- B: 每日服用一次，定期监测血糖，防止发生低血糖反应
- C: 睡前服用，注意监测肾功能
- D: 睡前服用，定期监测肝功能

答案：A

14. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: B 级

B: A 级

C: D 级

D: C 级

答案: C

15. 与环丙沙星有相互作用合并使用应做血液浓度监测的药物是

A: 孟鲁司特钠咀嚼片

B: 茶碱片

C: 异丙托溴铵气雾剂

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案: B

16. 按上述方案治疗 3 个月后, 查空腹血糖 7.5mmol/L, 餐后血糖

12.2mmol/L 糖化血红蛋白 7.0%。该患者经常出差, 进食不规律, 希望选择每日使用一次的降糖药。宜选用的药物是 ()

A: 阿卡波糖片

B: 二甲双胍片

C: 瑞格列奈片

D: 格列美脲片

答案: D

17. 某患者, 女, 45 岁, 身高 160cm, 体重 75kg, 临床诊断为 2 型糖尿病。实验室检查: 空腹血糖 8.7mmol/L, 餐后 2 小时血糖 13.1mmol/L, 糖化血红蛋白 7.1%。经饮食控制、规律锻炼, 血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 格列齐特

答案：B

18. 如发现“仙牛健骨颗粒”Ⅲ期临床试验过程连续发生严重不良事件，确认后暂停其试验

- A: 发现药品质量问题
- B: 药品上市后风险评估
- C: 药品上市前风险评估
- D: 发现与规避假、劣药流入市场

答案：C

19. 可能导致癫痫发作的药物是

- A: 利血平
- B: 氟哌啶醇
- C: 麻黄碱
- D: 白消安

答案：C

20. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性以保证正常起居(避免夜尿过多)的是

- A: 清晨服氨基糖苷类
- B: 清晨服糖皮质激素
- C: 清晨服利尿药
- D: 清晨服抗抑郁药

答案：C

21. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

- A: 链霉素
- B: 对氨基水杨酸钠
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案: C

22. 关于处方书写要求，错误的是

- A: 一张处方最多可以为 2 名患者开具药品
- B: 化学药、中成药可以开在一张处方纸上，但每种药品必须分行书写，药品总数不得超过 5 种
- C: 处方如果修改，需要在修改处有医师签名和日期
- D: 处方上需要标明临床诊断结果

答案: A

23. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予 ()

- A: 有机硫类
- B: 苯妥英钠
- C: 阿托品
- D: 去甲肾上腺素

答案: C

24. (2019 年真题) 下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

- A: 桂利嗪与脑益嗪
- B: 醋酸氯己定与洗必泰
- C: 氨甲苯酸与止血敏
- D: 利可君与利血生

答案：C

25. 硝酸甘油

- A: 血红蛋白量增多
- B: 血小板减少
- C: 嗜酸性粒细胞减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：A

26. 为防止血管扩张、促进毒物吸收。应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

- A: 溶液事先加热
- B: 多次反复进行冲洗
- C: 最多不超过 500ml
- D: 减小注入压力

答案：A

27. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

- A: 东莨菪碱片
- B: 氟桂利嗪胶囊
- C: 左甲状腺素钠片
- D: 阿米洛利片

答案：C

28. 患者，女，45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

- A: 氨溴索

- B: 阿莫西林
- C: 头孢呋辛酯
- D: 莫西沙星

答案：D

29. 患者，女，47 岁，出现一侧颜面部骤然发作性闪痛，诊断为三叉神经痛，应选用的药物是（）

- A: 布洛芬
- B: 麦角胺咖啡因
- C: 山莨菪碱
- D: 卡马西平

答案：D

30. 严重肝损害和肾损害患者禁用的增强认知功能药物为（）

- A: 加兰他敏
- B: 多奈哌齐
- C: 卡巴拉汀
- D: 苯海索

答案：A

31. （2019 年真题）患者，男，34 岁，因糖尿病酮症酸中毒入院需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物，应选用的药物是

- A: 门冬胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

32. 血尿酸升高的相关疾病是

- A: 流感
- B: 过敏性鼻炎
- C: 湿疹
- D: 痛风

答案：D

33. 严重水肿可使用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：B

34. 中毒时可采用催吐处理方法的患者

- A: 孕妇患者
- B: 昏迷状态病人
- C: 中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人
- D: 患有严重心脏病的患者

答案：C

35. 以下有关肝功能不全患者用药原则的叙述中，不正确的是

- A: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物
- B: 特别应避免与肝毒性的药物合用
- C: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- D: 选用从肝脏排泄的药物

答案：D

36. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人 $<40\text{U/L}$
- B: 男性 $<40\text{U/L}$
- C: 男性 11~50U/L
- D: 成人 $<50\text{U/L}$

答案：A

37. 机体钙吸收减少的机制是

- A: 经肾排泄的药物消除减慢
- B: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积
- C: 组织吸收有自限性
- D: 药物生物转化障碍

答案：D

38. (2017 年真题) 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是 ()

- A: 干酵母
- B: 硫酸镁
- C: 比沙可啶
- D: 双歧杆菌

答案：C

39. 静脉滴注速度过快或口服剂量过大，可引起急性肾衰竭的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦
- C: 人促红素
- D: 脂肪乳

答案：B

40. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L - 10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱
- B: 洛哌丁胺
- C: 药用炭
- D: 鞣酸蛋白

答案：B

41. 最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

- A: 病历审查
- B: 岗位工作问责
- C: 直接观察
- D: 计算机检测方法

答案：A

42. 患者，男，65 岁，临床诊断：2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A: 选用美托洛尔缓释片不合理
- B: 瑞格列奈片用量不合理
- C: 选用阿卡波糖片不合理
- D: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理

答案：D

43. （2015 年真题）在处方适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会有不良互相作用的是（ ）。

- A: 头孢哌酮和舒巴坦
- B: 苄丝肼和左旋多巴
- C: 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- D: 阿莫西林和克拉维酸钾

答案：C

44. 一些药物的副作用是嗜睡、眩晕、视力模糊或定向力障碍等；为安全起见驾驶员应该

- A: 开车前 4 小时慎用
- B: 开车前 4 小时服用
- C: 开车前 2 小时服用
- D: 开车前 2 小时慎用

答案：A

45. 脑出血的内科治疗最重要的是

- A: 控制脑水肿
- B: 降低血压
- C: 给予止血剂
- D: 抗生素治疗

答案：A

46. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 尼美舒利
- C: 阿司匹林
- D: 布洛芬

答案：A

47. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 心血管毒性
- C: 明显的锥体外系症状
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：C

48. “治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者可分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度”是针对

- A: 半衰期小于 30 分钟的药品
- B: 半衰期大于 24 小时的药品
- C: 半衰期 8~24 小时的药品
- D: 半衰期大于 30 小时的药品

答案：A

49. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

- A: <50mg / dl
- B: <40mg / dl
- C: <70mg / dl
- D: <60mg / dl

答案：C

50. 就餐前 15~30 分钟给药的是

- A: 胰岛素
- B: 瑞格列奈
- C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：A

51. (2019 年真题) 患者，男，65 岁，因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院，诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 羧甲司坦

C: 右美沙芬

D: 氨溴索

答案：C

52. 口服氯化铵用于解救的是 ()

A: 硝西泮中毒

B: 氯丙嗪中毒

C: 瘦肉精中毒

D: 苯丙胺中毒

答案：D

53. 应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

A: 卡培他滨

B: 顺铂

C: 奥沙利铂

D: 卡铂

答案：C

54. 服用华法林、利福平可呈现

- A: 橘红至红色
- B: 红至黑色
- C: 黄色
- D: 白陶土便

答案：A

55. 可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为

- A: 肾移植术后发生排斥反应
- B: 胃溃疡
- C: 糖尿病
- D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案：D

56. 可吸附砷、沉淀汞的洗胃液是

- A: 3%~5%鞣酸溶液
- B: 药用炭混悬液
- C: 鸡蛋白
- D: 1%氯化钠溶液

答案：C

57. 关于肝功能不全患者用药，叙述不正确的是

- A: 明确诊断，合理选药
- B: 口服肝毒性较大时可改为注射给药
- C: 避免或减少使用肝毒性大的药物
- D: 肝功能不全而肾功能正常的患者可选用对肝毒性小，并且从肾脏排泄的药物

答案：B

58. 使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

- A: 适当隐秘
- B: 配备必备设备
- C: 位置标志明确
- D: 环境舒适

答案：A

59. 下列物质口服中毒后，解救时不宜洗胃的是

- A: 乐果
- B: 重金属
- C: 砒霜
- D: 汽油

答案：D

60. 引起"老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应"是

- A: 性别
- B: 遗传因素
- C: 年龄
- D: 基础疾病

答案：C

61. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 胸痛
- B: 针刺或刀扎样锐性痛
- C: 压迫、发闷
- D: 多持续 3~5 分钟

答案：B

62. 开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

- A: 医嘱完整不漏项
- B: 修订医嘱及时沟通
- C: 医嘱清楚准确
- D: 实现个体化治疗

答案：D

63. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

- A: 嗜酸性粒细胞减少
- B: 嗜碱性粒细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 中性粒细胞减少

答案：C

64. 患者女 56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是（）

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 螺内酯
- D: 氯沙坦

答案：A

65. 患者，女，20 岁，1 天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。查体：T36.5℃，P70 次/分，R18 次/分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体 I 度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良 Centor 评分：患者，20 岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良 Centor 评分为 0 分。药师对该患者的建议，错误的是

- A: 避免环境温度突然变化
- B: 可服用布洛芬混悬液止痛
- C: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d
- D: 告知患者不要强行发声

答案：C

66. 红霉素

- A: 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- B: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- C: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- D: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

答案：D

67. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹/L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 慢性肾盂肾炎
- B: 急性肾盂肾炎
- C: 急性膀胱炎
- D: 急性肾小球肾炎

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

68. 每日分泌量相近，清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是

A: 胰岛 B 细胞

B: 肝脏合成胆固醇

C: 胃酸的分泌

D: 糖皮质激素的分泌

答案：A

69. 关于匹维溴铵，下列说法不正确的为

A: 为钙离子拮抗剂

B: 降低食管下括约肌压力

C: 松弛胆道口括约肌

D: 有抗胆碱能作用

答案：B

70. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 异烟肼

D: 吡嗪酰胺

答案：A

71. 急诊处方印刷用纸的颜色是

A: 淡绿色

B: 淡蓝色

C: 淡红色

D: 淡黄色

答案：D

72. 属于渗透性泻药，因会影响合用药的吸收，故联合治疗时最好间隔 2 小时再服药，适用于糖尿病和老年患者的是

- A: 乳果糖
- B: 比沙可啶
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 欧车前

答案：C

73. 可致驾驶员排尿增多、视力改变的是

- A: 阿司匹林
- B: 东莨菪碱
- C: 阿米洛利
- D: 氯苯那敏

答案：C

74. 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性,将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估,此药物经济学评价方法是()

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效果分析
- D: 最小成本分析

答案：B

75. 患者用药咨询的内容是

- A: 抗菌药物的合理使用
- B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

答案：B

76. 患者，男，72 岁。体重 75kg，1 小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体：血压 210/90mmHg；检查结果示：糖化血红蛋白 9.3%，血肌酐 143.2 $\mu\text{mol/L}$ 。既往有高血压、糖尿病、心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

- A: 氯吡格雷
- B: 阿司匹林联合氯吡格雷
- C: 阿替普酶
- D: 阿司匹林

答案：B

77. 患者男性，30 岁，确诊哮喘入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

- A: H₁ 受体阻断剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 抗胆碱药物
- D: β 2 受体激动剂

答案：B

78. 成本-效果分析

- A: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率
- B: 成本和治疗结果均用货币表示
- C: 药物利用指数 (DUI)
- D: 是成本-效果分析的一种特例

答案：A

79. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 哌拉西林一他唑巴坦

B: 阿奇霉素

C: 氨苄西林～舒巴坦

D: 莫西沙星

答案：D

80. （2015 年真题）用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是（）。

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案：A

81. 配制青霉素输液的适宜溶媒是（）

A: 0.9%氯化钠注射液

B: 50%葡萄糖注射液

C: 复方氯化钠注射液

D: 低分子右旋糖酐注射液

答案：A

82. 下列白细胞计数中，属于不正常的是

A: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$

B: 新生儿 $15.0 \times 10^9 / L$

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 成人 $3.5 \times 10^9 / L$

D: 成人 $5.0 \times 10^9 / L$

答案：C

83. 阿米洛利及复方制剂

- A: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- B: 可使驾驶员出现定向力障碍
- C: 可导致驾驶员多尿或多汗
- D: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

答案：C

84. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 双肺炎症还是肺间质纤维化
- B: 慢性支气管炎还是急性支气管炎
- C: 肺心病还是冠心病
- D: 支气管哮喘还是心源性哮喘

答案：D

85. 肠外营养 1g 氮能提供的热量是

- A: 7kcal
- B: 4kcal
- C: 3kcal
- D: 9kcal

答案：B

86. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160/100mmHg，诊断为：妊娠高血压。

- A: 葡萄糖酸钙注射液

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 尼莫地平注射液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/256145045055011030>