

版本要求

本课件需用office2010及以上版本打开，如果您的电脑是office2007及以下版本或者WPS软件，可能会出现不可编辑的文档。

乱码问题


如您在使用过程中遇到公式不显示或者乱码的情况，可能是因为您的电脑缺少字体，请登录网站www.canpointgz.cn/faq 下载。

联系我们

如您还有其他方面的问题，请登录网站www.canpointgz.cn/faq ，点击“常见问题” ，或致电010-58818058。



全品 学_了一_二 坼⁷考



高中数学

选择性必修第一册 RJA



第一章空间向量与立体几何

示

CONTENTS

1.4 空间向量的应用

1.4.1 用空间向量研究直线、平面的位置关系

第2课时空间中直线、平面的平行

课前预习 课中探究 备课素材

探究点一空间向量与平行关系

探究点二利用空间向量证明平行关系

【学习目标】

1. 能用直线的方向向量和平面的法向量刻画直线与直线、直线与平面、平面与平面的平行.
2. 能分析和解决一些立体几何中有关平行的问题，体会向量方法与综合几何方法的共性和差异，体会直线的方向向量和平面的法向量的作用，感悟向量是研究几何问题的有效工具.

课前预习


◆ 知识点用空间向量描述空间线面的平行关系

设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 u_1, u_2 , 平面 α, β 的法向量分别为 n_1, n_2 ,

平行关系	对应线面	图形	满足条件
线线平行	l_1 与 l_2	<p>The diagram shows two parallel lines, l_1 and l_2. Below l_1 is a vector u_1, and below l_2 is a vector u_2. The vectors u_1 and u_2 are shown to be parallel to each other.</p>	$l_1 // l_2 \Leftrightarrow \frac{u_1 // u_2}{}$ $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{ 使得}$ $u_1 = \lambda u_2$
线面平行	l_1 与 α ($l_1 \not\subset \alpha$)	<p>The diagram shows a line l_1 and a plane α. The line l_1 is parallel to the plane α. A vector u_1 is shown along the line l_1, and a vector n_1 is shown perpendicular to the plane α.</p>	$l_1 // \alpha \Leftrightarrow \frac{u_1 \perp n_1}{}$ $u_1 \cdot n_1 = 0$

课前预习

续表

平行关系	对应线面	图形	满足条件
面面平行	α 与 β		$n_1 // n_2$ $\alpha // \beta \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{使得}$ $n_1 = \lambda n_2$

课前预习

【诊断分析】 判断正误. (请在括号中打“√”或“×”)

(1) 若两条直线平行, 则它们的方向向量的方向相同或相反. (√)

【解析】 若两条直线平行, 则它们的方向向量也平行, 故它们的方向向量的方向相同或相反.

(2) 若平面外的一条直线的方向向量与平面的法向量垂直, 则该直线与平面平行. (√)

【解析】 由线面平行的判定定理知, 若平面外的一条直线的方向向量与平面的法向量垂直, 则该直线与平面平行.

课前预习

(3) 若两条不同直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $a=(3, 1, -2)$, $b=(-6, -2, 4)$, 则 $l_1//l_2$. (\checkmark)

[解析] 因为 $b=-2a$, 所以 $l_1//l_2$.

(4) 若两个平面平行, 则这两个平面的法向量一定平行. (\checkmark)

[解析] 若两个平面平行, 则这两个平面的法向量一定平行. 故正确.

课中探究

◆ 探究点一 空间向量与平行关系

例1

(1) 如图1-4-11所示, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a , M, N 分别为 A_1B 和 AC 上的点,

$A_1M = AN = \frac{\sqrt{2}a}{3}$, 则 MN 与平面 BB_1C_1C 的位置关系是

(B)

A. 相交

B. 平行

C. 垂直

D. MN 在平面 BB_1C_1C 内




图1-4-11

课中探究

[解析] 以 C_1 为原点, $\overline{C_1B_1}$, $\overline{C_1D_1}$, $\overline{C_1C}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向,

$$A_1M = AN = \frac{\sqrt{2}a}{3} \quad \left(a, \frac{2}{3}a, \frac{a}{3}\right) \quad \left(\frac{2}{3}a, \frac{2}{3}a, a\right)$$

建立空间直角坐标系由 $MN = \left(-\frac{a}{3}, 0, \frac{2}{3}a\right)$

, 可得 M

, N

故

, 易知平面 B_1BCC_1 的一个法向量为 $n=(0,1,0)$, 故 $MN \cdot n=0$,

即 $MN \perp n$. 又 $MN \neq$ 平面 BB_1C_1C , 所以 $MN //$ 平面 BB_1C_1C . 故选 B.

课中探究

(2) [2023·广东顺德一中高二月考] 已知向量 $AB = (2, 4, x)$, 平面 α 的一个法向量 $n = (1, y, 3)$, 若 $AB // \alpha$, 则 (C)

A. $x=6, y=2$

B. $x=2, y=6$

C. $3x+4y+2=0$

D. $4x+3y+2=0$

[解析] 因为 $AB // \alpha$, 所以 $AB \perp n$, 则 $AB \cdot n = 2 + 4y + 3x = 0$, 故选 C.

课中探究

(3) 设向量 μ , ν 分别是平面 α , β 的法向量, 向量 $\mu = (1, 2, -2)$,
 $\nu = (-2, -4, m)$, 若 α , β 平行, 则实数 $m =$ 4.

[解析] $\because \alpha // \beta$, \therefore 平面 α , β 的法向量互相平行, $\therefore \lambda (1, 2, -2) = (-2, -4, m)$,
且 $\lambda \in \mathbb{R}$, 解得 $\lambda = -2, m = 4$.

课中探究

◆ 探究点二利用空间向量证明平行关系

例2 如图1-4-12, 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为

2, E, F 分别是 BB_1, DD_1 的中点. 求证:

(1) $FC_1 //$ 平面 ADE ;




图1-4-12

课中探究

证明：以D为原点， DA, DC, DD_1 所在直线分别为x轴、y轴、z轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $D(0, 0, 0), A(2, 0, 0), C_1(0, 2, 2), E(2, 2, 1), F(0, 0, 1), B_1(2, 2, 2)$,

所以 $\overrightarrow{FC_1} = (0, 2, 1), \overrightarrow{DA} = (2, 0, 0), \overrightarrow{AE} = (0, 2, 1)$.


设 $\mathbf{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面ADE的法向量，

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{n}_1 \perp \overrightarrow{DA}, & \text{即} \begin{cases} \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{DA} = 2x_1 = 0, \\ \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = 2y_1 + z_1 = 0, \end{cases} \end{cases}$$

取 $z_1 = 2$ ，则平面ADE的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, -1, 2)$.

因为 $\overrightarrow{FC_1} \cdot \mathbf{n}_1 = -2 + 2 = 0$ ，所以 $\overrightarrow{FC_1} \perp \mathbf{n}_1$,

又 $\overrightarrow{FC_1} \neq \text{平面ADE}$ ，所以 $\overrightarrow{FC_1} \parallel \text{平面ADE}$.



课中探究

(2) 平面ADE // 平面 $\overline{B_1C_1F}$.

证明：由(1)知，

$\overrightarrow{FC_1} = (0, 2, 1)$, $\overrightarrow{C_1B_1} = (2, 0, 0)$ 是平面 $\overline{B_1C_1F}$ 的法向量，

设

$$\mathbf{n}_2 = (x_2, y_2, z_2) \begin{cases} \mathbf{n}_2 \perp \overrightarrow{FC_1}, & \begin{cases} \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{FC_1} = 2y_2 + z_2 = 0, \\ \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{C_1B_1} = 2x_2 = 0, \end{cases} \end{cases}$$

取 $z_2=2$, 则平面 $\overline{B_1C_1F}$ 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0, -1, 2)$.

因为 $\mathbf{n}_1 // \mathbf{n}_2$, 所以平面ADE // 平面 $\overline{B_1C_1F}$.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/256212014223010141>