

神经外科诊疗常规

脑膜瘤

广东医学院附属石龙博爱医院

神经外科



廣東醫學院 附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

概述

- 脑膜瘤是成人常见的颅内良性肿瘤，其发病率仅次于胶质瘤。脑膜瘤的发生与蛛网膜有关，特别是其好发部位与蛛网膜颗粒的分布相一致。脑膜瘤多与硬脑膜粘连着，但亦可与硬脑膜无关联，如发生在脑室内的脑膜瘤。在显微镜下脑膜瘤根据细胞特点而分为内皮型、纤维型、沙砾型和恶性脑膜瘤等。



诊断标准

- 临床表现
- 病史 脑膜瘤因属良性肿瘤，生长慢，病程长。因肿瘤呈膨胀性生长，病人往往以头痛和癫痫为首发病症。



廣東醫學院附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 临床表现
- 头痛 颅内压增高病症可不明显。许多病人仅有轻微头痛，甚至经CT扫描偶然发现脑膜瘤。



廣東醫學院 附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 临床表现
- 癫痫 位于额部或顶部等脑膜瘤可产生刺激病症，多见为限局性癫痫。



廣東醫學院附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 临床表现
- 局部肿块 脑膜瘤常可造成邻近颅骨骨质的变化，表现为骨板受压变薄、被破坏，甚至穿破骨板侵蚀至帽状腱膜下，头皮局部可见隆起。



诊断标准

- 临床表现
- 病史 脑膜瘤因属良性肿瘤，生长慢，病程长。因肿瘤呈膨胀性生长，病人往往以头痛和癫痫为首发病症。
- 头痛 颅内压增高病症可不明显。许多病人仅有轻微头痛，甚至经CT扫描偶然发现脑膜瘤。
- 癫痫 位于额部或顶部等脑膜瘤可产生刺激病症，多见为限局性癫痫。
- 局部肿块 脑膜瘤常可造成邻近颅骨骨质的变化，表现为骨板受压变薄、被破坏，甚至穿破骨板侵蚀至帽状腱膜下，头皮局部可见隆起。



廣東醫學院 附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 辅助检查
- 头颅X线 可见肿瘤区颅骨增生变厚，或骨质破坏，脑膜血管沟迂曲增宽。



廣東醫學院附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BO'AI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 辅助检查
- 头颅CT和MRI 最好同时进行CT和MRI增强扫描，比照分析，得到校正正确的定位及定性诊断。一般表现为肿瘤区密度增高周围脑水肿，造影剂强化后可见球形肿块。



廣東醫學院 附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 辅助检查
- 脑血管造影 动脉期血管移位，静脉期肿瘤染色。



廣東醫學院附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

诊断标准

- 辅助检查
- 头颅X线 可见肿瘤区颅骨增生变厚，或骨质破坏，脑膜血管沟迂曲增宽。
- 头颅CT和MRI 最好同时进行CT和MRI增强扫描，比照分析，得到校正正确的定位及定性诊断。一般表现为肿瘤区密度增高周围脑水肿，造影剂强化后可见球形肿块。
- 脑血管造影 动脉期血管移位，静脉期肿瘤染色。



廣東醫學院附屬石龍博愛醫院

编辑课件

AFFILIATED SHILONG BOAI HOSPITAL OF GUANGDONG MEDICAL COLLEGE

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256214002051010234>