

## 临床医学概论练习题库与答案

1、隐性黄疸时，血中胆红素浓度为（ ）

A  $<17\mu\text{mol/L}$

B  $>17\mu\text{mol/L}$   $<34\mu\text{mol/L}$

C  $>34\mu\text{mol/L}$

D  $>17\mu\text{mol/L}$   $<24\mu\text{mol/L}$

E  $>24\mu\text{mol/L}$

答案：B

2、洋地黄类药物的主要治疗作用是（ ）

A、利尿

B、加快心率

C、减慢心率，增强心肌收缩力

D、扩张冠状动脉

E、舒张支气管平滑肌

答案：C

3、阻塞性肺气肿的主要症状是（ ）

A、喘息

B、咳嗽咳痰

C、心悸胸闷

D、逐渐加重的呼吸困难

E、紫绀

答案：D

4、中年女性患者，咳嗽、胸痛、胸闷1月余。立位胸片显示右下肺野边缘模糊致密阴影，阴影上缘位于第三前肋水平，外高内低，患侧横膈显示不清，应首先考虑（ ）

A、右侧自发性肺不张

B、右下肺实变

C、右下肺不张

D、右侧大量胸腔积液

E、右侧中等量胸腔积液

答案：E

5、上睑下垂见于（ ）

A、沙眼

B、结膜炎

C、甲亢

- D、肾炎
- E、重症肌无力

答案：E

6、确定阑尾、胆囊压痛点适用( )

- A、浅部触诊法
- B、双手触诊法
- C、深部滑行触诊法
- D、深压触诊法
- E、冲击触诊法

答案：D

7、一侧角膜直接反射消失而间接反射存在说明病变在( )

- A、同侧动眼神经
- B、同侧三叉神经
- C、同侧面神经
- D、同侧滑车神经
- E、对侧三叉神经

答案：C

8、咳嗽伴声音嘶哑见于( )

- A、支气管扩张
- B、支气管炎
- C、咽炎
- D、早期肺结核
- E、纵膈肿瘤压迫喉返神经

答案：E

9、心电图检查具有决定性诊断意义的是( )

- A、心房、心室肥大
- B、电解质紊乱和药物中毒
- C、心肌缺血和心肌损伤
- D、心包疾病和心肌疾病
- E、心律失常和急性心肌梗死

答案：E

10、高血压患者，伴变异型心绞痛，最佳降压药为( )

- A、利尿剂
- B、 $\beta$ 受体阻滞剂
- C、 $\alpha_1$ 受体阻滞剂

D、ACEI

E、钙离子拮抗剂

答案：E

11、在抗结核药物中的全杀菌剂是：

A、链霉素

B、吡嗪酰胺

C、乙胺丁醇

D、利福平

E、氨硫脲

答案：D

12、类风湿性关节炎病人后期可能出现的特征性体征是

A、腕关节固定在屈位

B、关节隆凸处出现类风湿结节

C、远端指间关节处皮下小结

D、手指尺侧偏斜畸形

E、脊柱强直

答案：D

13、男，44岁，食欲不振、尿色深半月，来院就诊。评估见皮肤、巩膜黄染，肝脏肋下2厘米，有触痛，脾未触及。实验室检查：总胆红素、结合胆红素、非结合胆红素均增高，尿胆红素、尿胆原均阳性，属于（ ）

A、溶血性黄疸

B、肝细胞性黄疸

C、胆汁淤积性黄疸

D、药物中毒

E、食胡萝卜过多所致

答案：B

14、关于结膜常见病变，错误的是（ ）

A、充血见于结膜炎

B、水肿见于急性肾炎

C、颗粒见于沙眼

D、苍白见于贫血

E、出血点可见于亚急性感染性心内膜炎

答案：B

15、可确定为阻塞性通气功能障碍的指标是（ ）

A、 $FEV_1 < 70\%$  预计值

- B、FEV1/FVC<70% FEV1<80%预计值
- C、FEV1/FVC<70%预计值及 FEV1<80%预计值
- D、FEV1/FVC<80% FEV1<70%预计值
- E、FEV1/FVC<70% FEV1<70%预计值

答案：B

16、现场进行徒手心肺复苏时，伤病员的正确体位是（ ）

- A、侧卧位
- B、仰卧在比较舒适的软床上
- C、仰卧在坚硬的平面上
- D、俯卧位

答案：C

17、抢救大咯血的最重要措施是：

- A、高浓度给氧
- B、根据病情需要以全方位补充血容量
- C、强有力抗感染
- D、保持气道通畅
- E、使用呼吸中枢兴奋剂

答案：D

18、休克型肺炎最突出的表现是（ ）

- A、血压降低
- B、高热
- C、意识障碍
- D、少尿
- E、四肢厥冷

答案：A

19、患者男性，60岁。有关节炎2年，初期为腕掌指关节疼痛，后有膝关节疼痛，最近两手指在掌指关节处偏向尺侧形成关节活动障碍，影响患者的日常生活，查C反应蛋白升高，说明目前疾病处在

- A、康复期
- B、稳定期
- C、活动期
- D、比较轻微阶段
- E、非常严重阶段

答案：C

20、脑膜刺激征临床表现为（ ）

- A、共济失调
- B、抽搐
- C、眩晕和呕吐
- D、双侧 Babinski 征 (+)
- E、颈强直, Brudzinski 征 (+)

答案: E

21、检查者用手以一定力量捏压患者腓肠肌, 如反应为拇趾背伸, 余趾呈扇形展开为 ( )

- A、Babinski 征阳性
- B、Hoffmann 征阳性
- C、Oppenheim 征阳性
- D、Gordon 征阳性
- E、Brudzinski 征阳性

答案: D

22、患者, 女性, 42 岁。半年来出现多食易饥, 失眠、多汗、怕热、体重减轻, 双眼球突出, 甲状腺肿大。临床诊断为“甲状腺功能亢进症”。诊断的主要依据是 ( )

- A、症状和体征
- B、基础代谢率测定
- C、血清蛋白结合碘测定
- D、血清甲状腺激素测定
- E、 $^{131}\text{I}$  摄取率测定

答案: D

23、慢性肺源性心脏病死亡的首要原因是 ( )

- A、心律失常
- B、消化道出血
- C、酸碱失衡和电解质紊乱
- D、DIC
- E、肺性脑病

答案: E

24、心源性水肿最常见的病因是 ( )

- A、左心衰竭
- B、右心衰竭
- C、渗出性心包炎
- D、缩窄性心包炎

E、心绞痛

答案：B

25、肺气肿患者的胸廓前后径与左右径的比例约为( )

A、1:2

B、1:1

C、1:1.5

D、1:2.5

E、2:1

答案：B

26、脾脏高度肿大见于( )

A、慢性肝炎

B、伤寒

C、肝硬化

D、肝癌

E、慢性白血病

答案：E

27、引起成人缺铁性贫血最常见的原因是( )

A、慢性失血

B、铁的需要量增加

C、铁摄入不足

D、铁的吸收不良

E、长期接触 X线

答案：A

28、代表心室复极的波是( )

A、P波

B、QRS波

C、T波

D、ST段

E、u波

答案：C

29、患者，男性，50岁。近1年来多饮、多尿、多食，体重下降，诊断为“2型糖尿病”在进行饮食治疗时，不合适的方案是( )

A、糖类占总热量的50%~60%，忌高糖食物

B、每日可进三餐或四餐，多按1/3、1/3、1/3

C、根据生活习惯、病情和配合用药情况进行合理安排

D、脂肪约占 30%，以植物油为主

E、每日可进三餐或四餐，多按 2/5、2/5、1/5

答案：E

30、确诊肺结核最可靠的方法是（ ）

A、结核菌素试验

B、胸部 X 线检查

C、胸部 CT 检查

D、痰结核菌检查

E、血常规检查

答案：D

31、面色潮红、呼吸急促、鼻翼扇动、口唇疱疹、表情痛苦为（ ）

A、脱水面容

B、急性病容

C、慢性病容

D、贫血面容

E、二尖端面容

答案：B

32、女，35 岁，月经过多，面色苍白，反复出现皮肤散在出血点。查红细胞  $2 \times 10^{12}/L$   $\square\square\square\square\square$  50g/L。应判断为（ ）

A、正常

B、轻度贫血

C、中度贫血

D、重度贫血

E、极重度贫血

答案：D

33、心电图上代表房室传导的时间是（ ）

A、P 波

B、QRS 波群

C、T 波

D、P-R 间期

E、Q-T 间期

答案：D

34、咳嗽带金属音应警惕（ ）

A、喉炎

B、支气管哮喘

- C、肺炎
- D、肺脓肿
- E、肺癌

答案：E

35、治疗重型系统性红斑狼疮首选的药物是（ ）

- A、阿司匹林
- B、糖皮质激素
- C、布洛芬
- D、普鲁卡酰胺
- E、环磷酰胺

答案：B

36、咳嗽带血丝并有午后低热多见于（ ）

- A、肺脓肿
- B、肺结核
- C、支气管扩张
- D、肺炎球菌肺炎
- E、慢性支气管炎

答案：B

37、瞳孔散大可见于（ ）

- A、吗啡类中毒
- B、阿托品中毒
- C、巴比妥类中毒
- D、有机磷杀虫药中毒
- E、毒蕈中毒

答案：B

38、肺部叩诊呈过清音，提示（ ）

- A、肺结核
- B、肺气肿
- C、气胸
- D、胸腔积液
- E、支气管扩张症

答案：B

39、患者，女，62岁。突然头痛、恶心、伴呕吐，左侧肢体运动障碍3小时。头颅CT示右侧额叶高密度灶。最可能的诊断是

- A、脑出血

- B、短暂性脑缺血发作
- C、颅内肿瘤
- D、脑血栓形成
- E、脑栓塞

答案：A

40、甲状腺功能亢进症患者消化系统一般不出现的表现（ ）

- A、易饥多食
- B、大便次数增加
- C、便秘
- D、营养不良
- E、体重锐减

答案：C

41、心脏听诊的规范顺序是（ ）

- A、二尖瓣区→主动脉瓣第二听诊区→主动脉瓣第一听诊区→肺动脉瓣区→三尖瓣区
- B、三尖瓣区→主动脉瓣第一听诊区→肺动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→二尖瓣区
- C、主动脉瓣第一听诊区→肺动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→二尖瓣区→三尖瓣区
- D、二尖瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣第一听诊区→主动脉瓣第二听诊区→三尖瓣区
- E、二尖瓣区→三尖瓣区→主动脉瓣第二听诊区→主动脉瓣第一听诊区→肺动脉瓣区

答案：D

42、艾滋病毒不可以通过下列哪种方式传播（ ）

- A、共用针头或注射器
- B、性接触
- C、日常生活接触
- D、母婴传播
- E、血、血制品、器官移植

答案：C

43、肝硬化患者肝功能减退的临床表现不包括（ ）

- A、齿龈出血
- B、脾大
- C、黄疸

- 、 浮肿
- E、 肝掌

答案： B

44、引起发热最主要的原因因为（ ）

- A、 感染性发热
- B、 吸收热
- C、 皮肤散热障碍
- D、 免疫反应所致发热
- E、 自主神经功能紊乱所致发热

答案： A

45、慢性支气管炎的临床分期是（ ）

- A、 急性发作期、慢性迁延期、临床缓解期
- B、 急性发作期、慢性迁延期、稳定期
- C、 急性发作期、临床缓解期、活动期
- D、 代偿期、失代偿期
- E、 进展期、好转期、稳定期

答案： A

46、X线能使胶片产生（ ）

- A、 荧光效应
- B、 穿透效应
- C、 电离效应
- D、 生物效应
- E、 感光效应

答案： E

47、患者，男性，68岁，查体桶状胸，触觉语颤减弱，双肺叩诊呈过清音、双肺可闻及湿啰音及哮鸣音。首先考虑患者患有（ ）

- A、 支气管扩张
- B、 肺不张
- C、 支气管哮喘
- D、 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- E、 气胸

答案： D

48、水肿的产生机制不包括（ ）

- A、 水、钠潴留
- B、 毛细血管滤过压升高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/257142015003010013>