



诊断学基础

诊断学、内科学教研室—主持：欧应华



体格检查

----头部检查



周卫



四川中医药高等专科学校



头颅外部一般检查



头颅器官检查



思政
目标

培养学生爱岗敬业、敬畏生命、严肃认真的工作态度。

知识
目标

掌握头部检查的内容、方法和注意事项。

能力
目标

能够较为熟练地为病人进行头部检查。

素质
目标

培养学生医患沟通能力，关心爱护、体贴病人的良好医德医风。




重点

瞳孔检查方法及临床意义，鼻窦检查的方法，咽扁桃体的检查方法。

难点

头部及其器官检查的内容及方法。



头颅外部一般检查



一、头颅

头部检查的主要方法是**视诊和触诊**。

头颅 (skull) :

视诊要注意其大小、外形、有无异常活动，头颅的大小用头围来衡量。测量的方法是：将软尺紧贴头皮沿枕骨结节最高点及眉弓上缘一周。

触诊应用双手仔细触诊每一个部位，了解外形有无压痛和异常隆起。



一、头颅

某些疾病的典型体征表现为头颅的大小或异常，常见的有：

1. 小颅畸形：大脑发育不全的小儿；
2. 大头畸形：脑积水小儿；
3. 方颅：多见于小儿佝偻病。
4. 尖颅又称塔颅，见于Apert综合征。
5. 变形颅：见于变形性骨炎。



二、头皮与毛发

头发应注意其颜色疏密度脱发的类型和特点。

头皮检查时须拨开头发，观察头皮的颜色，头皮屑有无头屑、疖痛、血肿、外伤及瘢痕等。




三、头部运动异常

头部活动受限：见于颈椎疾病或颈肌疾患。

头部不随意运动：见于震颤麻痹。

与颈动脉搏动一致的点头运动：见于严重的主动脉瓣关闭不全。



头部器官检查



一、眼

(一) 眼眉:

眉毛脱落见于麻风、垂体前叶功能减退症（席汉底综合症）、二期梅毒、粘液水肿等。

(二) 眼睑:

1. 水肿：见于急、慢性肾炎、重症贫血及营养不良、血管神经性水肿（多限于一侧）及眼睑附近的皮肤炎症等。



一、眼

(二) 眼睑：

2. 睑内翻：见于沙眼。

3. 眼睑闭合障碍：双侧见于甲亢，单侧见于面神经麻痹。

4. 上睑下垂：见于重症肌无力等，单侧见于第111颅神经损害。



一、眼

(二) 眼睑：

2. 睑内翻：见于沙眼。

3. 眼睑闭合障碍：双侧见于甲亢，单侧见于面神经麻痹。

4. 上睑下垂：见于重症肌无力等，单侧见于第111颅神经损害。



一、眼

(三) 结膜:

结膜分为睑结膜、穹隆结膜和球结膜。

在检查上睑结膜时，需要将眼睑翻转，操作方法：嘱患者向下看，医生用示指和拇指捏住上睑中部的边缘，轻轻向前下方牵拉，用示指向下压迫睑板上缘，与拇指配合将睑缘向上捻转。注意动作轻柔用右手检查左眼，左手检查右眼。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/258000023042006052>