

## 2022 年儿科主治医师考试综合试题及答案组卷

1、[题干]关于尿崩症，错误的是()。

- A. 多饮、多食、多尿
- B. 尿蛋白及尿糖均阴性
- C. 尿比重低
- D. 血管加压素分泌不足称中枢性尿崩症。E, 可伴有低热，脱水症状

**【答案】** A

2、[题干]营养性巨幼细胞性贫血的血象变化是

- A. Hb 比 RBC 数减少更明显
- B. 红细胞大小不等，以大细胞为多
- C. 白细胞和血小板数正常
- D. 网织红细胞增高。E, 畸形红细胞增多

**【答案】** B

3、[题干]小儿前囟闭合的最晚时间是()。

- A. 11 个月
- B. 1 岁半
- C. 2 岁
- D. 2 岁半。E, 3 岁

**【答案】** B

**【解析】** 前囟对边中点连线长度在出生时约 1.5~2.0cm，后随颅骨发育而增大，6 个月后逐渐骨化而变小，约在 1~1.5 岁时闭合

4、[题干]1 岁小儿发热伴惊厥，最常见的疾病为()

- A. 中枢神经系统感染
- B. 中毒性菌痢
- C. 重症肺炎
- D. 高热惊厥。E, 破伤风

**【答案】** D

5、[题干]儿童乙型肝炎的主要感染途径是

- A. 血液
- B. 密切接触
- C. 母婴
- D. 注射。E, 食物

**【答案】** C

6、[题干]5 岁。女孩，低热、乏力 2 周。体格检查：贫血貌，咽部充血，颈部淋巴结肿大，质硬，肝脾肿大，Hb96g/L，WBC $23 \times 10^9$ /L，可见幼稚淋巴细胞。可能的诊断是

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 类白血病反应
- C. 再生障碍性贫血
- D. 急性白血病。E, 川崎病

**【答案】** D

7、[题干]患儿，男，注射青霉素后 10 分钟出现呼吸困难、发绀，四肢凉、花纹，意识不清，继之出现惊厥。考虑为青霉素过敏反应。该型变态反应是（）。

- A. IgD 介导的免疫反应
- B. IgE 介导的免疫反应
- C. 肥大细胞介导的免疫反应

D. T 细胞介导的免疫反应。E, B 细胞介导的免疫反应。F, 嗜酸细胞介导的免疫反应

**【答案】** B

8、[题干]3 岁女孩，身高 93cm，洗澡时发现乳房增大，无其他异常表现，否认特殊饮食史。骨龄与实际年龄相当，腹部 B 超检查正常。最可能的诊断是

- A. 乳房肿物
- B. 性早熟可能性大

- C. 单纯乳房早发育
- D. 正常女童。E, 外源性雌激素影响

**【答案】** C

9、[题干]抗休克初次扩容的液体首选() ()。

- A. 0.9%氯化钠溶液
- B. 2:1 等张液
- C. 中分子右旋糖酐
- D. 干冻血浆。E, 2:3:1 溶液

**【答案】** B

**【解析】** 抗休克初次扩容的液体首选 2:1 等张液，故正确答案为 B。  
。

10、[题干]女，14 岁，反复上腹痛 2 年，近期加重，并有反酸，上消化道钡餐造影显示十二指肠球部溃疡，以下哪种药不宜服用

- A. 硫糖铝
- B. 奥美拉唑
- C. 胃蛋白酶合剂
- D. 胶体次碳酸铋。E, 麦滋林

**【答案】** C

11、[题干]关于补钾的要求哪项不合适()

- A. 一般每日补钾总量按 3~4mmol/kg, 见尿补钾
- B. 静脉补钾的浓度不超过 0.3%
- C. 一日补钾量不少于 6~8 小时给入
- D. 一般每日补钾总量按 3~4mmol/kg。E, 吐泻好转应及时停止补钾

**【答案】** E

12、[题干]可发生移植物抗宿主病的原发性免疫缺陷是

- A. 自然杀伤细胞功能缺乏
- B. 中性粒细胞减少症
- C. 慢性肉芽肿病
- D. 选择性 IgA 缺陷病。E, X 连锁联合免疫缺陷病

**【答案】** E

13、[题干]营养不良常见的并发症不含()。

- A. 维生素缺乏
- B. 电解质紊乱
- C. 营养性贫血
- D. 感染。E, 自发性低血糖

**【答案】** B

14、[题干]营养性缺铁性贫血最主要的原因是

- A. 体内贮铁不足
- B. 铁摄入量不足
- C. 生长发育较快
- D. 铁的丢失过多。E, 铁的消耗过多

**【答案】** B

15、[题干]对营养性巨幼细胞性贫血可疑病例的诊断措施中，下列哪项为首选

- A. 血清叶酸含量测定
- B. 血清维生素 B12 测定
- C. 血清铁含量测定
- D. 骨髓象检查。E, 叶酸、维生素 B12 试验性诊断治疗

**【答案】** D

16、[题干]病毒性心肌炎病原学确诊依据不包括()。

- A. 心包液中特异性病毒抗体阳性
- B. 血液中特异性病毒抗体阳性
- C. 心包液中分离到病毒

D. 心肌中分离到病毒。E, 心包液中查到病毒核酸

**【答案】** B

17、[题干]急性肾炎水肿多由何处开始()

A. 眼睑

B. 面部

C. 腹部

D. 下肢。E, 踝部

**【答案】** A

18、[题干]下列癫痫发作，哪种不属于全部性发作

A. 精神症状发作

B. 失神发作

C. 强直性发作

D. 失张力性发作。E, 非典型失神发作

**【答案】** A

19、[单选题]痉挛型脑性瘫痪中可见到下列哪项体征

A. 肌张力低下

B. 膝腱反射减弱

C. 巴氏征阳性

D. 共济失调。E, 手足徐动

**【答案】** C

20、[题干]下列哪项不是金黄色葡萄球菌肺炎的特点()。

A. 中毒症状明显，面色苍白、呻吟

B. 肺部体征出现早，双肺有中细湿啰音

C. 喘憋重，易致呼吸衰竭

D. 皮肤出现猩红热样或荨麻疹样皮疹。E, 易并发脓胸、脓气胸等

**【答案】** C

21、[题干]11岁，女，近1个月多食、易饥饿、消瘦，面红易激动，自觉心悸并发现颈部增粗，最可能的诊断是

A. 单纯性甲状腺肿

B. Graves 病

C. 糖尿病

D. 心动过速。E, 桥本病

**【答案】** B

22、[题干]化脓性脑膜炎，在下列哪些情况下应做头颅 CT 检查( )。

- A. 治疗中持续发热，头围增大
- B. 局限性神经系统异常体征
- C. 显著颅内压增高
- D. 疑有脑脓肿和硬膜下积液形成时。E, 以上都不是

**【答案】** A, B, C, D

23、[题干]儿童水的代谢特点如下，正确的是

- A. 正常小儿水的摄入量大致等于排泄量
- B. 水的需要量于新陈代谢、摄入热量、食物性质、经肾排出溶质量、不显性失水、活动量及环境温度有关
- C. 机体主要通过肾途径排出水分，其次为皮肤和肺的不显性失水和消化道排出
- D. 肾脏是唯一能通过其调节来控制细胞外液容量与成分的重要器官
- E. 小儿体液调节功能相对不成熟，需要排出更多的液体以完成对代谢产物的排泄

**【答案】** ABCDE

24、[题干题]3个月婴儿，喘憋4天，咳嗽、哭闹时出现青紫。查体：肺有细小水泡音，心率150次/分，胸骨左缘第2~3肋间可闻连续性杂音，向心前区及背部传导，肝在肋下3cm。最可能的诊断为

- A. 房间隔缺损

- B. 法洛四联症
- C. 室间隔缺损
- D. 艾森曼格综合征。E, 动脉导管未闭

**【答案】** E

25、[题干]符合营养性缺铁性贫血的骨髓检查结果是()。

- A. 骨髓有核细胞增生降低
- B. 幼稚白细胞增生降低
- C. 有核红细胞胞核发育落后于胞质
- D. 巨核细胞计数正常。E, 骨髓铁染色阳性

**【答案】** D

26、[题干]患儿女，5岁，有鼻塞、流清鼻涕，偶有打喷嚏，伴耳闷、张嘴呼吸半年。鼻镜检查见：鼻黏膜苍白水肿，鼻道有较多的清水样分泌物。最可能的诊断是

- A. 血管运动性鼻炎
- B. 慢性肥厚性鼻炎
- C. 变应性鼻炎
- D. 腺样体肥大。E, 慢性单纯性鼻炎

**【答案】** C

27、[题干]猩红热是由产红疹毒素的何种病原菌引起

- A. A 组  $\alpha$  溶血性链球菌
- B. A 组  $\beta$  溶血性链球菌
- C. A 组  $\alpha$  溶血性链球菌
- D. A 组  $\beta$  溶血性链球菌。E, 金黄色葡萄球菌

**【答案】** B

28、[题干]新型毒品“摇头丸”属于()。

- A. 中枢抑制药
- B. 中枢兴奋药
- C. 麻醉药品
- D. 致幻药。E, 镇痛药

**【答案】** B

29、[题干]急性上呼吸道感染可引起多种并发症，哪种疾病不属于此列( )。

- A. 中耳炎
- B. 颈淋巴结炎
- C. 肺炎
- D. 手足口病。E, 急性肾炎

**【答案】** D

**【解析】** 上呼吸道感染可波及邻近器官，或向下蔓延，可引起中耳炎、鼻窦炎、颈淋巴结炎、气管炎、肺炎等，年长儿患链球菌性上感可引起急性肾炎、风湿热等。手足口病是一种柯萨奇病毒感染，在口腔内可见小疱疹或溃疡，手足部可见斑丘疹或疱疹，不属于上感并发症。

30、[问题] 患儿男，8岁。1天前在入睡后不久惊厥发作1次，初喉头发声、左面部抽搐，之后左上肢抽动，持续数分钟缓解，发作时无意识丧失，发作后左上肢乏力，数小时后活动恢复正常。脑电图见右侧中央区局灶性棘波、尖波发放。头颅MRI检查正常。既往运动及智力发育正常，学习成绩可。该患儿可能属于哪种癫痫综合征

- A. 全面性癫痫伴热性惊厥附加症
- B. 儿童失神癫痫
- C. Lennox-Gastaut 综合征
- D. 伴中央颞区棘波的儿童良性癫痫。E, 婴儿痉挛

**【答案】** D

31、[题干] 下列哪项不是肺炎常见的病原体

- A. 立克次体
- B. 肺炎支原体
- C. 腺病毒

D. 合胞病毒。E, 金黄色葡萄球菌

**【答案】** A

32、[题干]在机体缺铁的早期即铁减少期有改变的指标是

A. 铁饱和度

B. 红细胞游离原卟啉

C. 血清铁

D. 血清铁蛋白。E, 总铁结合力

**【答案】** D

33、[题干]下列有关儿童脾脏描述错误的是()。

A. 3~6个月左肋下偶可扪及

B. 1岁以后不应扪及

C. 脾浊音界位于左腋中线第9~11肋间

D. 增大的脾脏均有切迹。E, 脾脏轻度肿大为肋下1cm以内

**【答案】** E

34、[题干]下列哪项不属于婴儿的暂时性反射

A. 拥抱反射

B. 吞咽反射

- C. 紧张性颈反射
- D. 踏步反射。E, 握持反射

**【答案】** B

35、[题干]女孩 13 岁，因受凉后发热、咳嗽，2 周后出现全身水肿、尿少。血压 140/90mmHg。血象：Hb80g/L，WBC $4 \times 10^9$ /L，N70%，L30%。尿常规：尿蛋白++，RBC++/HP，WBC5~6 个/HP，颗粒管型 0~2 个/HP，尿比重 1.010。该患儿可能的诊断是()

- A. 尿路感染
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 病毒性肾炎
- D. 肾炎性肾病。E, 急性肾炎并尿路感染

**【答案】** B

36、[题干]治疗原发性氮质血症的病，哪一项不重要

- A. 严格记录出入量、限制每日入液量
- B. 监控血压、呼吸、心率及病情变化
- C. 保证热卡供给
- D. 抗生素预防感染。E, 治疗氮质血症

**【答案】** E

37、[题干]女，4岁，因智力低下就诊，身高80cm，体重12kg，小头，眼距宽，鼻梁低平，眼裂小，跟外侧上斜，舌常伸出口外，小指向内侧弯曲，通贯手要确诊首选的检查是( )。

- A. 血清酶学检查
- B. 血、尿氨基酸分析
- C. 血清 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH 检测
- D. 尿甲苯胺蓝试验。E, 染色体核型分析

**【答案】** E

38、[题干]不属于胃食管反流的病因是

- A. 入下食管括约肌张力比较小
- B. 频发的下食管括约肌一过性松弛
- C. 胃排空加快
- D. 食管裂孔。E, 食管与胃间夹角偏钝

**【答案】** C

39、[题干]新生儿硬肿症硬肿最初出现在( ) ( )。

- A. 大腿外侧
- B. 小腿
- C. 会阴部

D. 躯干。E, 面部

**【答案】** B

**【解析】** 新生儿硬肿症的特点是全身皮下脂肪聚集的部位均可出现硬肿、水肿或硬而不肿，触及像橡皮样。发生顺序为小腿-大腿外侧-整个下肢-臀部-面颊-上肢-全身，故正确答案为 B。

40、[题干]小儿下呼吸道的解剖特点是

A. 婴幼儿的气管、支气管较成人短且狭窄

B. 粘膜柔嫩，血管丰富

C. 右支气管细长，左支气管短而粗

D. 肺泡数量与成人相同。E, 弹力纤维发育较差，血管丰富

**【答案】** ABE

41、[题干]便血伴呕血多见于()。

A. 上消化道出血

B. 急腹症

C. 肠伤寒

D. 感染性疾病。E, 过敏性紫癜

**【答案】** A

42、[题干]充血性心力衰竭发病率最高的年龄段是()

- A. 1 个月内
- B. 1 岁内
- C. 1~2 岁
- D. 2~3 岁。E, 4~6 岁

**【答案】** B

43、[题干] 锌缺乏的主要临床表现

- A. 消化功能减退
- B. 免疫机能减退
- C. 智力发育落后
- D. 生长发育落后。E, 生殖功能障碍

**【答案】** ACBCD

44、[题干] 男，12 岁，半月前患“猩红热”，近 2 天发现眼睑浮肿且逐日加重，尿色深如茶水。查体血压 19/12kPa (145/90mmHg)，心率 112 次/分，肝于右肋下 1cm. 压痛(+)。此时主要治疗措施是

- A. 静脉输注水剂青霉素
- B. 吸氧
- C. 给予强心剂
- D. 给予利尿药呋塞米。E, 口服卡托普利

**【答案】D**

45、[题干]患者，男，12岁，半月前患“猩红热”，近2d发现眼睑水肿且逐日加重，尿色深如茶水。查体血压19/12kPa(145/90mmHg)，心率112次/min，肝于右肋下1cm，压痛(-4-)。此时主要治疗措施是( )。

- A. 吸氧
- B. 静脉输注水剂青霉素
- C. 给予强心剂
- D. 给予利尿药呋塞米。E, 口服卡托普利

**【答案】D**

46、[题干]男，10个月，腹泻2d，大便为蛋花汤样无腥臭，哭时泪少，尿量明显减少，就诊时间为10月下旬，查体：精神萎靡，皮肤弹性差，眼窝及前囟明显凹陷；查血钠135mmol/L。最可能的诊断是( )。

- A. 致病性大肠杆菌肠炎
- B. 鼠伤寒沙门菌肠炎
- C. 轮状病毒肠炎
- D. 生理性腹泻。E, 空肠弯曲菌肠炎

**【答案】** C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/258024040030006133>