

# 2022-2023 年执业药师之西药学专业二

## 高分通关题库 A4 可打印版

### 单选题（共 60 题）

1、（2019 年真题）服用后易出现呃逆、腹胀和暖气，甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是（ ）

- A. 奥美拉唑
- B. 胶体果胶铋
- C. 替普瑞酮
- D. 复方碳酸钙
- E. 法莫替丁

**【答案】 D**

2、两性霉素 B 属于（ ）

- A. 多烯类抗真菌药
- B. 唑类抗真菌药
- C. 丙烯胺类抗真菌药
- D. 棘白菌素类抗真菌药
- E. 嘧啶类抗真菌药

**【答案】 A**

3、达那唑的适应证不包括

- A. 男性乳房发育

- B. 白细胞减少症
- C. 子宫内膜异位症
- D. 纤维性乳腺炎
- E. 性早熟

**【答案】** B

4、钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是( )

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 两性霉素 B
- D. 克林霉素
- E. 克霉唑

**【答案】** A

5、眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A. 异丙肾上腺素
- B. 多巴胺
- C. 去氧肾上腺素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 肾上腺素

**【答案】** C

6、肾病综合征采用

- A. 糖皮质激素小剂量代替疗法

- B. 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- C. 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- D. 抗结核病药与糖皮质激素合用
- E. 糖皮质激素与肾上腺素合用

**【答案】** C

7、不可逆地抑制血小板 I 相和 II 相聚集的药物是

- A. 肝素
- B. 华法林
- C. 噻氯匹定
- D. 尿激酶
- E. 生物素化依达肝素

**【答案】** C

8、下列关于眼部抗菌药物的描述，错误的是

- A. 氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性
- B. 妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- C. 多黏菌素 B 对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- D. 夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染
- E. 氟喹诺酮类药物 18 岁以下患者不推荐使用

**【答案】** D

9、焦虑型、夜间醒来次数较多者

- A. 氟西洋

- B. 氯美扎酮
- C. 谷维素
- D. 夸西泮
- E. 10%水合氯醛

**【答案】** A

10、伊立替康的监护要点不包括

- A. 迟发性腹泻
- B. 脱发
- C. 骨髓抑制
- D. 急性胆碱能综合征
- E. 肝功能

**【答案】** B

11、依普黄酮可用于

- A. 低钙血症者
- B. 妊娠期及哺乳期妇女
- C. 儿童及青少年
- D. 绝经期超过 2 年以上的妇女
- E. 既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

**【答案】** D

12、用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

- A. 绒促性素

- B. 硝苯地平
- C. 米非司酮
- D. 噻啉啉
- E. 吡喹酮

**【答案】** A

13、青光眼患者应慎用

- A. 沙丁胺醇
- B. 沙美特罗
- C. 孟鲁司特
- D. 噻托溴铵
- E. 氨溴索

**【答案】** D

14、患者女，59岁，既往高脂血症病史5年，心功能II级。因发现血压升高7天入院。入院查体血压172/95mmHg，心率62次/分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A. 每次1mg
- B. 每次2.5mg
- C. 每次4mg
- D. 每次5mg
- E. 每次12.5mg

**【答案】** B

15、患者，男，42岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A. 其神经系统毒性与剂量大小无关
- B. 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- C. 直肠癌的首选药之一
- D. 与氯化钠和碱性溶液(特别是氟尿嘧啶)之间存在配伍禁忌
- E. 与氟尿嘧啶联合应用具有协同抗肿瘤作用

**【答案】** A

16、以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

- A. 低钠及低磷血症
- B. 尿潜血、血色素尿
- C. 低钾血症
- D. 乳酸中毒
- E. 高钠血症

**【答案】** A

17、在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A. 肝素
- B. 华法林
- C. 噻氯匹定
- D. 尿激酶
- E. 维生素K

**【答案】** B

18、华法林抗血栓形成的最大效应时间为

- A. 3 天
- B. 6 天
- C. 5~7 天
- D. 2min
- E. 72~96h

**【答案】** B

19、可拮抗维生素 B

- A. 异烟肼
- B. 丙磺舒
- C. 雌激素
- D. 糖皮质激素
- E. 抗凝血药

**【答案】** A

20、伴有高钙血症的妊娠期妇女使用，可致新生儿特殊面容，智力低下，该物质是

- A. 维生素 B2
- B. 精氨酸
- C. 维生素 AD
- D. 维生素 C

E. 葡萄糖

**【答案】** C

21、焦虑型、夜间醒来次数较多者宜选用

A. 氟西泮

B. 氯美扎酮

C. 谷维素

D. 夸西泮

E. 10%水合氯醛依据睡眠状态合理用药

**【答案】** A

22、阿托品 0.5mg 时，表现出的中毒症状为( )

A. 轻微的心率减慢，略有口干及少汗

B. 口干、心率加快、瞳孔轻度散大

C. 心悸、显著的口干、瞳孔扩大，有时出现视物模糊

D. 语言不清、烦躁不安、皮肤干燥发热

E. 幻听、谵妄

**【答案】** A

23、同时具有短效和长效双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是  
( )

A. 普通胰岛素注射液

B. 精蛋白锌胰岛素注射液

C. 预混胰岛素注射液

- D. 甘精胰岛素注射液
- E. 低精蛋白锌胰岛素注射液

【答案】 C

24、下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

- A. 选择性高
- B. 治疗剂量下不会引起血小板减少
- C. 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶
- D. 可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值(INR)
- E. 长期口服安全较好，与食物之间相互作用较少

【答案】 C

25、下列关于林旦的描述中，错误的是

- A. 不应与铜制品接触
- B. 不应与铁制品接触
- C. 不应与碱性物质接触
- D. 涂药前勿用热水和肥皂洗澡
- E. 用于疥疮和阴虱病

【答案】 A

26、抑制胆碱酯酶活性，阻止乙酰胆碱的水解，提高脑内乙酰胆碱的含量的的是

- A. 吡拉西坦
- B. 多奈哌齐

- C. 胞磷胆碱钠
- D. 银杏叶提取物
- E. 艾地苯醌

**【答案】** B

27、主要作用于聚合态的微管，抑制微管解聚

- A. 紫杉醇
- B. 顺铂
- C. 氟尿嘧啶
- D. 高三尖杉酯碱
- E. 放线菌素 D

**【答案】** A

28、口服存在首关效应的药物是

- A. 溴己新
- B. 氨溴索
- C. 乙酰半胱氨酸
- D. 羧甲司坦
- E. 厄多司坦

**【答案】** C

29、防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A. 维生素 B12
- B. 达肝素钠

- C. 香豆素类
- D. 维生素 K1
- E. 阿司匹林

**【答案】** B

30、（2019 年真题）患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是（ ）

- A. 硝普钠
- B. 美托洛尔
- C. 氨氯地平
- D. 贝那普利
- E. 氢氯噻嗪

**【答案】** B

31、（2017 年真题）易发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁肿瘤病是（ ）

- A. 注射用柔红霉素
- B. 注射用硫酸长春新碱
- C. 紫杉醇注射液
- D. 注射用盐酸博来霉素
- E. 注射用环磷酰胺

**【答案】** C

32、用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

- A. 绒促性素
- B. 硝苯地平
- C. 米非司酮
- D. 噻啉啉
- E. 吡喹酮

**【答案】** A

33、属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

- A. 氟他胺
- B. 炔雌醇
- C. 阿那曲唑
- D. 他莫昔芬
- E. 丙酸睾酮

**【答案】** A

34、（2021年真题）可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是（ ）

- A. 非那雄胺
- B. 赛洛多辛
- C. 特拉唑嗪
- D. 多沙唑嗪
- E. 坦洛新

【答案】 A

35、抑制心肌收缩力、延长 APD 及 ERP 的药物是( )

- A. 奎尼丁
- B. 利多卡因
- C. 美西律
- D. 苯妥英钠
- E. 妥卡尼

【答案】 A

36、关于双嘧达莫的描述，不正确的是

- A. 抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取周围腺苷
- B. 使血小板内环磷酸腺苷 (cAMP) 增多
- C. 使血小板内环磷酸腺苷 (cAMP) 减少
- D. 常用于肾病综合征的抗凝治疗
- E. 刺激血小板的腺苷酸环化酶

【答案】 C

37、地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后，拮抗的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 双歧杆菌
- C. 乳酸杆菌
- D. 拟杆菌
- E. 消化链球菌

**【答案】** A

38、(2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是

( )

- A. 甘精胰岛素
- B. 地特胰岛素
- C. 低精蛋白锌胰岛素
- D. 普通胰岛素
- E. 精蛋白锌胰岛素

**【答案】** D

39、主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是( )

- A. 依他尼酸
- B. 依托塞米
- C. 布美他尼
- D. 乙酰唑胺
- E. 氢氯噻嗪

**【答案】** D

40、属于 I B 类抗心律失常药

- A. 奎尼丁
- B. 利多卡因
- C. 普萘洛尔
- D. 胺碘酮

E. 钙拮抗药

**【答案】** B

41、仅降低发热者体温，不降低正常体温，用于感冒发热的药物是

A. 地西洋

B. 硫喷妥钠

C. 阿司匹林

D. 氯丙嗪

E. 洛贝林

**【答案】** C

42、下述药物中兼有角质溶解和抑制真菌作用的是

A. 咪康唑

B. 苯甲酸

C. 特比萘芬

D. 阿莫罗芬

E. 环吡酮胺

**【答案】** B

43、需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

A. 四环素

B. 青霉素

C. 红霉素

D. 氯霉素

E. 磷霉素

**【答案】** A

44、四环素联用抗凝药需要

A. 口服吸收减少

B. 肝毒性增加

C. 增加麦角中毒的风险

D. 调整抗凝血药的剂量

E. 吸收增加

**【答案】** D

45、可升高高密度脂蛋白胆固醇水平的维生素是

A. 维生素 B

B. 烟酸

C. 泛酸钙

D. 叶酸

E. 维生素 C

**【答案】** B

46、主要抑制排卵的长效口服避孕药是

A. 苯丙酸诺龙

B. 丙酸睾丸素

C. 庚酸炔诺酮

D. 炔诺酮

E. 炔雌醇

**【答案】** C

47、神经毒性较严重的是

A. 顺铂

B. 卡铂

C. 亚叶酸钙

D. 奥沙利铂

E. 美司钠

**【答案】** D

48、下列不属于雌激素作用部位的是

A. 肾脏

B. 输卵管

C. 子宫

D. 阴道

E. 乳腺

**【答案】** A

49、羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A. G

B. G

C. M 期

D. S 期

E. G

**【答案】** D

50、下述利尿药中，可导致血钾升高的是

- A. 呋塞米
- B. 氢氯噻嗪
- C. 乙酰唑胺
- D. 氨苯蝶啶
- E. 甘露醇

**【答案】** D

51、葡萄球菌引起的感染应选用

- A. 夫西地酸
- B. 头孢他啶
- C. 阿昔洛韦
- D. 利福平
- E. 妥布霉素

**【答案】** A

52、白女士，74岁，以“间断性腹胀月余”主诉入院。患者个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史14年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A. 充血性心力衰竭
- B. 预防急性肾衰竭

- C. 高钾血症
- D. 高钠血症
- E. 急性药物中毒

【答案】 D

53、可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A. 二磷酸果糖注射液
- B. 葡萄糖注射液
- C. 乳酸钠注射液收售，
- D. 门冬氨酸钾镁注射液
- E. 氯化钠注射液

【答案】 A

54、患者，男，68岁。发热伴咳嗽1周，表情淡漠、气急。近2天全身散在出血点及淤斑，血压60/40mmHg，血红蛋白120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

- A. 鱼精蛋白
- B. 维生素K
- C. 维生素C
- D. 低分子量肝素
- E. 阿替普酶

【答案】 A

55、(2018年真题)阿哌沙班属于( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258026061024007003>