

2024 福建省漳浦县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库大全含答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. (2019 年真题) 患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应该与他汀类药物之间的因果关系应评价为

- A: 很可能
- B: 可能
- C: 肯定
- D: 可能无关

答案：C

2. 维生素 B2 的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是

- A: 餐前
- B: 餐后
- C: 餐中
- D: 清晨

答案：B

3. (引起药源性肾病的药物) 含马兜铃酸的中药可导致

- A: 直接肾毒性
- B: 肾间质纤维化

C: 肾小管阻塞

D: 不可逆性肾小管坏死

答案: B

4. 消化性溃疡的用药注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

A: 维生素 B12

B: 维生素 E

C: 维生素 D3

D: 维生素 C

答案: A

5. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

A: 氯吡格雷

B: 利伐沙班

C: 肝素

D: 阿司匹林

答案: D

6. 属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 伐尼克兰

B: 可乐定

C: 安非他酮

D: 尼古丁替代药物

答案：A

7. (2019 年真题) 患者，女，59 岁，一月前患胃溃疡，近日查体发现血脂异常，化验结果:TC7.2mmol/L, TG1.7mmol/L, LDL-C4.3mmol/L, ALT56U/L, AST80U/L。该患者首选的调脂药是

- A: 阿托伐他汀钙片
- B: 普罗布考片
- C: 非诺贝特片
- D: 阿昔莫司胶囊

答案：A

8. 服用促胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐前 0.5~1h
- B: 餐前
- C: 餐后
- D: 餐后 1h

答案：A

9. (2019 年真题) 缺血性脑卒中的二级预防用药中，不包括

- A: 缬沙坦
- B: 阿司匹林
- C: 依达拉奉
- D: 阿托伐他汀

答案：C

10. 服药期间宜多喝水的药物

- A: 苯妥英钠
- B: 苯溴马隆

C: 琥珀酸亚铁

D: 左旋多巴

答案: B

11. 患者，男，60岁，因“坏死性胰腺炎”行剖腹探查术后2年，进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

A: 奥美拉唑肠溶胶囊

B: 干酵母片

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 蒙脱石散

答案: C

12. 药品临床评价具有“公正性和科学性”是基于

A: 在多学科新进展的基础上进行

B: 应用医药学理论和实践的前沿知识

C: 药品临床评价重在实践

D: 药品临床评价采用多中心、大样本、随机、双盲、对照的方法，经数理统计得出结论

答案: D

13. 严重心脏病患者不能

A: 强利尿

B: 催吐

C: 实施血液净化

D: 洗胃

答案: B

14. 服药期间饮茶可降低药效的是

- A: 格列本脲
- B: 泼尼松
- C: 西咪替丁
- D: 硫酸亚铁

答案：D

15. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 消化不良性腹泻
- B: 动力性腹泻
- C: 感染性腹泻
- D: 分泌性腹泻

答案：C

16. 在"应用软膏剂和乳膏剂的注意事项"中，不正确的是

- A: 涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效
- B: 不宜涂敷于口腔、眼结膜
- C: 一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位
- D: 涂敷前将皮肤清洗干净

答案：A

17. 患者，男，69岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 吗啡控释片
- B: 颠茄片
- C: 双氯芬酸钠缓释片
- D: 加巴喷丁胶囊

答案：C

18. 心衰导致药物经肾排泄减少

- A: 肾小管重吸收增加
- B: 肾血流量减少
- C: 肾小管分泌减少
- D: 肾小球滤过减少

答案：B

19. 布洛芬作为非处方药主要用于治疗

- A: 发热
- B: 抑郁
- C: 鼻炎
- D: 感冒

答案：A

20. 患者，女，38岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力2日；查体：神清、气稍促，心律95bpm，律齐，体温39.1℃，血压110/70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 100mg

B: 60mg

C: 80mg

D: 120mg

答案：A

21. 属于 X 级的药物是

A: 葡萄糖

B: 阿莫西林

C: 沙利度胺

D: 万古霉素

答案：C

22. (2016 年真题) 甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是 ()。

A: 粒细胞减少症

B: 慢性肾衰竭

C: 消化性溃疡

D: 溶血性贫血

答案：A

23. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 四环素

B: 氯霉素

C: 磺胺类药

D: 华法林

答案：D

24. (2017 年真题) 依那普利的妊娠毒性分级是 ()

- A: C 级
- B: A 级
- C: X 级
- D: D 级

答案: D

25. 治疗心力衰竭时，可抑制心肌重构和心肌纤维化的治疗药物不包括

- A: 醛固酮受体阻断剂
- B: 血管紧张素 II 受体阻断剂
- C: 血管紧张素转换酶抑制剂
- D: 强心苷类药物

答案: D

26. 易受光线影响而变质的药品

- A: 安乃近
- B: 冰硼散
- C: 氰化钾
- D: 肝素

答案: D

27. 阿司匹林可导致

- A: 结晶沉积
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾小球滤过率下降
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案: B

28. 长期大量应用容易导致体重明显增加的是

- A: 色甘酸钠
- B: 氯雷他定
- C: 盐酸异丙嗪
- D: 酮替芬

答案：D

29. 为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

- A: 睡前服用
- B: 清晨服用
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用

答案：A

30. 处方中外文缩写“OU”代表

- A: 左耳
- B: 双眼
- C: 左眼
- D: 右耳

答案：B

31. 用量过大可引起低血糖反应的是

- A: 糖皮质激素
- B: 胰岛素
- C: 炔雌醇
- D: 甲状腺素

答案：B

32. 甲状腺功能亢进患者服用丙硫胺嘧啶，可引起的典型药源性疾病是
()

- A: 慢性肾衰竭
- B: 溶血性贫血
- C: 消化性溃疡
- D: 粒细胞减少症

答案：D

33. 公众用药咨询的内容是

- A: 减肥、补钙、补充营养素
- B: 抗菌药物的合理使用
- C: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

答案：A

34. 利尿脱水急速降低体重的兴奋剂是

- A: 甲睾酮
- B: 阿托品
- C: 呋塞米
- D: 苯丙胺

答案：C

35. (2019 年真题) 下列药物中，使用前无需皮试的是

- A: 抗狂犬病血清注射剂
- B: 紫杉醇注射剂
- C: 抑肽酶注射剂
- D: 苄星青霉素注射剂

答案：B

36. 其含量用视黄醇当量(RE)表示的是

A: 维生素 B

B: 维生素 A

C: 维生素 D

D: 维生素 E

答案：B

37. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为 ()

A: 前列腺素

B: 吸烟

C: H. pylori 感染

D: 酒精

答案：A

38. 患者，女，51岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4185mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μ mol / L(正常参考范围 45~84 μ mol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 氢氯噻嗪

B: 依那普利

C: 复方利血平

D: 特拉唑嗪

答案：B

39. (新药 4 期临床评价的局限性) II 期临床试验很难发现"低于 1%发生频率"的不良反应，属于

- A: 观察时间短
- B: 管理漏洞
- C: 病例数量少
- D: 考察不全面

答案：C

40. 患者男性，30 岁，确诊哮喘入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

- A: β_2 受体激动剂
- B: 抗胆碱药物
- C: β 受体阻断剂
- D: H1 受体阻断剂

答案：C

41. 交代患者药品未开启包装时应置于 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 保存，开始使用后不要存放于冰箱中，可在室温下（不超过 25°C ）存放 4 周的是

- A: 米索前列醇
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 胰岛素注射剂
- D: 氟西汀

答案：C

42. (2015 年真题) 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 血液系统疾病

B: 肝病

C: 神经系统疾病

D: 胃肠类疾病

答案: C

43. 患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 每天用药最多不应超过6次，用药不超过3天

B: 每天用药最多不应超过4次，用药不超过3天

C: 每天用药最多不应超过5次，用药不超过3天

D: 每天用药最多不应超过3次，用药不超过3天

答案: B

44. (2019年真题) 患者，男，47岁，2型糖尿病史，饮食不规律，近期因口服降糖药疗效不佳欲改为三餐前即刻使用胰岛素或胰岛素类似物控制血糖，应选用的药物是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 普通胰岛素

答案: C

45. 用二甘醇替代丙二醇所致的假药事件是

A: 欣弗事件

B: 关木通事件

C: 亮菌甲素事件

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 鱼腥草事件

答案: C

46. 可引起口渴、头晕的是

A: 右美沙芬

B: 东莨菪碱

C: 阿米洛利

D: 抗过敏药

答案: C

47. 适合餐前服用的是

A: 奥利司他

B: 氟伐他汀

C: 吲哚美辛

D: 多潘立酮

答案: D

48. 餐后服用可以增加吸收的药物是 ()

A: 头孢拉定胶囊

B: 左甲状腺素钠片

C: 维生素 B2 片

D: 磷酸铝凝胶

答案: C

49. (2017 年真题) 处方中外文缩写 OS. 代表 ()

A: 左眼

B: 右耳

C: 左耳

D: 双眼

答案：A

50. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

A: 烟酸类

B: 贝特类

C: ω -3 脂肪酸制剂

D: 他汀类

答案：D

51. 与联用药物竞争结合血浆蛋白的是

A: 丙磺舒

B: 阿司匹林

C: 西沙必利

D: 丙胺太林

答案：B

52. 引起心悸、心绞痛发作的药物是

A: 丙硫氧嘧啶

B: 左甲状腺素

C: 碘和碘化物

D: 胰岛素

答案：B

53. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

A: 氨溴索片给药剂量不合理

B: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 维生素 C 片用法用量不合理

D: 左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案：D

54. 依药品采购-验收-入库-出库-调配-使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

A: 药品召回

B: 对可疑药品进行封存

C: 反向追踪

D: 查找供货方

答案：C

55. (2017 年真题) 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法，错误的是 ()

A: 食管炎为典型不良反应

B: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位

C: 随餐服用，并大量饮水，可增加吸收、减少胃肠道刺激

D: 应避免同时使用两种双膦酸盐

答案：C

56. 婴幼儿腹泻，服用地衣芽孢杆菌活菌制剂，正确的使用方法是 ()

A: 用温水调服

B: 应同时碱化尿液

C: 清晨服用

D: 舌下含服

答案：A

57. 评判为超常处方的是

- A: 单张门诊处方超过 5 种药品
- B: 二甲双胍用于糖尿病人
- C: 黄连素用于细菌性腹泻
- D: 无适应证用药

答案：D

58. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1 主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd 血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd

- A: 支气管哮喘
- B: 胃食管反流病
- C: 胃溃疡
- D: 心绞痛

答案：B

59. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 服药期间及停药一周内，避免饮用含酒精饮品
- B: 服药时避免与钙片同服，以免影响药物的作用
- C: 用牛奶服药，减少对胃肠道的刺激
- D: 服药期间，可能会发生便秘

答案：C

60. 可出现认知功能受损、谵妄、跌倒的是

- A: 哌替啶
- B: 双嘧达莫

C: 苯二氮

D: 甲氧氯普胺

答案: C

61. 属于 COMT 抑制剂的是

A: 苯海索

B: 司来吉兰

C: 普拉克索

D: 恩托卡朋

答案: D

62. 可引起嗜睡的是

A: 右美沙芬

B: 阿米洛利

C: 东莨菪碱

D: 抗过敏药

答案: D

63. 长期应用可引起牙龈出血、手术创面渗血等出血倾向，需要合用维生素 K 的药物是

A: 氟西汀

B: 培高利特

C: 头孢菌素类

D: 加替沙星

答案: C

64. 肌酸激酶超过正常值可

A: 诊断心肌梗死

- B: 诊断黄疸
- C: 诊断贫血
- D: 诊断痛风

答案：A

65. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

- A: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案：B

66. 季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

- A: 花粉
- B: 冷
- C: 热
- D: 光线

答案：A

67. 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸，减少尿酸的生成

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒
- D: 阿司匹林

答案：B

68. 非甾体抗炎药的不良反应，可致肝损害，产生黄疸、肝炎

- A: 保泰松
- B: 美洛昔康
- C: 塞来昔布
- D: 布洛芬

答案：A

69. 复发

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- C: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5$ cfu / ml
- D: 宜选用毒性小的抗菌药物

答案：A

70. 口服普萘洛尔用于解救的是（）

- A: 瘦肉精中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 硝西泮中毒
- D: 氯丙嗪中毒

答案：A

71. 下列可增强华法林抗凝作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 维生素 K
- C: 雌激素
- D: 阿司匹林

答案：D

72. 从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

- A: 是药师实施药学服务的基础
- B: 可使患者获得有关用药指导
- C: 可杜绝投诉事件
- D: 可提高公众对药师的认知度

答案：C

73. 某患者，男，78岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原（PAS）正常，在控制患者血压的同时，应联合选用（）

- A: 丙酸睾酮
- B: 非那雄胺
- C: 泼尼松龙
- D: 吲达帕胺

答案：B

74. 服用左旋多巴不宜同食

- A: 高蛋白食物
- B: 葡萄柚汁
- C: 食醋
- D: 咖啡

答案：A

75. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 索引的完备程度
- B: 检索路径及费用
- C: 引用参考文献的质量
- D: 出版或更新的频率

答案：C

76. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

- A: 5 α 还原酶抑制剂
- B: 抗胆碱药物
- C: 选择性 α 1 激动剂
- D: α 1 阻断剂

答案：B

77. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 青霉素
- B: 水溶性维生素
- C: 阿莫西林
- D: 米非司酮

答案：D

78. 细菌感染性腹泻患者宜选用

- A: 乳果糖
- B: 干酵母
- C: 小檗碱
- D: 阿苯达唑

答案：C

79. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间为（）

- A: 5-10 天
- B: 3-7 天
- C: 10-15 天
- D: 8-10 天

答案：B

80. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

- A: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- B: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- C: 规律性上腹痛
- D: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

答案：B

81. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的有效性
- B: 药物治疗的安全性
- C: 药物治疗的规范性
- D: 药物治疗的方便性

答案：A

82. 可能导致局部缺血性结肠炎（药源性胃肠道疾病）的药物是

- A: 阿洛司琼
- B: 依他尼酸
- C: 利血平
- D: 呋塞米

答案：A

83. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 酒
- B: 咖啡
- C: 烟
- D: 浓茶

答案：A

84. 相互作用使药物吸收增加的联合用药是

- A: 阿托品联用吗啡
- B: 硝苯地平联用普萘洛尔
- C: 铁剂联用维生素
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：C

85. 不良反应的评价结果分为 6 级,ADR 与用药时间相关性不密切, 反应表现与已知该药 ADR 不相吻合, 原患疾病发展同样可能有类似的临床表现, 药品不良反应因果关系评价结果为

- A: 可能无关
- B: 很可能
- C: 肯定
- D: 待评价

答案：A

86. (2017 年真题) 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘, 宜选择的药物是 ()

- A: 硫酸镁
- B: 比沙可啶

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 乳果糖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/258041121042007022>