
药理学药物作用及应用相关知识测试试卷

1. 关于氨茶碱，以下哪一项是错误的（ ）

- A、为控制哮喘急性发作应快速静脉注射
- B、有一定的利尿作用
- C、可兴奋心脏
- D、可兴奋中枢
- E、可松弛支气管平滑肌

【正确答案】： A

2. 药物发生毒性反应说法不对的是（ ）

- A、一次用药超过极量
- B、长期用药逐渐蓄积
- C、病人肾、肝功能低下
- D、高敏性病人
- E、病人属过敏体质

【正确答案】： E

3. 适用于支气管哮喘而禁用于心源性哮喘的药物是（ ）

- A、氨茶碱
- B、肾上腺素
- C、吗啡
- D、哌替啶
- E、以上均不是

【正确答案】： B

4. 抑酸作用最强的药物是（ ）

- A、西咪替丁
- B、哌仑西平
- C、丙谷胺
- D、奥美拉唑
- E、碳酸氢钠

【正确答案】： D

5. 某药半衰期为 8 小时，按照半衰期给药，问何时达到稳态血药浓度？（ ）

- A、10 小时左右
- B、20 小时左右
- C、1 天左右
- D、2 天左右
- E、5 天左右

【正确答案】： D

6. 阿托品对眼睛的作用是()

- A、扩瞳,降低眼压,调节麻痹
- B、扩瞳,降低眼压,调节痉挛
- C、扩瞳,升高眼压,调节麻痹
- D、扩瞳,升高眼压,调节痉挛
- E、缩瞳、升眼压,调节痉挛

【正确答案】： C

7. 下列不良反应中,哪项是因为糖皮质激素影响脂肪代谢造成的()

- A、高血钾
- B、低血糖
- C、向心性肥胖
- D、低血压
- E、减少磷的排泄

【正确答案】： C

8. 嗜肺军团菌肺炎宜选用()

- A、红霉素
- B、克林霉素
- C、氨苄西林
- D、林可霉素
- E、以上都不是

【正确答案】： A

9. 产生竞争性拮抗作用的是()

- A、阿托品与肾上腺素
- B、间羟胺与麻黄碱
- C、.毛果芸香碱与毒扁豆碱
- D、毛果芸香碱与阿托品
- E、阿托品与吗啡

【正确答案】： D

10. 麻醉前给药选用何药最佳()

- A、阿托品
- B、山莨菪碱
- C、东莨菪碱
- D、毛果芸香碱
- E、新斯的明

【正确答案】：C

11. 药物吸收达到血浆稳态浓度是指()
- A、药物作用达最强的浓度
 - B、药物在体内的分布达到平衡
 - C、药物的吸收过程已完成
 - D、药物的消除过程正开始
 - E、药物的吸收速度与消除速度达到平衡

【正确答案】：E

12. 效应器的 β 受体激动时, 一般不会影响()
- A、心脏兴奋
 - B、血管收缩
 - C、平滑肌松弛
 - D、糖原分解
 - E、肾素分泌

【正确答案】：B

13. 下列哪一种糖尿病不需首选胰岛素治疗()
- A、幼年重型糖病
 - B、合并重度感染的糖尿病
 - C、轻中型的糖尿病
 - D、需作手术的糖尿病患者
 - E、糖尿病酮症酸中毒

【正确答案】：C

14. 可作为吗啡成瘾者戒毒的抗高血压药物是()
- A、哌唑嗪
 - B、可乐定
 - C、普萘洛尔
 - D、依那普利
 - E、硝苯地平

【正确答案】：B

15. 不属于特殊管理药品的是()
- A、医疗用毒性药品
 - B、放射性药品
 - C、抗恶性肿瘤药
 - D、麻醉药品
 - E、精神药品

【正确答案】：C

16. 丙米嗪主要用于治疗（ ）

- A、精神分裂症
- B、焦虑症
- C、躁狂症
- D、抑郁症
- E、神经官能症

【正确答案】：D

17. 新生儿窒息首选（ ）

- A、山梗菜碱
- B、回苏灵
- C、咖啡因
- D、尼可刹米
- E、多沙普仑

【正确答案】：A

18. 男性，28岁，三月前去外地，近十天小便灼痛，近二、三天来小便疼痛难忍，小便时尿道口有较多黄绿色脓性分泌物，查出淋球菌，患者有青霉素过敏史。该患者宜选用（ ）

- A、红霉素
- B、大观霉素
- C、青霉素
- D、四环素
- E、链霉素

【正确答案】：B

19. 多巴胺常合用利尿药治疗（ ）

- A、休克
- B、急性肾衰
- C、内脏出血
- D、低血压
- E、心衰

【正确答案】：B

20. 下列有关新药的定义哪项是错误的（ ）

- A、已生产的药品凡增加新的适应证的
- B、已生产的药品凡增加新的不良反应的
- C、已生产的药品改变给药途径或剂型的

-
- D、未曾在中国境内上市销售的药品
E、已生产的药品制成新的复方制剂的

【正确答案】：B

21. 关于华法林的叙述，下列哪项是错误的（ ）

- A、口服有效
B、对已合成的凝血因子无对抗作用，故起效慢
C、抗凝作用持久，停药后尚可维持数天
D、体内、外均有抗凝作用
E、体内有效

【正确答案】：D

22. 患者，男性，20 岁，在车祸中头部受伤。发现颅内压升高，脑水肿，下列药物中最适合减轻脑水肿症状的是（ ）

- A、氨苯蝶啶
B、呋塞米
C、氢氯噻嗪
D、甘露醇
E、乙酰唑胺

【正确答案】：D

23. 氯解磷定与哪种药物联用可分解生成剧毒的氰化物（ ）

- A、新斯的明
B、阿托品
C、毒扁豆碱
D、毛果芸香碱
E、碱性药物

【正确答案】：E

24. 哪种给药途径最安全、方便、经济（ ）

- A、肌内注射
B、皮下注射
C、口服
D、静脉注射
E、吸入给药

【正确答案】：C

25. 严重肝功能不良的病人不宜选用何种糖皮质激素（ ）

-
- A、泼尼松
 - B、泼尼松龙
 - C、氢化可的松
 - D、地塞米松
 - E、倍他米松

【正确答案】：A

26. 可能引起碱血症的抗酸药是（ ）

- A、氢氧化镁
- B、碳酸氢钠
- C、三硅酸镁
- D、氢氧化铝
- E、碳酸钙

【正确答案】：B

27. 大多数抗癌药最常见的严重不良反应为（ ）

- A、肝脏损害
- B、神经毒性
- C、心肌损害
- D、骨髓抑制
- E、消化道反应

【正确答案】：D

28. 奎尼丁抗心律失常的作用机制是（ ）

- A、抑制 Na^+ 内流
- B、抑制 Ca^{2+} 内流
- C、抑制 Mg^{2+} 内流
- D、促进 K^+ 外流
- E、以上均正确

【正确答案】：A

29. 治疗贾第鞭毛虫最有效的药物是（ ）

- A、甲硝唑
- B、氧氟沙星
- C、磺胺嘧啶
- D、呋喃唑酮
- E、甲氧苄啶

【正确答案】：A

30. 能防止和逆转充血性心力衰竭时心肌重构肥厚并降低病死率的药物是（ ）

- A、地高辛
- B、ACEI

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/265220014102012112>