SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

PICC 门诊专科知识测试试题及答案

1、在成人和儿童中，中心血管通路装置尖端位置在（）有最佳安全性能（ ）

A、右心房

B、上腔静脉中上段

C、上腔静脉和右心房交界处

D、头臂静脉

答案：C

2、更换接头时对路厄氏接头的消毒时间应（ ）

A、＞3 秒

B、＞5 秒

C、＞10 秒

D、＞15 秒

答案：D

3、患者男，56 岁，因肺癌需要化疗 4 周期入院。入院查体：T：36.8° C，P：75 次/分，R：18 次/分，BP：106/78mmHg。白细胞 4.96*106/L 中性粒细胞 4.10*109/L 淋巴细胞 0.15*109/L 血红蛋白 106g/L 血小板 186*109/L。要求行 PICC 置管术，选择右侧贵要静脉，置管长度 41CM,臂围 26CM.置管术后 4 天，于穿刺点上方沿静脉走向出现皮肤暗红，疼痛，肿胀成 1CM 条索状。患者属于哪一级静脉炎( )

A、3 级

B、2 级

C、1 级

D、0 级

答案：A

4、外周留置针超过（）更容易引起静脉炎( )

A、20G

B、22G

C、24G

答案：A

5、下列哪类患者避免放置 PICC（）( )

A、慢性肾脏患者

B、需要长期输液的患者

C、需要输注刺激性药物的患者

D、缺乏外周静脉通路的患者

答案：A

6、外周静脉短导管不要使用在下肢静脉，因为（）（ ）

A、容易血栓性静脉炎和溃疡

B、不容易渗出，活动不便

C、不容易回血

D、不容易堵管

答案：A

7、输液港末端的最佳定位方式（ ）

A、B 超

B、心电图

C、胸片

D、MRI

答案：C

8、连接 PORT 的无损伤针持续输液时应（）时间更换（）（ ）

A、24h

B、48h

C、72h

D、7 天

答案：D

9、无骨髓抑制作用的抗肿瘤药物是（ ）

A、泼尼松

B、长春新碱

C、博来霉素

D、长春碱

答案：A

10、发生 CRT 中与治疗相关的危险因素是（）（ ）

A、药物与输液速度

B、贴膜

C、注射器

D、维护包

答案：A

11、《PICC 尖端心腔内电图定位技术》推荐保存（ ）张心电图（ ）

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：C

12、短 PIV 穿刺部位首选（）（ ）

A、前臂

B、上臂贵要静脉

C、上臂头静脉

D、肘正中静脉

答案：A

13、250ml 脂肪乳剂滴注时间应不少于（） （ ）

A、不少于 3 小时

B、不少于 6 小时

C、不少于 5 小时

答案：A

14、中国静脉输液学会（ ）在北京成立。（ ）

A、1999 年

B、2000 年

C、2001 年

答案：A

15、静疗操作前后应执行 WS/T313 规定，不应以什么取代手卫生（）（ ）

A、戴手套

B、擦拭

C、烘干

答案：A

16、透明敷料相比较纱布，优势在于（ ）

A、经济

B、实惠

C、便于固定、观察、防水

D、观赏性强

答案：C

17、与导管生物膜形成相关的真菌最常见是（）（ ）

A、白色念珠菌

B、隐球菌

C、曲霉菌

D、毛霉菌

答案：A

18、置管的最大的无菌防护屏障不包括以下（）（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/266150220002010133